

C7 : Structure des entités organiques.

1 Formules d'une molécule organique.

Définition Molécules organiques

Les molécules étudiées en chimie organique contiennent principalement des atomes de carbone et d'hydrogène.

Une formule :

- **développée** indique toutes les liaisons d'une molécule.
- **semi-développée** indique les liaisons entre tous les atomes sauf celles avec les atomes d'hydrogène.

2 Groupes caractéristiques et noms des espèces organiques.

A. Les alcanes

Définition Alcanes

- Les alcanes sont une famille de molécules ne contenant que des atomes de carbone et de l'hydrogène.
- Leur squelette est **saturé** c'est à dire que toutes les liaisons sont simples.

Noms des alcanes linéaires en fonction du nombre d'atomes de carbone

	1 C	2 C	3 C	4 C
Nom:	méthane	éthane	propane	butane
	5 C	6 C	7 C	8 C
Nom:	pentane	hexane	heptane	octane

B. Les groupes caractéristiques.

Définition Groupe caractéristique

Un **groupe caractéristique** est un ensemble d'atomes d'une molécule qui permet d'identifier la famille chimie à laquelle elle appartient.

Nom:	Hydroxyle	carbonyle		carboxyle
fonction chimique :	alcool	cétone si liaison C-H	aldéhyde si liaisons C-C	acide carboxylique
Exemples:	$\text{H}_3\text{C}-\text{OH}$	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{CH}_3$	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{H}$	$\text{H}_3\text{C}-\overset{\text{O}}{\underset{ }{\text{C}}}-\text{OH}$

C. Nom d'une espèce chimique organique.

Le nom d'une molécule est généralement composé de 2 parties (préfixe) et d'une partie (suffixe).

C. Nom d'une espèce chimique organique.

Le nom d'une molécule est généralement composé de 3 parties (préfixe) – radical – suffixe

1) le **radical** indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne linéaire la plus longue

2) le **suffixe** indique la nature et la position du groupe caractéristique

Groupe :	alco ol	aldéhy de	céto ne	acide carboxy lique
Suffixe:	- ol	- al	- one	acide ... oïque

Important: On numérote la chaîne la plus longue de façon à ce que le groupe caractéristique ait le numéro le plus petit possible.

3) Si la molécule possède une chaîne carbonée avec une branche latérale (appelée ramification), on ajoute un **préfixe**. Celui-ci indique le nombre d'atomes de carbone et la position de la ramification


Remarque : On place toujours un tiret entre un chiffre et une lettre.

Exemple: le butan-2-

one:

- la chaîne la plus longue a **4 carbones**.



- le groupe caractéristique se trouve sur le carbone n°2



3 Spectres infrarouges.

A. Principe.

- Une molécule peut absorber l'énergie d'une onde infrarouge (IR) et la convertir en vibrations.



- Les fréquences d'absorptions dépendent de la nature des liaisons de la molécule.
- En déterminant les valeurs de ces fréquences, on peut trouver la nature des liaisons présentes dans une molécules et en déduire quels groupes caractéristiques elle possède.


B. Lecture d'un spectre IR.

Définition Spectre infra-rouge

Un spectre IR est un graphique sur lequel on trouve :

1. la **transmittance** (entre 0 et 100%) en ordonnée.
2. le nombre d'onde (en cm^{-1}) en abscisse.

Attention l'axe des abscisses est généralement inversé !



exemple de spectre IR

Remarques :

- Un spectre IR présente des raies d'absorptions tournée vers le bas !
- Le nombre d'onde est l'inverse de la longueur d'onde.

Méthode d'analyse :

On lit les valeurs des nombres d'onde où la transmittance est petite, puis recherche ces valeurs dans un tableau de référence

Liaisons :	O-H alcool	O-H acide	C-H tétraédrique
Nombre d'onde (cm^{-1})	3200 – 3650	2500 – 3200	2800 – 3100

Liaisons :	C=O alcool	C-H tétraédrique	C-O
Nombre d'onde (cm^{-1})	1650 - 1730	1415 - 1470	1050 - 1450

Ce qu'il faut savoir faire



- ✓ Identifier, à partir d'une formule **semi-développée**, les groupes caractéristiques associés aux familles de composés : alcool, aldéhyde, cétone et acide carboxylique
- ✓ Justifier le nom associé à la formule semi-développée de molécules simples possédant un seul groupe caractéristique et inversement.
- ✓ Exploiter, à partir de valeurs de référence, un spectre d'absorption infrarouge.