

C1 : Modéliser des transformations acide-base

Les espèces chimiques acides ou basiques sont très courantes dans notre environnement.

Q1: Donner des exemples d'espèces acide et basique du quotidien.


Réponse:

1 Acides et bases.

D'après la théorie de Brønsted, il est possible de modéliser une transformation acide – base par un transfert d'ion H^+ (un proton) entre deux espèces chimiques.

Définition Acides et bases

- Un **acide** est une espèce chimique capable de **libérer** un ion H^+
- Une **base** est une espèce chimique capable de **capturer** des ions H^+



Brønsted (1879 – 1947)

2 Couples et demi-réaction acide/base.

A. Principe.

- Lorsque deux espèces chimiques peuvent s'**échanger** un ion H^+ elles forment un couple acidobasique, qui est noté sous la forme :

acide / base

Remarque : Un couple acide/base *générique* est souvent noté AH / A^-

- La **demi-réaction** acidobasique est écrite sous la forme

acide $\rightleftharpoons$ base + H^+

Q2: Écrire la demi-équation acidobasique pour le couple HCl / Cl^-

Réponse:

B. Exemples.

Voici quelques couples acidobasiques qu'il est bon de connaître:

Couples :	Demi-réaction :	Remarques :
H_2O / HO^- eau / ion hydroxyde	$H_2O \rightleftharpoons HO^- + H^+$	L'eau est une espèce amphotère
H_3O^+ / H_2O ion oxonium / eau	$H_3O^+ \rightleftharpoons H_2O + H^+$	
H_2CO_3 / HCO_3^- acide carbonique / ion hydrogénocarbonate	$H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$	La dissolution du CO_2 dans l'eau produit de l'acide carbonique
$R-COOH / R-COO^-$ acide carboxylique / ion carboxylate	$R-COOH \rightleftharpoons R-COO^- + H^+$	L'acide carboxylique le plus courant est l'acide éthanóïque. Avec $R = CH_3$
$R-NH_3^+ / R-NH_2$ ion ammonium / amine	$R-NH_3^+ \rightleftharpoons R-NH_2 + H^+$	

- Une espèce amphotère est la base d'un couple et l'acide dans un **autre** couple.
- Une chaîne carbonnée est souvent notée R dans les formules.

Q3: L'ion hydrogénocarbonate est l'acide d'un couple. À vous de déterminer lequel.

Réponse:


3 Formule semi-développée et schémas de Lewis.

Définition Schéma de Lewis

Le schéma de **Lewis** d'une espèce chimique montre tous les atomes et tous les électrons de **valence**.

Ces électrons sont représentés sous forme:

- de **liaisons covalentes**
- ainsi que les **doublets** non liants.



Gilbert Lewis (1875 – 1946)


On rappelle qu'un doublet d'électrons est représenté par un **trait**.

Q4: Rappeler ce qu'est un électron de valence et pourquoi ils sont importants.

Réponse:

- La formule **semi-développée** présente toutes les liaisons sauf **celles avec l'atome** d'hydrogène.


Q5: Voici la formule de Lewis de l'eau. Indiquer le nombre d'électrons de valence qu'elle contient indiquer où sont les doublets liants et non liants.



Réponse:


- Les acides et les bases peuvent être représentés sous forme semi-développée ou de schéma de Lewis

Exemple : Acide **carboxylique** et ion **carboxylate**



Pourquoi y a-t-il une **charge négative** sur l'atome d'oxygène de l'ion carboxylate ?

⇒ l'atome d'oxygène ${}_8\text{O}$ a 8 électrons, sa structure électronique est




On compte les électrons autour de l'atome d'oxygène dans le schéma de Lewis.

Il y a :

- 3 doublets non liants donc $3 \times 2 = 6$ électrons
- et 1 liaison covalente pour laquelle on compte un électron.

Donc au total il y a $6+1=7$ électrons

Exemple : Ion **ammonium** et **amine**



Q6: Expliquer pourquoi il y a une charge sur l'atome d'azote dans l'ion ammonium.

Réponse:

4 La réaction acide-base.




A. Principe.

Lors d'une réaction acidobasique, il y a transfert d'un ion H^+ de l'acide d'un 1^{er} couple vers la base d'un 2^{ème} couple.

Si on note les **couples** par:



Les demi-équations sont:



Q7: Expliquer pourquoi la 2^{ème} demi-équation est inversée.

Réponse:

B. Exemples.

Q8: Écrire l'équation de la réaction entre l'acide carbonique et l'eau. H_2CO_3 / HCO_3^- et H_3O^+ / H_2O

Réponse:

Q9: La réaction entre l'ammoniac et l'eau : NH_4^+ / NH_3 et H_2O / HO^-

Réponse:

.....

.....

.....

.....

.....

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Identifier, à partir d'observations ou de données expérimentales:
 - ✓ un transfert d'ion hydrogène,
 - ✓ les couples acide-base mis en jeu et établir l'équation d'une réaction acide-base.
- ✓ Représenter le schéma de Lewis et la formule semi-développée d'un acide carboxylique, d'un ion carboxylate, d'une amine et d'un ion ammonium.
- ✓ Identifier le caractère amphotère d'une espèce chimique.

C1 : Modéliser des transformations acide-base

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Les exercices sont à rédiger sur une feuille et non pas sur ce document.

Exercice 1: Couples et réaction acido-basique.

- 1) Donner la formule de l'acide conjugué de :
 - a. l'ion nitrate NO_3^-
 - b. l'ion carbonate CO_3^{2-}
- 2) Donner la formule de la base conjuguée de :
 - a. l'ion ammonium NH_4^+
 - b. l'eau H_2O
- 3) Pour les réactions acido-basiques suivantes, indiquer quel **réactif** est l'acide, lequel est la base puis indiquer les deux couples acide/base en jeux.
 - a. $\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$
 - b. $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} + \text{HO}^- \longrightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$

Exercice 2: Comprimé d'aspirine.

Un comprimé effervescent d'aspirine contient de l'acide acétylsalicylique $\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4(\text{s})$ et libère des ions hydrogénocarbonates $\text{HCO}_3^-(\text{aq})$ lorsqu'il est plongé dans l'eau.

- 1) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide acétylsalicylique (qui est un acide) et l'eau (qui est une base)
- 2) Écrire les deux couples qui interviennent dans la question précédente.
- 3) Écrire l'équation de réaction entre l'aspirine (qui est un acide) et l'ion hydrogénocarbonate (qui est une base)
- 4) Écrire les deux couples qui interviennent dans la question précédente.

Exercice 3: Détartrage d'une cafetière.

L'entartrage des cafetières est dû à la formation d'un dépôt solide de carbonate de calcium $\text{CaCO}_3(\text{s})$ lié au chauffage de l'eau.

Pour éliminer le tartre on utilise de l'acide sulfamique $\text{H}_2\text{NSO}_3\text{H}(\text{s})$. Pour détartre la cafetière on commence par dissoudre l'acide sulfamique dans de l'eau tiède. On fait passer cette solution dans la cafetière et on observe l'élimination d'un dépôt blanchâtre.

Les ions carbonate sont transformés en ions hydrogénocarbonate qui sont solubles dans l'eau. Il arrive parfois qu'un dégagement gazeux se produise.

Données :


- $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$
- $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$
- $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$
- $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O} / \text{HCO}_3^-$

- 1) Donner la formule de la base conjuguée de l'acide sulfamique (le proton impliqué est noté en gras) puis écrire la formule du couple acide/base correspondant.
- 2) Écrire l'équation de la réaction entre l'acide sulfamique et l'eau. Quelle est l'espèce acide qui est ainsi formée ?
- 3) L'espèce acide formée réagit avec les ions carbonates du tartre, écrire l'équation de cette réaction.
- 4) Les ions oxonium (H_3O^+), s'il sont présents en quantité suffisante, peuvent réagir avec les ions hydrogénocarbonate. Écrire l'équation de cette réaction et expliquer pourquoi elle permet d'expliquer la formation d'un dégagement gazeux.

Exercice 4: L'acide lactique.

L'acide lactique $\text{CH}_3\text{-CHOH-COOH}$ est produit par les muscles lors d'un effort intense. Il est également présent dans les yaourts et les produits laitiers fermentés.

Sa formule de Lewis est :



- 1) La base conjuguée est l'ion lactate, de formule $\text{CH}_3\text{-CHOH-COO}^-$, écrire sa formule de Lewis.
- 2) Justifier la présence d'une charge (appelée charge formelle) sur l'atome d'oxygène. On rappelle que l'oxygène possède 8 électrons.
- 3) Écrire la demi-équation acido-basique de ce couple.
- 4) L'acide lactique réagit avec l'eau. Écrire l'équation de cette réaction.
- 5) L'acide lactique réagit avec l'ion hydrogénocarbonate HCO_3^- , écrire l'équation de cette réaction.