# C7 : Les transformations chimiques


## 1 Modélisation d'une transformation chimique

### A. Équation de réaction.

- Lors d'une transformation chimique certaines espèces chimiques disparaissent, ce sont les **réactifs**.
- D'autre espèces se forment ce sont des **produits**.

**Définition Equation de réaction**

Une transformation chimique est modélisée par une **équation de réaction** que l'on symbolise par une flèche.




**Exemple :** La combustion du carbone C(s) dans le dioxygène $O_2(g)$ donne du dioxyde de carbone $CO_2(g)$.
L'équation de la réaction s'écrit:

$$C(s) + O_2(s) \longrightarrow CO_2(g)$$

- Une espèce chimique présente lors d'une réaction mais qui **ne se transforme pas** est spectatrice.

***Q1:*** *Equilibrer l'équation de réaction entre l'acide chlorhydrique est le calcaire:*

$$CaCO_3(s) + H^+(aq) \rightarrow H_2O(l) + CO_2(g) + Ca^{2+}(aq)$$

### B. Stœchiométrie.

**Définition Lois de conservation**

Lors d'une transformation chimique il y a conservation :
- des éléments chimiques (atomes)
- des charges électriques.


Lavoisier (1743-1794)

**Remarque :** Pour appliquer ces lois il est généralement nécessaire d'ajouter des coefficients dans les équations de réactions, ce sont **les coefficients stœchiométriques**.

**Exemple :** La transformation

$$C + O_2 \rightarrow CO$$

ne respecte pas la conservation de l'élément oxygène (on passe de 2 à 1 !)

Il faut ajouter des coefficients pour **équilibrer** cette équation

$$2C + O_2 \rightarrow 2CO$$

**Exemples de réactions chimiques :**

- La combustion du méthane :

$$\mathbf{CH_4(g) + .....O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)}$$

- Corrosion d'un métal par un acide :

$$\mathbf{Fe(s) + .....H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)}$$

### C. Réactif limitant.

***Q2:*** *Un enfant prépare de petits sachets de cadeaux pour remercier ses amis d'être venus à son anniversaire. Dans chaque sachet il y a : 2 autocollants, 5 bonbons, 1 petit jouet et 3 chewing-gums.*

*L'enfant a 22 autocollants, 40 bonbons, 10 jouets et 27 chewing-gums. Combien d'amis peut-il inviter ?*

**Réponse:**

**Définition Réactif limitant**

Lors d'une transformation chimique, si l'un des réactifs est entièrement consommé, la réaction s'arrête ce réactif est appelé le réactif **limitant.**

**Comment trouver le réactif limitant à partir de la composition initiale du mélange ?**

Par exemple pour la transformation

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

Avec des quantités initiales de 3 mol pour $CH_4$ et 5 mol pour $O_2$ qui est limitant ?

**Méthode 1.** On raisonne de la façon suivante:

- pour consommer entièrement 3 mol de $CH_4$ on a besoin de 2×3 = 6 mol de $O_2$
- comme on a que 5 mol de $O_2$ cela n'est pas possible !

**Conclusion** $CH_4$ n'est pas limitant donc $O_2$ est limitant.

**Méthode 2.** On calcule les rapports entre les quantités disponibles et les coefficient. Le plus petit rapport correspond au réactif limitant.

$$\text{Comme } \frac{3}{1} > \frac{5}{2} \text{ alors } O_2 \text{ est limitant}$$

**Généralisation:** Pour une transformation chimique entre les espèces A et B selon l'équation

$$a\,A + b\,B \rightarrow produits$$

où a et b sont les coefficients stœchiométriques.
Les quantités de matière mise en présence sont n(A) et n(B)

- Le réactif limitant sera A si : $\frac{n(A)}{a} < \frac{n(B)}{b}$
- Le réactif limitant sera B si : $\frac{n(A)}{a} > \frac{n(B)}{b}$

**Remarque** : Dans le cas ou les «deux réactifs sont limitant» on parle de proportions stœchiométriques.

> ***Q3:*** *Pour la transformation* $\mathbf{Fe(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)}$ *quel est le réactif limitant si :*
>
> *On fait réagir:*
> - *7,0 mol de Fe(s) avec 7,0 mol de $H^+(aq)$ ?*

**Réponse:**

> ***Q4:*** *On fait réagir:*
> - *7,0 mol de Fe(s) avec 7,0 mol de $H^+(aq)$ ?*

**Réponse:**

## 2 Effets thermiques d'une transformation chimique.

- Lors d'une transformation chimique, certaines liaisons entre atomes sont rompues, ce qui nécessite de l'énergie, puis d'autres liaisons sont formées, ce qui **absorbe de l'énergie**.
- Les réactions chimiques qui libèrent de l'énergie, sont **exothermiques** la température du milieu réactionnel augmente. Dans d'autres réactions, la température diminue, elles sont **endothermiques**.

En première approximation, la température du mélange réactionnel dépend de la masse du réactif limitant.

## 3 Synthèse d'une espèce chimique.


### A. Espèce de synthèse

**Définition Synthèse**

Synthétiser une espèce chimique c'est la **fabriquer** au laboratoire à l'aide d'une transformation chimique.

**Remarque :** Il est possible de synthétiser:
- une espèce chimique présente dans la nature, cela permet d'économiser les ressources.
- une espèce qui n'existe pas dans la nature on parle alors d'espèce artificielle.

### B. Le montage à reflux (voir TP).




Ce montage est utilisé pour réaliser une synthèse.


1. Colonne de refroidissement
2. Entrée d'eau
3. Sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

**Fonctionnement:**

Les espèces chimiques se vaporisent dans le ballon puis montent dans la colonne de refroidissement où elle se liquéfient et retombent dans le ballon.

Ce montage permet de chauffer les espèces chimiques sans perte de matière.

### C. Chromatographie (voir TP).




La chromatographie est une méthode permettant d'identifier des espèces chimiques.

1. éluant *(solvant)*
2. *Ligne de* dépôt
3. cuve *à chromatographie*

On place les espèces à analyser sur la ligne de dépôt, puis on plonge la plaque dans l'éluant. Le solvant migre dans la plaque par capillarité et entraîne les espèces.

**Définition**

Chaque espèce monte à une hauteur qui dépend de sa nature (et non de la pureté de l'échantillon dans lequel elle se trouve).

# C7 : Activité et Exercices

⚠️ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

**Exercice 1:** Équilibrer une équation de réaction.

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$Zn + H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

$NO + O_2 \rightarrow NO_2$

$Al + Hg^{2+} \rightarrow Al^{3+} + Hg$

$Al + H_2O \rightarrow H_2 + Al_2O_3$

$HC\ell + O_2 \rightarrow H_2O + Cl_2$

**Exercice 2:** Écrire une équation de réaction

On verse quelques gouttes d'hydroxyde de sodium $Na^+(aq)+HO^-(aq)$ dans solution de chlorure de fer $Fe^{3+}(aq)+3C\ell^-$ (aq), il se forme un précipité d'hydroxyde de fer $Fe(OH)_3(s)$.

**1)** Quels sont les ions spectateurs ?
**2)** Écrire l'équation de cette réaction sans les ions spectateurs, puis l'équilibrer.

Un clou en aluminium est attaqué par l'acide chlorhydrique $H^+(aq) + C\ell^-$ (aq), il se forme du dihydrogène $H_2(g)$ et des ions $Al^{3+}(aq)$.

**3)** Quels sont les ions spectateurs ?
**2)** Écrire l'équation de cette réaction sans les ions spectateurs, puis l'équilibrer.


On brûle de l'éthane $C_2H_6(g)$ dans du dioxygène $O_2(g)$, il se forme de l'eau $H_2O(l)$ et du dioxyde de carbone $CO_2(g)$.

**4)** Écrire l'équation de la réaction puis l'équilibrer.

L'aluminium Al(s) se recouvre d'une fine couche d'oxyde appelée alumine $Al_2O_3(s)$ sous l'effet du dioxygène de l'air.
**5)** Écrire l'équation de la réaction puis l'équilibrer.

**Exercice 3:** Expérience réalisée par Lavoisier en 1776

**1ère expérience :** Pendant douze jours et douze nuits consécutifs, Lavoisier fit chauffer du mercure dans un ballon dont le col recourbé se terminait en haut d'une cloche retournée sur une cuve à mercure (voir dessin). Le deuxième jour, Lavoisier vit la surface du mercure se recouvrir de parcelles rougeâtres qui augmentèrent pendant cinq jours, et le niveau s'élever dans la cloche. Il continua de chauffer jusqu'au douzième jour ; aucune modification ne se produisant plus dans l'appareil, il le laissa refroidir. Le gaz restant dans le ballon et la cloche éteignait une bougie allumée ; il n'entretenait pas la respiration : de petits animaux plongés dans ce gaz y mouraient. Il lui donna le nom d'azote (a, sans ; zoos, vie).



**2ème expérience :** Il mit les pellicules rouges dans une cornue (récipient) très petite pour laisser au-dessus d'elles le moins d'air possible. Il chauffa, il recueillit de l'oxygène sur la cuve à mercure et retrouva du mercure dans la cornue ; les pellicules étaient donc une combinaison de mercure et d'oxygène, on appelle cette combinaison oxyde de mercure.

**1)** Identifier sur le dessin le ballon et la cloche.
**2)** Pour quelle raison le volume de gaz dans la cloche a-t-il diminué ?
**3)** Expliquer pourquoi le gaz recueilli à la fin de la première expérience ne permet plus la combustion.
**4)** Indiquer les réactifs ainsi que les produits de la transformation réalisée par Lavoisier dans la 1ère expérience.
**5)** Écrire l'équation de la transformation chimique de la première expérience. La formule chimique de l'oxyde de mercure est HgO.
**6)** Écrire l'équation de la transformation chimique de la deuxième expérience.

**NB :** Lavoisier fit passer dans une même cloche l'azote restant de la première expérience et l'oxygène recueilli dans la deuxième ; il obtint un mélange qui avait toutes les propriétés de l'air atmosphérique. Il avait ainsi établi par analyse et par synthèse que l'air est un mélange d'oxygène et d'azote.

**Exercice 4:** Identifier un réactif limitant.

On mélange une solution de peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) incolore avec une solution de permanganate de potassium de couleur violette. On observe une effervescence (formation de bulles de gaz) et une décoloration du mélange.

**1)** Le gaz observé ravive la flamme d'une allumette incandescente, quel est son nom ? S'agit-il d'un réactif ou d'un produit ?

**2)** Dans cette expérience quel est le réactif limitant ? (Argumentez)

On verse de l'acide nitrique (incolore) concentré sur un morceau de cuivre. On observe une vive réaction et l'apparition d'un gaz orangé (dioxyde d'azote) ainsi

qu'une coloration bleue due à la présence d'ions cuivre. En fin de réaction il n'y a plus de cuivre.

**3)** Dans cette expérience qui sont les réactifs ? Qui sont les produits ?

**4)** Quelle espèce est le réactif limitant ? (Argumentez)

## Exercice 5: Stœchiométrie et réactif limitant.

**1)** On réalise la combustion du méthane $CH_4(g)$ dans le dioxygène $O_2(g)$ selon :

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

Déterminer le réactif limitant si les quantités de matières mises en présence sont :

- $n(CH_4) = 3{,}2$ mol et $n(O_2) = 5{,}1$ mol
- $n(CH_4) = 2{,}7$ mol et $n(O_2) = 6{,}2$ mol
- $n(CH_4) = 1{,}7$ mol et $n(O_2) = 3{,}4$ mol

**2)** On mélange de la poudre d'aluminium Al(s) avec de la poudre de soufre S(s). L'équation de la transformation est:

$$2Al(s) + 3S(s) \rightarrow Al_2S_3(s)$$

Déterminer le réactif limitant si les quantités de matières mises en présence sont :

- $n(Al) = 1{,}0$ mol et $n(S) = 2{,}0$ mol
- $n(Al) = 1{,}0$ mol et $n(S) = 1{,}3$ mol

## Exercice 6: Couleur d'un mélange réactionnel.

La solution de sulfate de cuivre $Cu^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq)$ a une couleur bleue due aux ions cuivre. La solution d'hydroxyde de sodium $Na^+(aq) + HO^-(aq)$ (ou soude) est incolore. Lorsque l'on mélange ces deux solutions il se forme un précipité d'hydroxyde de cuivre $Cu(OH)_2(s)$.

**1)** Écrire l'équation de la transformation chimique.

**2)** Des élèves réalisent cette transformation en TP puis filtrent la solution. Certains groupes ont un mélange de couleur bleue pâle et d'autre ont une solution totalement transparente. Expliquer pourquoi.

**3)** Quelle sera la couleur de la solution obtenue après filtration si on utilise :

- $n(Cu^{2+}(aq)) = 2{,}3\times10^{-3}$ mol et $n(HO^-) = 7{,}2\times10^{-3}$ mol
- $n(Cu^{2+}(aq)) = 4{,}5\times10^{-3}$ mol et $n(HO^-) = 1{,}7\times10^{-3}$ mol

## Exercice 7: Synthèse de l'acétate d'isoamyle

L'acétate d'isoamyle ($C_7H_{14}O_2$) est le principal composant de l'arôme de banane. On l'obtient par synthèse en faisant réagir l'acide éthanoïque ($C_2H_4O_2$ ) et l'alcool isoamylique ($C_5H_{12}O$), que l'on chauffe à reflux durant plusieurs minutes. De l'eau ($H_2O$) est également produite au cours de cette réaction.

**1)** Écrire l'équation de la transformation.


**2)** Réaliser le schéma légendé du montage à reflux.

**3)** Pour cette synthèse on a utilisé n=0,26 mol d'acide éthanoïque et n= 0,18 mol d'alcool isoamylique. Déterminer le réactif limitant.

En fin de réaction on analyse le mélange réactionnel par chromatographie. Pour cela on dépose les espèces suivantes sur une plaque à chromatographie :

- A. mélange réactionnel
- B. acétate d'isoamyle pur du commerce
- C. alcool isoamylique

Après élution, le chromatogramme est représenté ci-contre :




**4)** A-t-on bien synthétisé de l'acétate d'isoamyle ? Est-il pur ?

## Mots croisés

**Horizontalement:**

2. Se dit d'une réaction qui absorbe de la chaleur.
4. Montage de chauffage qui évite toute perte de matière par évaporation.
5. Réactif entièrement consommé qui stoppe la transformation.
6. Solvant utilisé lors d'une chromatographie.
8. Fabrication d'une espèce chimique au laboratoire.
11. Espèce qui ne participe pas à la réaction chimique
13. Se dit d'une réaction qui libère de la chaleur.

**Verticalement**

1. Se dit des proportions où tous les réactifs sont entièrement consommés.
3. Nombre placé devant une formule pour équilibrer une équation.
7. Espèce chimique qui disparaît lors d'une transformation chimique.
9. Espèce chimique qui se forme lors d'une transformation chimique.
10. Réaction d'une substance avec le dioxygène qui dégage de l'énergie.
12. Représentation d'une transformation chimique écrite avec une flèche.
14. Méthode permettant d'identifier des espèces chimiques par migration.

