C7 : Les transformations chimiques

1 Modélisation d'une transformation chimique

A. Équation de réaction.

- Lors d'une transformation chimique certaines espèces chimiques disparaissent, ce sont les **réactifs**.
- D'autre espèces se forment ce sont des **produits**.

Définition **Equation de réaction**

Une transformation chimique est modélisée par une **équation de réaction** que l'on symbolise par une flèche.

$$\boxed{\textbf{Réactifs}} \longrightarrow \boxed{\textbf{Produits}}$$

Exemple : La combustion du carbone C(s) dans le dioxygène O_2(g) donne du dioxyde de carbone CO_2(g).
L'équation de la réaction s'écrit:

$$C(s) + O_2(s) \longrightarrow CO_2(g)$$

- Une espèce chimique présente lors d'une réaction mais qui **ne se transforme pas** est spectatrice.

B. Stœchiométrie.

Définition **Lois de conservation**

Lors d'une transformation chimique il y a conservation :

- des éléments chimiques (atomes)
- des charges électriques.

Lavoisier (1743-1794)

Remarque : Pour appliquer ces lois il est généralement nécessaire d'ajouter des coefficients dans les équations de réactions, ce sont **les coefficients stœchiométriques**.

Exemple :

La transformation

$$C + O_2 \rightarrow \mathrm{CO}$$

ne respecte pas la conservation de l'élement oxygène (on passe de 2 à 1 !)
Il faut ajouter des coefficients pour **équilibrer** cette équation

$$2C + O_2 \rightarrow 2\mathrm{CO}$$

Exemples de réactions chimiques :

- La combustion du méthane :

$$\mathbf{CH_4(g) + ...O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)}$$

- Corrosion d'un métal par un acide :

$$\mathbf{Fe(s) + ...H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2(g)}$$

C. Réactif limitant.

Définition **Réactif limitant**

Lors d'une transformation chimique, si l'un des réactifs est entièrement consommé, la réaction s'arrête ce réactif est appelé le réactif **limitant.**

Comment trouver le réactif limitant à partir de la composition initiale du mélange ?

Par exemple pour la transformation

$$\mathrm{CH_4} + 2O_2 \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2H_2O$$

Avec des quantités initiales de 3 mol pour CH_4 et 5 mol pour O_2 qui est limitant ?

Méthode 1. On raisonne de la façon suivante:

- pour consommer entièrement 3 mol de CH_4 on a besoin de 2×3 = 6 mol de O_2
- comme on a que 5 mol de O_2 cela n'est pas possible !

Conclusion CH_4 n'est pas limitant donc O_2 est limitant.

Méthode 2. On calcule les rapports entre les quantités disponibles et les coefficient. Le plus petit rapport correspond au réactif limitant.

$$\text{Comme } \frac{3}{1} > \frac{5}{2} \text{ alors } O_2 \text{ est limitant}$$

Généralisation: Pour une transformation chimique entre les espèces A et B selon l'équation

$$a\,A + b\,B \rightarrow produits$$

où a et b sont les coefficients stœchiométriques. Les quantités de matière mise en présence sont n(A) et n(B)

- Le réactif limitant sera A si : $\frac{n(A)}{a} < \frac{n(B)}{b}$
- Le réactif limitant sera B si : $\frac{n(A)}{a} > \frac{n(B)}{b}$

Remarque : Dans le cas ou les «deux réactifs sont limitant» on parle de proportions stœchiométriques.

2 Effets thermiques d'une transformation chimique.

- Lors d'une transformation chimique, certaines liaisons entre atomes sont rompues, ce qui nécessite de l'énergie, puis d'autres liaisons sont formées, ce qui **absorbe de l'énergie**.
- Les réactions chimiques qui libèrent de l'énergie, sont **exothermiques** la température du milieu réactionnel augmente. Dans d'autres réactions, la température diminue, elles sont **endothermiques**.

En première approximation, la température du mélange réactionnel dépend de la masse du réactif limitant.

3 Synthèse d'une espèce chimique.

A. Espèce de synthèse

Définition **Synthèse**

Synthétiser une espèce chimique c'est la **fabriquer** au laboratoire à l'aide d'une transformation chimique.

Remarque : Il est possible de synthétiser:

- une espèce chimique présente dans la nature, cela permet d'économiser les ressources.
- une espèce qui n'existe pas dans la nature on parle alors d'espèce artificielle.

B. Le montage à reflux (voir TP).



Ce montage est utilisé pour réaliser une synthèse.

1. Colonne de refroidissement
2. Entrée d'eau
3. Sortie d'eau
4. ballon
5. chauffe ballon

Fonctionnement:

Les espèces chimiques se vaporisent dans le ballon puis montent dans la colonne de refroidissement où elle se liquéfient et retombent dans le ballon.

Ce montage permet de chauffer les espèces chimiques sans perte de matière.

C. Chromatographie (voir TP).



La chromatographie est une méthode permettant d'identifier des espèces chimiques.

1. éluant *(solvant)*
2. *Ligne de* dépôt
3. cuve *à chromatographie*

On place les espèces à analyser sur la ligne de dépôt, puis on plonge la plaque dans l'éluant. Le solvant migre dans la plaque par capillarité et entraîne les espèces.

Définition

Chaque espèce monte à une hauteur qui dépend de sa nature (et non de la pureté de l'échantillon dans lequel elle se trouve).