

# P8 : Modèles ondulatoire et particulaire de la lumière.

## 1 Ondes électromagnétiques

Comme leur nom l'indique ce type d'onde modifie le champ électrique et le champ magnétique sur son passage.

Contrairement aux ondes mécaniques, les **ondes électromagnétiques** se propagent dans le vide: elles sont immatérielles.

### Définition célérité et longueur d'onde

La célérité d'une onde électromagnétique est celle de la lumière soit  $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$  dans le vide.

La relation entre longueur d'onde  $\lambda$  et fréquence  $\nu$  (nu) ne change pas. Dans le vide:

$$\lambda = \frac{c}{\nu}$$

Avec  $\lambda$  en m et  $\nu$  en Hz

- Le domaine spectral des ondes électromagnétiques est **très étendu** et va des rayons gamma ( $\gamma$ ) vers  $\lambda \approx 10^{-12} \text{ m}$  aux ondes radio  $\lambda \approx 10^3 \text{ m}$ .
- On remarque que la lumière (visible) en occupe une toute **petite partie**.





Fig. 1. – Domaine des ondes électromagnétiques

## 2 Le photon

L'interprétation de certaines expériences, comme l'effet photo-électrique par exemple, ne peut se faire qu'en considérant la lumière comme une **particule**.

Cette idée est due à A. Einstein



Albert Einstein

1879-1955

Cela signifie que dans certaines expériences la lumière se comporte comme une **onde** et dans

d'autres comme une **particule** !

### A. Énergie d'un atome


- À l'échelle **microscopique**, l'énergie d'un atome ne peut prendre que certaines valeurs: on dit que son énergie est **quantifiée**.
- À cette échelle l'unité d'énergie la plus adaptée est l'électron-volt (eV).

**Donnée:**  $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$

### Définition Diagramme d'énergie

Les valeurs des énergies (possibles) d'un atome sont appelés des **niveaux d'énergies**. On les représente sous forme de diagramme.

- Le niveau le plus bas est stable: c'est le **fondamental**
- Les autres niveaux sont instables: ils sont **excités**
- Le niveau le plus haut correspond à une **ionisation** (donc l'atome perd un électron)



Niels Bohr

1885-1962




Fig. 2. – Niveaux d'énergies de l'atome d'hydrogène

### B. Interaction lumière matière

Les échanges d'énergie entre un atome et la «lumière» se font par «paquets» appelé des **photons**.

### Définition Loi de Planck

L'énergie  $\Delta E$  d'un photon est proportionnelle à sa fréquence  $\nu$ :

$$\Delta E = h \times \nu$$

Avec  $\Delta E$  en J,  $\nu$  en Hz et  $h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}^{-1}$  la constante de Planck.



Max Planck

1858-1947

### C. Transitions électromagnétiques

**Principe:**

- Un atome dans un état excité  $E_2$  peut passer spontanément dans un état d'énergie  $E_1 < E_2$  en **émettant un photon** d'énergie  $\Delta E = E_2 - E_1$
- Inversement un atome dans un état d'énergie  $E_1$  peut passer dans un état d'énergie  $E_2$  en **absorbant** un photon d'énergie  $\Delta E = E_2 - E_1$

Les transition électroniques sont représentées par des flèches sur les diagrammes d'énergies.




Fig. 3. – Transition électronique entre les niveaux 2 et 1 avec émission d'un photon

## 3 Interprétation de spectres de raies

### A. Spectre d'émission

On a vu en 2<sup>de</sup> que le spectre d'émission d'un gaz sous faible pression est discontinu. On observe des raies colorées dont les positions dépendent du gaz.



Fig. 4. – spectre d'émission du mercure

Chaque **raie** spectrale est le résultat d'une **transition électronique**.

Comme il y a une nombre limité de niveaux d'énergies, le nombre de raies est aussi limité.

### B. Spectre d'absorption

Lorsqu'une lumière polychromatique traverse un gaz sous faible pression, certaines couleurs sont absorbées et on observe des raies noires.




Fig. 5. – spectre d'absorption du mercure

L'interprétation est la même mais la transition électronique correspond à est une absorption de photon.

On observe que la position des raies d'absorption est la même que celle des raies d'émissions.