

- Lorsqu'une molécule possède une liaison double, celle-ci se comporte comme 1 seule liaison simple, c'est à dire qu'elle occupe une seule direction de l'espace.

3 Polarité des molécules.

A. Électronégativité

Définition Electronégativité

L'électronégativité d'un atome est une mesure de sa capacité **à attirer les électrons** d'une liaison covalente dans laquelle il est engagé.

Exemples:

Atome	Na	H	C	N	O	Cl
Électronégativité	0,93	2,2	2,55	3,04	3,44	3,16

Remarque : Globalement l'électronégativité augmente vers la droite et le haut du tableau périodique.

B. Polarisation des liaisons.

Lorsque deux atomes A et B forment une liaison covalente A – B :

- S'ils ont la même électronégativité, les électrons de la liaison passent en moyenne la même durée à proximité des deux atomes, on dit que la liaison n'est **pas polarisée**.
- Si A est plus électronégatif que B, alors les électrons de la liaison passent plus de temps à proximité de A, celui-ci porte une **charge** partielle notée δ^- et B porte une charge partielle notée δ^+ . On dit que la liaison est polarisée.


Remarque : On admettra que la liaison est polarisée si la **différence** d'électronégativité est supérieure à 0,4

C. Molécule polaire ou apolaire.

Définition Polarité d'une molécule

Une molécule est **polaire** si le centre géométrique des charges partielles positives ne coïncide pas avec le centre géométrique des charges négatives

Exemple : La molécule d'eau



Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Établir le schéma de Lewis de molécules et d'ions mono ou polyatomiques, à partir du tableau périodique
- ✓ Interpréter la géométrie d'une entité à partir de son schéma de Lewis.
- ✓ Déterminer le caractère polaire d'une liaison à partir de la donnée de l'électronégativité des atomes.
- ✓ Déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une entité moléculaire à partir de sa géométrie et de la polarité de ses liaisons.

QCM de compréhension

- Les électrons de valence d'un atome sont ceux qui occupent les couches électroniques les plus proches du noyau. ☐ Vrai ☐ Faux
- Lors du remplissage des sous-couches électroniques, la sous-couche 4s se remplit avant la sous-couche 3d. ☐ Vrai ☐ Faux
- Le schéma de Lewis d'une entité doit représenter l'intégralité des électrons de l'atome. ☐ Vrai ☐ Faux
- Une «lacune électronique» est représentée par un rectangle vide et indique qu'il manque un doublet d'électrons pour respecter la règle de stabilité. ☐ Vrai ☐ Faux
- Pour déterminer la géométrie d'une molécule, on considère que les doublets liants et les doublets non liants se repoussent mutuellement de la même manière. ☐ Vrai ☐ Faux
- Une molécule dont l'atome central est entouré de 3 doublets liants et d'un doublet non liant possède une géométrie en forme de pyramide à base triangulaire. ☐ Vrai ☐ Faux
- L'électronégativité est une grandeur qui augmente globalement lorsqu'on se déplace vers la droite et vers le haut dans le tableau périodique. ☐ Vrai ☐ Faux
- Une liaison entre deux atomes A et B est dite polarisée si les deux atomes possèdent exactement la même électronégativité. ☐ Vrai ☐ Faux
- Si une molécule possède des liaisons polarisées mais que le centre géométrique des charges positives coïncide avec celui des charges négatives, alors la molécule est apolaire. ☐ Vrai ☐ Faux
- Dans le cadre de la géométrie moléculaire, une liaison double est traitée comme si elle occupait deux directions distinctes dans l'espace. ☐ Vrai ☐ Faux

C5 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)


${}_1\text{H}$								${}_2\text{He}$
${}_3\text{Li}$	${}_4\text{Be}$	${}_5\text{B}$	${}_6\text{C}$	${}_7\text{N}$	${}_8\text{O}$	${}_9\text{F}$	${}_{10}\text{Ne}$	
${}_{11}\text{Na}$	${}_{12}\text{Mg}$	${}_{13}\text{Al}$	${}_{14}\text{Si}$	${}_{15}\text{P}$	${}_{16}\text{S}$	${}_{17}\text{Cl}$	${}_{18}\text{Ar}$	

Numéros atomiques

Q1. L'hélium, le néon et l'argon sont des gaz présents dans l'air en très petite quantité: on les appelle des **gaz rares** (ou nobles). Établir la structure électronique de ces gaz et indiquer leurs nombre d'électrons de valence.

Q2. Qu'est ce que le schéma de Lewis d'une espèce chimique ? Répondre en utilisant les mots « électrons de valence » « doublet non-liant » et « liaison covalente »

Q3. Sur le schéma de Lewis de l'ammoniaque




combien y a-t-il d'électrons de valence ? combien de doublet non liant ? de doublets liants ?

Q4. Établir le schéma de Lewis du dichlore Cl_2 en utilisant la méthode de cours en 3 étapes.

Q5. Établir la structure de Lewis du dioxygène O_2
indice: Il existe des liaisons double qui sont plus « fortes » que les liaisons simples et sont représentées par un signe =.



Q6. Compléter le schéma de Lewis ci-dessous du dioxyde de carbone CO_2



Q7. Établir le schéma de Lewis de l'ion HO^- . Expliquer lequel des 2 atomes porte la charge puis la représenter sur le schéma.




Q8. Imaginez un poteau central auquel vous attachez des chiens en laisse. Chaque animal a son propre espace vital et ne veut pas que les autres s'approchent trop de lui. La longueur de la laisse est la même pour tous. Comment vont se placer les chiens s'ils sont 2, 3 ou 4 ? La réponse serait elle différente si le problème était à 3 dimensions ?

Q9. Donner le nom de la géométrie de des molécules autour de l'atome central dans les cas suivants:



Q9. Déterminer la structure de Lewis molécule H_2CO puis sa géométrie autour de l'atome C.

Q10. Parmi les 3 propositions suivantes quelle représentation est la plus correcte pour la géométrie ?



Q11. Justifier que la liaison $\text{H} - \text{H}$ n'est pas polarisée alors que $\text{H} - \text{Cl}$ est fortement polarisée.

Exercice 1: Schémas de Lewis de molécules

Établir les schémas de Lewis des **molécules** suivantes :

H_2	CCl_4	HCN	HCl	SO_2 Difficile	PCl_3
--------------	----------------	--------------	--------------	---	----------------

Remarques : Dans les cas où on peu envisager plusieurs schémas de Lewis différents, on choisira celui qui est le plus symétrique possible.

Exercice 2: Schémas de Lewis d'ions

Établir les schémas de Lewis des **ions** suivants :

F^-	NH_4^+	Na^+	CO_3^{2-} Difficile
--------------	-----------------	---------------	---

Exercice 3: Géométrie d'une molécule ou d'un ion

Déterminer la géométrie des espèces suivantes :

CO_2	O_2	NH_3	NH_4^+	HO^-
---------------	--------------	---------------	-----------------	---------------

Exercice 4: Molécules polaires ou apolaires

On considère qu'une liaison est polarisée si la **différence d'électronégativités** entre les atomes est plus grande que 0,4.

Déterminer si les molécules suivantes sont polaires ou non : Pour cela il faudra commencer par établir le schéma de Lewis puis étudier la polarité des liaisons.

- 1) HCN
- 2) CO_2
- 3) CCl_4
- 4) H_2CO