PASS
Octobre 2026

Module 1	EPREUVE Physiologie humaine, biophysique appliquée et médicaments	Durée 1h30

CONSIGNES A LIRE AVANT L'EPREUVE

Vérifiez que votre sujet est complet

L'épreuve comporte :

- **1 cahier de questions (16 pages)**
- **3 feuilles de brouillon**

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

IMPORTANT :

Remplissage de la feuille réponses :

Lire consignes et exemple de marquage sur la feuille réponses QRM

QRU : une seule réponse exacte

QRM : plusieurs réponses exactes

Conformément aux dispositions du décret n°92-657 du 13 juillet 1992, tout étudiant auteur ou complice d'une fraude ou d'une tentative de fraude à l'occasion d'un examen ou concours relève du régime disciplinaire prévu par ledit décret. A ce titre, tout fautif est susceptible d'être traduit devant la Section Disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université, et de se voir appliquer une sanction (avertissement, blâme ou exclusion).

PARTIE PHYSIOLOGIE GÉNÉRALE

1) QRM. À propos de la motilité digestive :

a) elle correspond aux contractions musculaires de la paroi du tube digestif
b) le péristaltisme correspond à la contraction propulsive des muscles circulaires
c) les mouvements de segmentation favorisent le brassage des aliments sans les propulser
d) les cellules de Cajal transmettent une dépolarisation aux cellules musculaires lisses
e) l'excitabilité des cellules musculaires lisses augmente suite à l'activation du parasympathique

2) QRM. La phase gastrique :

a) est une phase d'anticipation
b) présente une rétroaction positive
c) est caractérisée par un étirement de la paroi duodénale
d) est caractérisée par la libération d'entérogastrones
e) est caractérisée par une augmentation de l'activité gastrique sur plusieurs heures

3) QRU. À propos de la digestion :

a) les nutriments sont transformés en aliments pour être assimilés
b) la sécrétion correspond au passage de molécules du milieu extérieur vers le milieu intérieur
c) les muscles des viscères sont des muscles striés
d) les replis de la sous-muqueuse de l'intestin grêle sont très utiles à l'absorption
e) la fragmentation débute au niveau de l'estomac

Les 3 questions suivantes sont liées et concernent un cycliste professionnel.
Energie libérée par les nutriments énergétiques :
Glucides : 16 kJ/g
Lipides : 38 kJ/g
Protides 15 kJ/g
Equivalent énergétique de l'O_2 : 20 kJ/L STPD
Faction d'O_2 dans l'air atmosphérique : 21 %

Clea SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

4) QRU. On recueille dans un sac l'air expiré par le cycliste au repos pendant 10 minutes. Le volume d'air expiré est de 80 L. On considère que l'air expiré est aux conditions STPD et ne contient que du N_2, de l'O_2 et du CO_2. La fraction d'O_2 dans l'air expiré est de 17 %. Quelle est la dépense énergétique de repos du cycliste en 24 h ?

a) 9600 kJ
b) 9216 kJ
c) 8256 kJ
d) 7840 kJ
e) 5360 kJ

5) QRM. Ce cycliste dépense en moyenne 3000 kJ par jour suite à ses entraînements. Parmi les régimes suivants, identifiez ceux qui assureront un bilan énergétique positif.

a) Glucides : 150 g/j ; Lipides : 150 g/j ; Protides : 80 g/j
b) Glucides : 170 g/j ; Lipides : 180 g/j ; Protides : 80 g/j
c) Glucides : 180 g/j ; Lipides : 200 g/j ; Protides : 120 g/j
d) Glucides : 200 g/j ; Lipides : 150 g/j ; Protides : 100 g/j
e) Glucides : 250 g/j ; Lipides : 180 g/j ; Protides : 150 g/j

6) QRU. On s'intéresse au travail mécanique fourni au cours d'une séance de pédalage de 30 minutes. La longueur du pédalier est de 40 cm. Le cycliste exerce une force de 100 N sur la pédale. Il pédale à une vitesse de 95 tours/min. Quelle est la réponse exacte ?

a) 920 kJ
b) 716 kJ
c) 465 kJ
d) 214 kJ
e) 87 kJ

7) QRM. À propos du pH :

a) une augmentation du pH sanguin stimule la ventilation
b) la variation du pH entraîne des variations du potentiel de membrane
c) une variation importante du pH peut être à l'origine de la dénaturation des protéines
d) le liquide céphalo-rachidien a un pH plus alcalin que le pH artériel
e) la compensation rénale précède la compensation respiratoire lors d'une alcalose métabolique

Cléa SANCHEZ (cleasanchez01@gmail.com) Groupe MEDISUP

8) QRM. Un nouveau-né est hospitalisé en urgence car il présente des diarrhées. L'analyse des gaz du sang artériel montre :
$PaCO_2$ = 42 mmHg, $[HCO_3^-]$ = 12,6 $mmol.l^{-1}$
Coefficient de solubilité du CO_2 = 0,03 $mmol.l^{-1}.mmHg^{-1}$

a) le pH artériel est supérieur à 7,45
b) le patient présente une alcalose métabolique
c) le patient présente une acidose métabolique
d) le patient peut présenter une hyperventilation
e) l'hypoventilation alvéolaire est l'origine du trouble observé chez ce nouveau-né

9) QRM. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont permises grâce au système nerveux sympathique lors de la thermorégulation ?

a) l'activation des systèmes de thermolyse
b) l'activation de systèmes de thermogenèse
c) la vasoconstriction cutanée
d) une diminution de la dissipation de la chaleur
e) une augmentation du débit sanguin cutané

Clara SANCHEZ (clarasanchez704@gmail.com) - Groupe MEDISUP

10) QRM. À propos de la physiologie nerveuse :

a) les systèmes de rétrocontrôle sont observés à plusieurs niveaux dans l'organisme
b) l'exploitation comportementale des systèmes de rétrocontrôle est dépendante de l'âge
c) le cortex occipital joue un rôle déterminant dans les fonctions exécutives
d) la fonction mnésique est un processus par lequel le système nerveux acquiert de nouvelles informations
e) les fonctions exécutives jouent un rôle dans le contrôle cognitif et comportemental

11) QRM. À propos du système nerveux

a) les couches corticales sont des territoires excitables intervenant dans des modules fonctionnels
b) la moelle épinière transmet des informations aux effecteurs via des efférences
c) la transmission synaptique électrique est de l'ordre de quelques microsecondes
d) le délai de transmission synaptique dépend de l'architecture synaptique
e) la transmission synaptique électrique est unidirectionnelle

12) QRM. À propos de l'organisme en relation avec son environnement

a) les informations gustatives et odorantes sont de nature chimique
b) le traitement des stimuli olfactifs implique une étape thalamique
c) les informations sensorielles rejoignent le cortex par des voies afférentes
d) les informations sensorielles liées aux objets sont non sociales
e) la transduction correspond à la transformation d'un signal électrique en signal chimique

13) QRM. À propos du cortisol :

a) Le cortisol est une hormone stéroïde
b) Le cortisol est sécrété par la médullosurrénale
c) L'ACTH stimule la sécrétion de cortisol
d) Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse
e) La sécrétion de cortisol suit un rythme ultradien

14) QRM. À propos de l'ADH :

a) L'ADH est synthétisée par des neurones hypothalamiques
b) L'ADH est stockée dans la neurohypophyse avant sa libération
c) Le récepteur V2 de l'ADH est un récepteur intracellulaire
d) L'ADH favorise l'incorporation d'aquaporines 2 dans la membrane apicale des cellules du tube collecteur
e) L'ADH augmente la réabsorption rénale d'eau

15) QRM. Concernant la filtration glomérulaire :

a) la membrane de filtration est chargée positivement
b) la perméabilité de la membrane de filtration dépend de la taille et de la charge des molécules
c) le filtrat glomérulaire est concentré en protéines
d) 20 % du plasma pénétrant dans l'artériole afférente est filtré
e) 50 % de l'urée filtrée est réabsorbée dans le tubule rénal

16) QRM. Le débit de filtration glomérulaire :

a) est fortement impacté par le coefficient de filtration en condition physiologique
b) est diminué en cas de diabète
c) est augmenté lorsque la pression hydrostatique capsulaire augmente
d) est régulé par un rétrocontrôle tubuloglomérulaire qui renforce le mécanisme myogène
e) son augmentation est responsable d'une vasoconstriction de l'artériole afférente

Cléo SANCHEZ (cleosanchez704@gmail.com) - Groupe MEDISUP

17) QRM. Concernant la formation de l'urine :

a) le mécanisme vasculaire myogène agit sur l'étirement de la paroi de l'artériole afférente dans la régulation du débit de filtration glomérulaire
b) les substances non réabsorbées sont liposolubles
c) la réabsorption tubulaire peut être active ou passive selon les substances
d) la réabsorption est asymétrique dans les branches de l'anse de Henlé
e) le gradient corticomédullaire est généré au niveau des néphrons corticaux

18) QRU. Un homme consomme des barres hyper-protéinées lors d'un entraînement sportif. Quelle est la conséquence de l'ingestion et de la métabolisation de 30 g de protides sur les compartiments liquidiens de ce patient ?

a) une baisse du capital hydrique
b) une baisse de l'osmolarité plasmatique à l'état initial
c) une augmentation du capital sodé
d) un gonflement des hématies
e) un apport osmolaire de 160 mOsm

19) QRM. À propos des échanges à travers la paroi capillaire :

a) la pression hydrostatique pousse les liquides vers le milieu interstitiel
b) la pression oncotique est inférieure à la pression hydrostatique au pôle veineux
c) en condition physiologique, la quantité d'urée retrouvée dans le secteur interstitiel est identique à celle retrouvée dans le plasma
d) une baisse de la perméabilité de la paroi capillaire peut être la cause d'œdèmes
e) la pression oncotique est liée à la concentration élevée en protéines plasmatiques

20) QRM. Parmi les paramètres suivants, lesquels sont spécifiques d'un potentiel d'action ?

a) codage en fréquence
b) amplitude variable
c) conduction décrémentielle
d) effet seuil dépendant
e) durée fixe

Téléa SANCHEZ (teasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

21) QRM. À propos du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte :

a) La phase ascendante du potentiel d'action des cardiomyocytes est due à une entrée de Na^+ par les canaux sodiques voltage-dépendants
b) Les récepteurs à la ryanodine RyR2 sont localisés au niveau de la membrane du réticulum sarcoplasmique
c) L'ouverture des canaux calciques de type L entraîne une libération massive de Ca^{2+} directement dans le milieu extracellulaire
d) La fixation du Ca^{2+} sur la troponine C provoque le déplacement du complexe troponine-tropomyosine, permettant l'interaction entre l'actine et la myosine
e) La libération de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique est déclenchée par une entrée préalable de Ca^{2+} dans le cardiomyocyte

22) QRM. À propos de la contraction des cardiomyocytes :

a) L'activité ATPasique nécessaire à la contraction est portée par les filaments fins d'actine
b) Dans le sarcomère, le rapport entre les filaments épais de myosine et les filaments fins d'actine est de 1/6
c) La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine provoque le renforcement du pont actine-myosine
d) Le départ de l'ADP s'accompagne d'une bascule de la tête de myosine exerçant une traction sur le filament d'actine
e) L'hydrolyse de l'ATP permet à la tête de myosine de retrouver sa conformation initiale

23) QRM. Concernant les différents temps du cycle cardiaque :

a) lors de la mésodiastole, la valve mitrale est fermée
b) la systole est délimitée par les bruits B1 et B2
c) la télédiastole marque la fin de la diastole ventriculaire
d) une bonne relaxation diastolique est nécessaire à une contraction ventriculaire optimale
e) l'ouverture de la valve aortique marque la fin de la télédiastole

24) QRM. Concernant le système cardio-vasculaire :

a) les cardiomyocytes sont des cellules musculaires striées riches en mitochondries
b) les circulations pulmonaire et systémique présentent un fonctionnement distinct en série
c) la circulation pulmonaire assure les échanges gazeux avec l'extérieur
d) l'hématose est assurée chez le fœtus par la circulation pulmonaire
e) les valves atrio-ventriculaires assurent une circulation bidirectionnelle

Cléa SANCHEZ (cleasanchez2@gmail.com) - Groupe MEDISUP

25) QRM. Concernant le débit cardiaque :

a) une amélioration de la contraction cardiaque s'accompagne habituellement d'un ralentissement de la relaxation
b) la compliance ventriculaire est un déterminant principal de la précharge
c) la postcharge augmente avec la précharge
d) la précharge augmente avec l'état inotrope du cœur
e) le système nerveux sympathique a un effet inotrope négatif

26) QRM. Parmi les paramètres suivants, lesquels augmentent le débit cardiaque ?

a) l'hyperthermie
b) les médicaments chronotropes négatifs
c) une diminution de la postcharge
d) une augmentation de la fréquence cardiaque
e) une diminution du volume télédiastolique

27) QRM. Au cours d'une course cycliste longue distance :

a) la composante isotonique est activée
b) le débit cardiaque est augmenté
c) le VES est diminué
d) au début de la course, les vaisseaux cutanés se dilatent
e) une hausse des résistances vasculaires des muscles actifs est observée

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

PARTIE BIOPHYSIQUE APPLIQUÉE AUX MÉTHODES D'EXPLORATION

28) QRM. A propos des quarks :

a) les quarks appartiennent au groupe des fermions
b) le graviton permet la cohésion des quarks à l'intérieur du noyau
c) le neutron contient 2 quarks down et 1 quark top
d) le proton contient 2 quarks up et 1 quark down
e) la charge d'un quark down correspond à -1/3 de la charge élémentaire

29) QRU. La demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Si un échantillon archéologique conserve encore 1/4 de son activité initiale, quel est approximativement son âge ?

a) 2865 ans
b) 5730 ans
c) 11 460 ans
d) 17 190 ans
e) 22 920 ans

30) QRM. Concernant les transformations radioactives :

a) la particule alpha est un électron fortement accéléré
b) les isotopes métastables émettent un rayonnement gamma
c) le spectre d'émission bêta est un spectre continu
d) la désintégration bêta moins correspond à la capture d'un électron atomique
e) l'émission bêta plus est observée chez les noyaux instables par excès de neutrons

31) QRM. A propos des interactions des rayonnements ionisants avec la matière :

a) un faisceau d'électrons est efficacement arrêté par une feuille de papier
b) les photoélectrons proviennent des couches externes des atomes
c) la diffusion Thomson-Rayleigh est une diffusion des électrons sans perte d'énergie
d) les rayonnements ionisants peuvent provoquer des ruptures de l'ADN double brin
e) les effets biologiques dépendent du type de rayonnement et de leur transfert d'énergie linéique

32) QRM. A propos des effets biologiques des rayonnements ionisants :

a) les effets somatiques correspondent à la transmission des mutations aux descendants
b) les effets déterministes sont imprévisibles et sans seuil
c) les tissus à renouvellement rapide sont plus sensibles aux rayonnements
d) la dose équivalente s'exprime en gray (Gy)
e) les rayonnements ionisants peuvent provoquer la formation de radicaux libres dans les tissus

Cléa SANCHEZ (cleasanchez24@gmail.com) - Groupe MEDISUP

33) QRM. A propos de la radioprotection

a) en radioprotection, on applique le principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
b) le Sievert tient compte de la nature du rayonnement et de sa capacité à produire des effets biologiques
c) le temps d'exposition doit être aussi court que possible afin de réduire la dose d'irradiation reçue
d) la distance à la source a un impact négligeable sur la dose d'irradiation reçue
e) les protège-seringues en plomb protègent l'opérateur des rayonnements lors de l'injection de radiopharmaceutiques marqués au Tc-99m

34) QRU. Lors d'une épreuve d'endurance, le métabolisme d'un sportif libère une énergie thermique d'environ 10^3 kJ par rapport au repos. Calculer la masse d'eau produite par la transpiration qui permettrait de compenser cette énergie.
On donne : Chaleur latente de vaporisation de l'eau : L = 2450 kJ/kg

a) 20,4 g
b) 132 g
c) 408 g
d) 815 g
e) 1,24 kg

35) QRM. On considère un radionucléide père de période 310 jours qui se désintègre en un radionucléide fils, lui-même radioactif avec une période de 25 jours. Le radionucléide fils se désintègre ensuite en un noyau stable.
À l'instant initial, l'échantillon contient uniquement des noyaux pères. La filiation est supposée directe.

a) l'activité du radionucléide fils est nulle à l'instant initial
b) un équilibre transitoire peut s'établir entre les deux radionucléides
c) l'activité du radionucléide père diminue exponentiellement au cours du temps
d) à l'équilibre, l'activité du radionucléide fils est inférieure à celle du père
e) à l'équilibre, les activités des deux radionucléides diminuent au cours du temps

Clara SANCHEZ (clarasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

36) QRM. Lors d'un test respiratoire, on recueille les gaz expirés par un patient pendant 30 cycles respiratoires. Le patient expire 0,6 L d'air à pression atmosphérique à chaque cycle.

Composition de l'air expiré : 75% N_2, 15% O_2, 5% CO_2 et 5% H_2O
Température de l'air expiré : 300 K
Pression atmosphérique : 10^5 Pa
Constante des gaz parfaits : R = 8 $Pa.m^3.mol^{-1}.K^{-1}$

a) le volume total d'air expiré par le patient est de 18 L
b) la pression partielle en oxygène de l'air expiré est de 15 kPa
c) la pression partielle en vapeur d'eau de l'air expiré est de 5 kPa
d) la pression partielle en dioxyde de carbone de l'air expiré est de 95 kPa
e) la quantité totale de dioxyde de carbone expiré par le patient est de 17 mmol

37) QRM. A propos des propriétés des noyaux atomiques en RMN :

a) le proton possède un spin nucléaire égal à 1/2
b) le proton possède un spin nucléaire égal à 3/2
c) en présence d'un champ magnétique statique et uniforme, les protons peuvent occuper deux niveaux d'énergie distincts
d) en présence d'un champ magnétique statique et uniforme, les moments magnétiques nucléaires sont en phase
e) en présence d'un champ magnétique statique et uniforme, deux noyaux possédant des rapports gyromagnétiques différents ont des fréquences de Larmor différentes

38) QRM. On réalise une IRM à 1,5 T du genou en écho de spin classique. Les temps de relaxation de plusieurs tissus sont donnés dans le tableau suivant :

Tissu biologique	***T1 (ms)***	***T2 (ms)***
Graisse	*260*	*85*
Muscle squelettique	*1010*	*40*
Cartilage	*1050*	*50*

a) en pondération T1, la graisse apparaît en hypersignal par rapport au cartilage
b) en pondération T2, le cartilage apparaît en hyposignal par rapport au muscle
c) en pondération T2, le muscle apparaît en hypersignal par rapport à la graisse
d) le muscle apparaît en hypersignal par rapport au cartilage, quelle que soit la pondération T1 ou T2
e) le cartilage apparaît en hyposignal par rapport à la graisse, quelle que soit la pondération T1 ou T2

Cédric ANCIEZ (cdrm2021@gmail.com) - Groupe MEDISUP - ideasarchive

39) QRM. Une onde lumineuse se propage dans un milieu transparent d'indice élevé et rencontre obliquement l'interface avec un milieu transparent d'indice plus faible :

a) l'onde réfléchie possède la même direction de propagation que l'onde incidente
b) l'onde réfractée a une fréquence plus élevée que l'onde incidente
c) l'angle de réfraction est supérieur à l'angle d'incidence
d) l'onde réfractée et l'onde réfléchie ont la même longueur d'onde
e) une réflexion totale peut se produire si l'angle d'incidence est suffisamment élevé

PARTIE INITIATION AUX MÉDICAMENTS

40) QRM. La fluoxétine, une substance active inhibitrice du transporteur de la sérotonine (SERT)

a) bloque la recapture de la sérotonine par le neurone pré-synaptique
b) augmente la concentration de sérotonine dans la fente synaptique
c) bloque la neurotransmission sérotoninergique
d) augmente le stockage de la sérotonine dans le neurone post-synaptique
e) bloque l'entrée d'ions dans le neurone pré-synaptique

41) QRM. L'activation des récepteurs canaux

a) à perméabilité cationique entraîne une dépolarisation cellulaire
b) à perméabilité cationique entraîne un potentiel post-synaptique inhibiteur
c) à perméabilité anionique entraîne une hyperpolarisation cellulaire
d) à perméabilité anionique entraîne un potentiel post-synaptique excitateur
e) entraîne une activation directe d'une protéine G

42) QRM. Un antagoniste non compétitif

a) modifie la conformation du récepteur
b) produit un effet opposé à celui de l'agoniste physiologique
c) se fixe sur le même site de liaison que l'agoniste physiologique
d) diminue l'effet maximal induit par l'agoniste physiologique
e) a un effet qui peut être surmonté en augmentant suffisamment la concentration d'agoniste

Céa ANRHEZ (ceasandra...@gmail.com) Groupe MEDISUP

43) QRM. Les substances actives agissant sur des récepteurs reliés à une activité enzymatique de type kinase peuvent

a) se fixer sur un site de liaison extracellulaire
b) inhiber l'activité enzymatique du récepteur
c) être des anticorps thérapeutiques
d) s'opposer à la fixation de l'agoniste physiologique
e) induire des effets avec une cinétique de l'ordre de la milliseconde

44) QRM. L'effet pharmacologique d'un inhibiteur enzymatique peut être dû à

a) une diminution de la concentration du produit de la réaction enzymatique
b) une augmentation de la concentration du produit de la réaction enzymatique
c) une diminution de la concentration du substrat de la réaction enzymatique
d) une augmentation de la concentration du substrat de la réaction enzymatique
e) l'inhibition de la fixation de l'agoniste physiologique

45) QRM. L'activation des récepteurs couplés aux protéines G par un agoniste

a) inactive la protéine G
b) est associée à la production de seconds messagers
c) active une phospholipase C si le récepteur est couplé à une protéine Gq
d) active une adénylate cyclase si le récepteur est couplé à une protéine Gi
e) conduit à la translocation de la sous-unité α de la protéine G dans le noyau

46) QRU. Une substance active a un KD de 1 nM pour les récepteurs dopaminergiques D2, 50 nM pour les récepteurs sérotoninergiques 5HT2, 100 nM pour les récepteurs histaminergiques H1, on en déduit que

a) ce principe actif ne se fixe pas sur les récepteurs D2
b) lorsque ce principe actif se fixe sur 1 récepteur D2, il se fixe également sur 100 récepteurs H1
c) ce principe actif a une affinité plus grande pour les récepteurs H1 que pour les récepteurs 5HT2
d) ce principe actif a une affinité plus grande pour les récepteurs 5HT2 que pour les récepteurs D2
e) ce principe actif pourra induire des effets indésirables via la liaison aux récepteurs D2 si les effets thérapeutiques recherchés de ce principe actif sont liés à la liaison aux récepteurs 5HT2

Cléa SANCHEZ (cleasanchez20@gmail.com) - Groupe MEDISUP

47) QRM. La comparaison des concentrations 50 (CE50) d'un principe actif vis-à-vis de plusieurs récepteurs

a) est possible grâce à la réalisation de courbes effet-concentration du principe actif
b) permet de caractériser la sélectivité de ce principe actif vis-à-vis de ces récepteurs
c) permet de déterminer que ce principe actif est un agoniste partiel de ces récepteurs
d) permet de déterminer que ce principe actif est un agoniste inverse de ces récepteurs
e) est un élément qui permet de prévoir les effets thérapeutiques et indésirables

48) QRM. À propos de la définition du médicament selon le Code de la santé publique

a) un produit possédant une action curative sur une maladie est un médicament
b) une substance sans autorisation de mise sur le marché peut être qualifiée de médicament
c) un médicament peut être destiné à établir un diagnostic médical
d) tout médicament doit répondre simultanément aux définitions du médicament par présentation et du médicament par fonction
e) une substance présentée comme permettant de prévenir l'apparition d'une maladie chez un individu sain ne peut pas être considérée comme un médicament

49) QRM. Concernant les spécialités pharmaceutiques génériques

a) les génériques possèdent la même composition qualitative et quantitative en substances actives que leur médicament de référence
b) les génériques sont commercialisés sous la même dénomination que le médicament de référence
c) les études de bioéquivalence permettent d'éviter de répéter les essais cliniques complets d'efficacité réalisés pour le médicament de référence
d) les antibiotiques ne peuvent pas faire l'objet d'une version générique
e) les génériques sont développés après le retrait du marché du médicament de référence

Cléa SANCHEZ (cleasanchez04@gmail.com) - Groupe MEDISUP

50) QRM. Concernant la dénomination des médicaments

a) la dénomination commune internationale (DCI) d'une substance active est attribuée par le laboratoire pharmaceutique qui la commercialise
b) toutes les spécialités pharmaceutiques contenant une même substance active possèdent la même dénomination commerciale
c) une spécialité pharmaceutique peut porter un nom commercial ne permettant pas d'identifier directement sa substance active
d) des spécialités possédant la même dénomination commune internationale (DCI) présentent toutes les mêmes dosages et formes pharmaceutiques
e) les ressemblances entre certaines dénominations communes internationales (DCI) sont intentionnelles et facilitent l'identification de substances actives apparentées

51) QRM. Concernant les substances vénéneuses

a) une substance vénéneuse peut posséder des propriétés thérapeutiques lorsqu'elle est utilisée dans des conditions appropriées
b) les médicaments relevant de la liste I présentent des conditions de délivrance plus strictes que ceux relevant de la liste II
c) tout médicament stupéfiant est destiné au traitement des troubles psychiques
d) toute substance vénéneuse est psychotrope
e) les médicaments stupéfiants présentent un risque de dépendance

52) QRM. Concernant les notions de dose et de dosage

a) le dosage correspond à la quantité de substance active administrée à un patient lors d'une prise
b) le dosage peut être adapté individuellement aux besoins de chaque patient
c) le dosage d'un comprimé correspond à la masse de substance active contenue par comprimé
d) deux solutions buvables contenant la même substance active et au même dosage peuvent être administrées avec la même pipette
e) une crème conditionnée dans un tube constitue généralement une présentation unidose

Cléa SANCHEZ (cleasanchez06@gmail.com) - Groupe MEDISUP

53) QRU. Concernant les gélules

a) leur dosage correspond au nombre de gélules prises par le patient en une fois
b) leur dosage correspond à la masse totale de la gélule
c) ce sont des formes pharmaceutiques multidoses
d) ce sont des formes pharmaceutiques semi-solides
e) elles peuvent contenir une substance active sous forme de poudre

54) QRM. La voie orale

a) permet généralement une administration simple et non invasive des médicaments
b) expose de nombreux médicaments à un effet de premier passage hépatique
c) permet l'administration de comprimés, de gélules et de solutions buvables
d) peut permettre d'obtenir un effet thérapeutique systémique
e) permet uniquement d'obtenir un effet thérapeutique local au niveau du tube digestif

55) QRM. Concernant les formes pharmaceutiques et leurs voies d'administration

a) les comprimés sublinguaux permettent l'administration d'une substance active par la muqueuse buccale
b) les ovules médicamenteux sont principalement destinés à une administration par voie rectale
c) les suppositoires peuvent permettre l'administration de substances actives destinées à exercer un effet systémique
d) certaines poudres médicamenteuses sont destinées à être inhalées à l'aide d'un dispositif adapté
e) les formes semi-solides sont réservées à une administration par voie cutanée

Cléa SANCHEZ (cleasanchez704@gmail.com) - Groupe MEDISUP