# Initiation aux médicaments · ECB n°1 — tips réflexes (Q40–55)

ECB n°1 du 17 octobre 2026 · Module 1 · verdicts vérifiés sur le corrigé Médisup · ✓ = validé, ✗ = éliminé · ligne vide = pas de tip sûr

| Q | Tip réflexe | Tranche |
|---|---|---|
| 40 | Bloquer un transporteur de recapture ⇒ le neurotransmetteur s'accumule dans la fente ⇒ transmission renforcée, jamais bloquée. Le SERT est un symport $Na^+/Cl^-$ : le bloquer bloque aussi cette entrée d'ions. | ✓A ✓B ✗C ✓E |
| 41 | Récepteur-canal : entrée de cations ⇒ dépolarisation ⇒ PPSE ; entrée d'anions ⇒ hyperpolarisation ⇒ PPSI ; aucune protéine G. | ✓A ✗B ✓C ✗D ✗E |
| 42 | Non compétitif = autre site (allostérique), $E_{max}$ diminué, insurmontable par excès d'agoniste. Un antagoniste n'a pas d'effet propre (l'effet opposé, c'est l'agoniste inverse). | ✓A ✗B ✗C ✓D ✗E |
| 43 | Cinétique des récepteurs : canaux = milliseconde, RCPG = secondes-minutes, récepteurs-enzymes = heures. | ✗E |
| 44 | Inhibiteur enzymatique : le substrat s'accumule, le produit baisse. Empêcher la fixation d'un agoniste, c'est le travail d'un antagoniste de récepteur. | ✓A ✗B ✗C ✓D ✗E |
| 45 | Agoniste ⇒ protéine G activée ; $G_s$ active l'adénylate cyclase, $G_i$ l'inhibe, $G_q$ active la PLC ; la sous-unité α reste à la membrane. | ✗A ✓C ✗D ✗E |
| 46 | $K_D$ petit = affinité forte : D2 (1 nM) > 5HT2 (50) > H1 (100). Un $K_D$ compare des affinités, pas des nombres de récepteurs. | ✗A ✗B ✗C ✗D ✓E |
| 47 | CE50 = puissance : elle ne dit rien de la nature de l'agoniste (partiel, inverse). | ✗C ✗D |
| 48 | Définition par présentation OU par fonction : une seule suffit. Diagnostic et prévention entrent dans la définition ; l'AMM n'est pas une condition pour être un médicament. | ✓A ✓B ✓C ✗D ✗E |
| 49 | Générique = même composition qualitative et quantitative en substance active, bioéquivalence, commercialisé à l'expiration du brevet, princeps toujours en vente. | ✓A ✓C ✗E |
| 50 | DCI = OMS ; les segments communs (-olol, -pril…) signalent une famille. Contre-exemples aux « toutes » : Doliprane® et Efferalgan® (même DCI, noms différents) ; paracétamol 500 et 1 000 mg. | ✗A ✗B ✗D ✓E |
| 51 | Contre-exemple : la morphine, stupéfiant antalgique ⇒ pas « tout stupéfiant pour troubles psychiques ». Liste I plus stricte que liste II. | ✓B ✗C |
| 52 | Dose = ce qu'on administre (adaptable au patient) ; dosage = quantité de substance active par unité (fixe). Tube = plusieurs applications ⇒ multidose. | ✗A ✗B ✓C ✗E |
| 53 | Gélule = forme solide et unitaire ; dosage = substance active par gélule. QRU : 4 items éliminés. | ✗A ✗B ✗C ✗D ✓E |
| 54 | « Uniquement » local : contre-exemple, le paracétamol oral agit à distance (effet systémique). | ✗E |
| 55 | Ovule = voie vaginale ; semi-solides aussi par voie vaginale ou rectale (contre-exemple à « réservées »). | ✗B ✗E |