Chimie · Thermodynamique — mémo

Module 2 · FC5-FC6 · résoudre les QCM : la démarche au crayon

Devant chaque item ① je repère son **type** (A à K) · ② j'écris au crayon ce que la démarche demande · ③ je compare à l'item et je tranche. Quand tout passe, l'item est vrai. Les lettres sont les mêmes que dans « pièges et méthodes » et dans le cahier.

A fonction d'état, cycle · **B** absorbe ou dégage (ΔH) · **C** type de système · **D** calcul de ΔU · **E** « à … constant » · **F** signe de ΔS · **G** formules de G, H · **H** spontanéité, K · **I** déplacement d'équilibre · **J** unités, 0 K, intensif · **K** un nombre à recalculer

Énoncé commun (réaction + données) : je l'annote **une seule fois** avant les items : `sens direct (gauche → droite) : forme …` · `ΔH positif = endo / négatif = exo` · `moles de gaz : … à gauche → … à droite` · `ΔH … et ΔS …`. Les items se tranchent ensuite avec F, H et I.

A La grandeur est-elle une fonction d'état ? Q, W, U, H, S, G · cycle

Démarche au crayon

1. je souligne la grandeur : `Q, W` ou `U, H, S, G`
2. `U, H, S, G` = fonctions d'état : leur variation ne dépend que du départ et de l'arrivée ; retour au départ ⇒ `Δ = 0`
3. `Q, W` : dépendent du chemin ; sur un cycle, **pas forcément nuls** (on écrit δQ, δW)
4. « variation nulle sur un cycle » ≠ « constante pendant le cycle » : la valeur bouge en route

🧠 **Pour retenir** · Q et W sont des **péages** : ils dépendent de l'itinéraire. L'**altitude** (U, H, S, G) revient à sa valeur quand on rentre au parking, même si elle a varié en route.

✎ **Exemple** « Sur un cycle, la chaleur échangée est nulle » → `Q → pas fonction d'état → pas forcément nulle` → **× faux**

C Quel type de système ? ouvert, fermé, isolé

Démarche au crayon

1. le système peut-il échanger de l'**énergie** (chaleur ou travail) ? de la **matière** (molécules qui entrent ou sortent) ?
2. je lis la ligne de la matrice et je compare à l'item

	peut échanger de l'énergie ? chaleur, travail	peut échanger de la matière ? molécules
Ouvert	✓	✓
Fermé	✓	×
Isolé	×	×

À savoir · vivant = ouvert · pile, frigo en marche = fermé · thermos, calorimètre = isolé

🧠 **Pour retenir** · **F**ermé = fenêtre fermée : la chaleur passe, pas l'air. **I**solé = thermos. **O**uvert = toi : tu manges.

✎ **Exemple** « Un système isolé échange de l'énergie mais pas de matière » → `isolé : énergie ✗` → **× faux** (c'est le fermé)

B La transformation absorbe-t-elle ou dégage-t-elle de la chaleur ? signe de ΔH, endo, exo, sens inverse

Démarche au crayon

1. j'écris la flèche **connue** : celle de l'énoncé (A → B, ΔH donné) ou du cours (solide → liquide → gaz : ΔH positif)
2. j'écris la flèche **de l'item** : pareille → je garde le signe ; opposée → je change le signe (même valeur)
3. je traduis : `positif = endothermique = absorbe` · `négatif = exothermique = dégage` · `0 = athermique = aucun échange`

→ la chaleur **entre** : ΔH positif · fusion, vaporisation, sublimation

solide ⇄ **liquide** ⇄ **gaz**

← la chaleur **sort** : ΔH négatif · solidification, liquéfaction

À savoir · combustions : exothermiques · formation du glucose : endothermique · hydrolyse d'un ester : athermique

🧠 **Pour retenir** · **ENDO** = ça rentre **DEDANS** ; **EXO** = ça sort (EXit).

✎ **Exemple** « La condensation d'une vapeur absorbe de la chaleur » → `connue liquide → gaz (positif), item gaz → liquide : opposée → négatif → dégage` → **× faux**

D Combien vaut ΔU ? je le recalcule avec les signes, je ne le juge pas

Démarche au crayon

1. je me mets **dans le système** : ce qui entre est `+`, ce qui sort est `−` (matrice)
2. j'écris `ΔU = (±Q) + (±W)` ; à pression constante `W = −P·ΔV` (litres ÷ 1 000 → m³)
3. je compare le **signe** d'abord, puis la valeur

🧠 **Pour retenir** · Le système est un **porte-monnaie** : ce qui entre est un gain, ce qui sort une dépense. Deux pertes s'additionnent ; un gain et une perte se soustraient.

	+ ça entre dans le système	− ça sort du système
Q chaleur	reçoit, absorbe	cède, perd, dégage, dissipe
W travail	reçoit, nécessite, est comprimé	fournit, effectue, se détend

✎ **Exemple** « Un moteur fournit 30 kJ de travail et perd 10 kJ de chaleur : ΔU = +40 kJ » → `W = −30 ; Q = −10 → ΔU = −40` → **× faux**

la suite : E à K · tourner la page

Chimie · Thermodynamique — mémo (suite)

Module 2 · FC5-FC6 · conditions, entropie, enthalpie libre

E L'item dit « à … constant » : quelle relation ? V, P, T constants · cycle · réversible

Démarche au crayon

1. je souligne ce qui est **constant**
2. je me demande ce qui **vaut 0** et je le barre dans `ΔU = Q + W`
3. je lis ce qui reste et je compare à l'item, lettre par lettre (U ou H ?)

À savoir · **réversible** = on peut revenir en arrière à tout moment ⇒ infiniment lent, double flèche ⇄ · **irréversible** = rapide, spontané, simple flèche (précipitation, dénaturation)

🧠 **Pour retenir** · Deux couples à ne pas croiser : **V** constant ↔ Q = Δ**U** ; **P** constante ↔ Q = Δ**H** (H comme « habituel » : les réactions courantes se font à P constante).

constant	ce qui vaut 0	il reste
volume	**W = −P × 0**	Q = ΔU
pression	rien	Q = ΔU + PΔV = ΔH
température (gaz parfait)	**ΔU (U = 3/2 RT)**	Q = −W
cycle	**ΔU (retour au départ)**	Q = −W
solides, liquides	**PΔV ≈ 0**	ΔH ≈ ΔU

✎ **Exemple** « À volume constant, la chaleur échangée vaut ΔH » → `volume constant → W = 0 → Q = ΔU` → **× faux**

F ΔS positif ou négatif ? désordre

Démarche au crayon

1. j'écris l'état de chaque espèce : `(g) = gaz · (l) = liquide · (s) = solide`
2. des gaz ? je compte les moles des seules espèces `(g)` : `moles de gaz : … à gauche → … à droite` ; plus de gaz ⇒ ΔS positif
3. pas de gaz ? je place départ et arrivée sur l'échelle : vers la droite ⇒ ΔS positif
4. je traduis l'item : désordre ↑ = ΔS positif = ordre ↓

solide ⟶ **liquide** ⟶ **gaz** **ΔS positif**

de plus en plus désordonné · dans l'autre sens ⟵ : ΔS négatif

🧠 **Pour retenir** · Une chambre d'ado : le désordre vient tout seul (S ↑), ranger coûte (S ↓).

✎ **Exemple** « $C_6H_{12}O_6(l)$ → 2 $C_2H_5OH(l)$ + 2 $CO_2(g)$ crée du désordre » → `moles de gaz : 0 à gauche → 2 à droite → ΔS positif` → ✓ **vrai**

G La formule est-elle exacte ? H, G, Δ

Démarche au crayon

1. j'écris la chaîne : `H = U + PV` puis `G = H − TS`
2. avec des Δ partout : `ΔG = ΔH − TΔS` ; je réarrange si besoin (`ΔH = ΔG + TΔS`)
3. je vérifie la **lettre** (H, ou U + PV), le **signe**, la présence du **Δ**

U $\xrightarrow{+PV}$ **H** $\xrightarrow{-TS}$ **G**

À savoir · changement d'état réversible : `ΔS = ΔH ÷ T` · relation de Gibbs : `ΔU = TΔS − PΔV` · potentiel chimique : `μ = (∂G/∂n) à p, T constants` ($J \cdot mol^{-1}$)

🧠 **Pour retenir** · G = H **moins** TS : le désordre fait une **remise** sur le prix ΔH.

✎ **Exemple** « H = G − TS » → `G = H − TS ⇒ H = G + TS` → **× faux** (signe)

H La réaction est-elle spontanée ? Que vaut K ? ΔG, exergonique, ΔG° et K

Démarche au crayon

1. l'item parle de **chaleur** (exo, endo : signe de ΔH seul) ou de **spontanéité** (exergonique : ΔG < 0) ?
2. j'écris les signes de ΔH et ΔS et je lis la case de la matrice
3. signes de même nature seulement : `ΔH × 1 000 (en J)`, puis `T d'inversion = ΔH ÷ ΔS` et je situe T
4. K : `ΔG° = −RT ln K` ⇔ `K = e^(−ΔG°/RT)` ; je lis la règle ci-dessous

À savoir · ΔG < 0 : exergonique, spontanée dans le sens direct (→) · ΔG > 0 : endergonique, possible dans le sens inverse (←) · ΔG = 0 : équilibre (c'est ΔG, pas ΔG°)

🧠 **Pour retenir** · ΔG = ΔH − TΔS : le **prix** moins la **remise** du désordre, d'autant plus grande qu'il fait chaud.

	ΔS positif désordre ↑	ΔS négatif ordre ↑
ΔH négatif exo	**toujours spontanée**	spontanée à **basse T**
ΔH positif endo	spontanée à **haute T**	**jamais spontanée**

ΔG° < 0	ΔG° = 0	ΔG° > 0
K > 1 · produits	K = 1	0 < K < 1 · réactifs

K est une exponentielle : jamais nulle, jamais négative. Sans unité ; ne dépend que de T.

✎ **Exemple** ΔH = −80 $kJ \cdot mol^{-1}$, ΔS = +90 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$: « ΔG est négatif » → `ΔH négatif et ΔS positif → case « toujours »` → ✓ **vrai**, sans calcul

la suite : I à K et les grandes lignes · tourner la page

Chimie · Thermodynamique — mémo (fin)

Module 2 · FC6 · équilibres, restitution, calculs

I Où va l'équilibre ? K change-t-il ? Le Chatelier, Van't Hoff

Démarche au crayon

1. j'annote : `sens direct : ΔH …` · `moles de gaz : … à gauche → … à droite`
2. j'applique la ligne de la matrice correspondant à la perturbation
3. je **nomme l'espèce formée** dans ce sens et je compare à l'item
4. K ne change que si **T** change : endo ⇒ K ↑ quand T ↑ ; exo ⇒ K ↓

🧠 **Pour retenir** · Le système est **contrariant** : on chauffe, il absorbe ; on comprime, il réduit ses moles de gaz ; on ajoute, il consomme ; on retire, il reproduit.

on…	l'équilibre va vers	K change ?
chauffe	le sens **endothermique**	oui
refroidit	le sens **exothermique**	oui
comprime	le côté avec **moins de moles de gaz** (autant de chaque côté : rien)	non
ajoute X	**consommer** X (solide ajouté : rien)	non
retire X	**reformer** X	non
catalyseur hors poly	rien	non

✎ **Exemple** $C_6H_{12}O_6 \rightleftarrows 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2(g)$: « retirer du CO_2 favorise le glucose » → `retrait de CO₂ → le reformer → sens direct → forme éthanol + CO₂` → **× faux**

J Unité, 0 K, intensive, équilibre ? restitution

Démarche au crayon

1. une **unité** : je la refais à partir de la formule ($S = Q/T \rightarrow J \cdot K^{-1}$)
2. une **grandeur** : s'additionne ? oui = extensive, non = intensive
3. une **température** : S = 0 à **0 K** (−273 °C), jamais de K négatif

	extensive ?	unité SI
U, S	✔	J · $J \cdot K^{-1}$ ($\cdot mol^{-1}$)
m, V, n	✔	kg · m^3 · mol
T, P	✖	K · Pa
G, H, Q, W	—	J
μ · K	—	$J \cdot mol^{-1}$ · sans unité

À savoir · équilibre = **dynamique** (deux réactions à vitesses égales) · stable = énergie minimale ; métastable = durée de vie limitée · temps, vitesse = cinétique, hors thermo

✎ **Exemple** « ΔG s'exprime en kJ/K » → `G = H − TS : unité de H → J` → **× faux**

K L'item donne un nombre je le recalcule, je ne le juge pas

on calcule…	j'écris
ΔG	`ΔH × 1 000 (J) − T·ΔS`
T d'inversion	`ΔH(J) ÷ ΔS`
ΔS (ΔH et ΔG connus)	`TΔS = ΔH − ΔG`
ΔS (changement d'état)	`ΔH(J) ÷ T(K)`
W (P constante)	`−P × ΔV(m³)`
Q (eau)	`m(g) × 1 × ΔT → cal ; × 4,18 → J`
calorimètre, 1 L d'eau	`1 °C ⇔ 1 kcal ; 0,24 °C ⇔ 1 kJ`
Hess	`retourner (− signe), additionner`
sens d'évolution	`Q < K → sens direct ; Q > K → inverse`
K_p et K_c	`Kp = Kc·(RT)^Δn ; Δn = 0 → égales`
PV = nRT	`°C + 273 → K ; L ÷ 1 000 → m³`

🧠 **Pour retenir** · Avant tout calcul : **kJ → J**, **°C → K**, **L → m³**. 1 mol à 300 K et 10^5 Pa ≈ 25 L.

✎ **Exemple** « Fusion à 250 K, ΔH = 5 $kJ \cdot mol^{-1}$: ΔS = 20 $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ » → `5 000 ÷ 250 = 20` → ✔ **vrai**

QRM Une question complète, rubrique par rubrique énoncé commun annoté une fois, puis F, H, I

Vaporeformage du méthane à l'état standard :
$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftarrows CO(g) + 3\ H_2(g)$ · $\Delta_rH° = +206\ kJ \cdot mol^{-1}$ · $\Delta_rS° = +215\ J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

A. La réaction est exothermique dans le sens de formation de H_2.
B. La formation de H_2 s'accompagne d'une augmentation d'entropie.
C. À 300 K, la réaction est spontanée dans le sens de formation de H_2.
D. Une augmentation de pression favorise la formation de CO.
E. Une augmentation de température augmente la constante d'équilibre.

Annotation : sens direct (→) : forme CO, H_2 · ΔH positif = endo · moles de gaz : 2 à gauche → 4 à droite · ΔH positif et ΔS positif · T d'inversion = 206 000 ÷ 215 ≈ 960 K
A (rubrique B) : sens direct endo → ✗
B (rubrique F) : moles de gaz 2 → 4 → ΔS positif → ✓
C (rubrique H) : case « haute T », 300 K < 960 K → ✗
D (rubrique I) : P ↑ → moins de gaz → sens inverse (←) → consomme CO → ✗
E (rubrique I) : endo → K ↑ si T ↑ → ✓ · **Réponse : BE**

fil Les grandes lignes du cours le fil, sans le détail

Q, W échangés → 1er principe : ΔU = Q + W → H = U + PV → 2nd : S, sens d'évolution → G = H − TS → $K = e^{-\Delta G°/RT}$ → Le Chatelier

- **1er principe** : l'énergie se conserve ; il compte, il ne dit pas dans quel sens ça va.
- **2nd principe** : il donne le sens ; système isolé : $\Delta S \geq 0$.
- **3e principe** : S = 0 à 0 K pour un corps parfaitement ordonné.
- **ΔH° de formation des corps simples = 0** (O_2, H_2, C, N_2 à l'état naturel) : la référence.
- travail → chaleur : conversion totale possible ; chaleur → travail : une partie seulement.
- à l'**équilibre** : ΔG = 0, Q = K, μ égaux ; la matière va vers le μ le plus faible.
- **stable** = énergie minimale ; **métastable** = durée de vie limitée, peut basculer.
- K_p pour les gaz, K_c pour les solutés ; solides et liquides exclus.

🧠 **Pour retenir** · Le 1er principe est le **comptable**, le 2nd la **boussole**, G le **juge**, Le Chatelier le **contrariant**.