Adaptation cardiovasculaire à l'effort

Physiologie · Module 1 · Fiche de cours n°17 — récapitulatif de dernière relecture

★ = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles) · ◆ = passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Une ligne par passage étoilé de la fiche de cours, dans l'ordre du cours.

1	★	**Le volume d'éjection systolique (VES) s'élève de + 50 % à l'effort.**	*p.4*
2	★★	**À l'effort, on observe une vasodilatation des artères coronaires.**	*p.5*
3	★★	**À l'effort, on observe une vasoconstriction rénale.**	*p.5*
4	★	**À l'effort, on observe une vasoconstriction splanchnique.**	*p.5*
5	★	**À l'exercice, le débit cardiaque est de 25 000 mL, dont 84 % pour les muscles.**	*p.5*
6	★	**À l'effort, la PAS (pression artérielle systolique) connaît une élévation importante.**	*p.5*
7	★	**La levée du freinage parasympathique est un mécanisme neurologique de l'adaptation à l'effort, parallèle à l'activation motrice (co-activation centrale, irradiation corticale).**	*p.7*
8	★★	**L'augmentation de l'activité sympathique est un mécanisme neurologique de l'adaptation à l'effort, via les afférences musculaires (mécanorécepteurs de type III, chémorécepteurs de type IV).**	*p.7*
9	★	**Les commandes hormonales de l'adaptation à l'effort sont les catécholamines circulantes : adrénaline et noradrénaline.**	*p.9*
10	★	**La principale substance vasodilatatrice produite par l'endothélium est le monoxyde d'azote (= NO).**	*p.9*
11	★	**La contraction musculaire entraîne une production locale de métabolites vasodilatateurs, responsable d'une vasodilatation plus ou moins importante des muscles actifs.**	*p.10*