pH et équilibre acido-basique · Pièges et méthodes

BMI · Module 2 · FC1 · méthode pour répondre

Les cinq pièges

- **A** Respiratoire et métabolique sont échangés
- **B** Cause et compensation sont échangées
- **C** Le tampon ou la forme qui prédomine est mal lu
- **D** Le mot ou la formule est inversé
- **E** Le pH est faux d'un facteur

A · Respiratoire et métabolique sont échangés

rubrique A du mémo · « le patient souffre d'acidose, d'alcalose… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Où est le pH (normal : 7,35 à 7,45) ?

pH < 7,35 → acidose
pH > 7,45 → alcalose
pH normal, mais PCO_2 et $[HCO_3^-]$ anormales → désordre totalement compensé : l'énoncé (maladie, symptôme) désigne le trouble de départ

❷ Quelle valeur anormale va dans le sens du pH ? (PCO_2 qui monte acidifie ; $[HCO_3^-]$ qui monte alcalinise)

acidose et PCO_2 > 45 mmHg → acidose respiratoire
acidose et $[HCO_3^-]$ < 22 mmol/L → acidose métabolique
alcalose et PCO_2 < 35 mmHg → alcalose respiratoire
alcalose et $[HCO_3^-]$ > 26 mmol/L → alcalose métabolique

❸ Et l'autre valeur ?

normale → désordre pur
anormale, dans le même sens que la première (les deux montent ou les deux baissent) → c'est la compensation : partiellement compensé si le pH reste anormal

❹ L'item dit-il le même trouble ?

oui (acidose ou alcalose, respiratoire ou métabolique, pur ou compensé) → ✓ vrai
non → × faux

À SURVEILLER · LA COMPENSATION PRISE POUR LA CAUSE

Le bilan est juste mais le trouble nommé est le mauvais : la valeur qui compense est prise pour la cause (une PCO_2 élevée dans une alcalose métabolique fait dire « acidose respiratoire »), ou un bilan compensé est lu comme normal.

respiratoire ↔ métabolique · acidose ↔ alcalose · pur ↔ compensé · compensé ≠ normal

« pH 7,25 · PCO_2 58 mmHg · $[HCO_3^-]$ 25 mmol/L : acidose respiratoire pure. »

❶ 7,25 < 7,35 → acidose
❷ PCO_2 ↑ va dans son sens → respiratoire
❸ HCO_3^- normale → pur
❹ même chose

✓ **Vrai**

« pH 7,29 · PCO_2 30 mmHg · $[HCO_3^-]$ 14 mmol/L : acidose respiratoire. »

❶ acidose
❷ HCO_3^- ↓ va dans son sens → métabolique
❹ mot échangé

× **Faux** — métabolique

« pH 7,48 · PCO_2 50 mmHg · $[HCO_3^-]$ 36 mmol/L : acidose respiratoire. »

❶ 7,48 > 7,45 → alcalose
❷ HCO_3^- ↑ → métabolique
❸ PCO_2 ↑ = compensation
❹ faux

× **Faux** — alcalose métabolique

« Diabétique · pH 7,41 · PCO_2 28 mmHg · $[HCO_3^-]$ 17 mmol/L : acidose métabolique totalement compensée. »

❶ pH normal, deux valeurs anormales → compensé ; diabète → métabolique
❹ même chose

✓ **Vrai**

B · Cause et compensation sont échangées

rubrique B du mémo · « peut permettre de compenser la variation de pH »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Quel organe compense ?

trouble respiratoire (cause : les poumons) → compensation par les reins : lente (heures, jours), importante
trouble métabolique (cause : les reins, un acide, une perte) → compensation par les poumons : rapide, mais limitée

❷ Dans quel sens ? La compensation fait varier l'autre valeur dans le même sens que la première.

acidose respiratoire (PCO_2 monte) → [HCO_3^-] monte : réabsorption rénale des HCO_3^-

alcalose respiratoire (PCO_2 baisse) → [HCO_3^-] baisse : élimination rénale des HCO_3^-

acidose métabolique ([HCO_3^-] baisse) → PCO_2 baisse : hyperventilation

alcalose métabolique ([HCO_3^-] monte) → PCO_2 monte : hypoventilation

❸ L'item parle-t-il de la cause ou de la compensation ?

cause = ce qui a fait bouger la première valeur → hypoventilation, pneumonie : acidose respiratoire · hyperventilation, hypoxie, stress : alcalose respiratoire · diabète, diarrhée : acidose métabolique · vomissements, pertes rénales : alcalose métabolique
compensation → le geste de ❷

❹ L'item dit-il la même chose ?

oui (même organe, même sens, même rôle) → ✓ vrai
non → × faux

À SURVEILLER · UN SENS, UN ORGANE OU UNE VITESSE INVERSÉS

La compensation est donnée dans le mauvais sens (réabsorption au lieu d'élimination, hyper- au lieu d'hypoventilation), par le mauvais organe, à la mauvaise vitesse, ou la cause est présentée comme une compensation.

réabsorption ↔ élimination
hyper- ↔ hypoventilation
rapide ↔ lente
cause ↔ compensation

« Acidose métabolique : une hyperventilation peut permettre de compenser la variation de pH. »

```
❶ métabolique → poumons
❷ HCO₃⁻ ↓ → PCO₂ ↓ : hyperventilation
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

« Alcalose respiratoire : une réabsorption rénale des HCO_3^- peut compenser. »

```
❶ respiratoire → reins
❷ PCO₂ ↓ → HCO₃⁻ ↓ : élimination
❹ sens inversé
```

× **Faux** — élimination

« Acidose respiratoire : la compensation rénale ramène le pH en quelques minutes. »

```
❶ respiratoire → reins : lente (heures, jours)
❹ vitesse fausse
```

× **Faux** — lente

« Alcalose métabolique : des vomissements répétés peuvent en être la cause. »

```
❸ cause : pertes d'acides (vomissements)
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

C · Le tampon ou la forme qui prédomine est mal lu

rubrique C du mémo · « solution tampon, la forme acide prédomine »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Est-ce un tampon ?

un acide faible et sa base faible conjuguée, en proportions proches → oui
deux acides, deux bases, un acide fort et une base forte, deux espèces non conjuguées → non
un acide faible et moins de base forte que d'acide (ex. volume V et V/2, même concentration) → oui : il reste de l'acide et il s'est formé sa base
autant ou plus de base forte que d'acide faible → non : tout l'acide est consommé (équivalence)

❷ Comparer le pH au pKa.

pH < pKa → la forme acide prédomine
pH = pKa → [acide] = [base] : demi-équivalence, pouvoir tampon maximal, teinte sensible de l'indicateur
pH > pKa → la forme base prédomine
deux pKa (diacide, acide aminé) → trois zones : pH < pKa_1, entre les deux, pH > pKa_2

❸ Que change-t-on au tampon ?

ajout modéré d'acide ou de base → le pH varie peu
dilution → pH et zone tampon inchangés ; pouvoir tampon diminue
plus de tampon dans la même solution → pouvoir tampon augmente

❹ L'item dit-il la même chose ?

oui → ✓ vrai
non → × faux

À SURVEILLER · UN MÉLANGE OU UNE FORME MAL LUS

Un mélange qui n'est pas un tampon est dit tampon (deux acides, acide fort et base forte, base forte en excès), la forme qui prédomine est inversée, ou la dilution est dite modifier le pH.

acide ↔ base qui prédomine
pH = pKa ↔ pH = 7,4
dilution ≠ changement de pH
équivalence ≠ tampon

« Un acide faible et sa base conjuguée, en quantités égales, forment une solution tampon. »

```
❶ acide faible + sa base conjuguée, proportions proches → tampon
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

« À pH = 9, un acide de pKa 7,2 est surtout sous sa forme acide. »

```
❷ pH 9 > pKa 7,2 → la forme base prédomine
❹ mot échangé
```

× **Faux** — forme base

« Diluer un tampon au 1/10 diminue son pH d'une unité. »

```
❸ dilution → pH inchangé
❹ faux
```

× **Faux** — pH inchangé

« 20 mL d'acide faible à 0,1 mol/L et 10 mL de NaOH à 0,1 mol/L : pH = pKa. »

```
❶ 2 mmol d'acide, 1 mmol de OH⁻ → 1 mmol de chaque → tampon
❷ [A⁻] = [AH] → pH = pKa
❹ même chose
```

✓ **Vrai**

D · Le mot ou la formule est inversé

rubrique D du mémo · « à propos des acides et des bases… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Souligner le mot clé : acide, base, couple, Ka, pKa, fort, faible, conjugué, électrolyte, α, tampon ouvert ou fermé…
une définition ou une formule → aller en ❷
une propriété (sens d'une variation, force) → aller en ❷

❷ Écrire au crayon la phrase du cours en une ligne.
c'est écrit → aller en ❸

❸ L'item dit-il la même chose, dans le même sens ?
oui → ✓ vrai
non → × faux : écrire « mot faux → mot du cours »

À SURVEILLER · UN MOT CONTRAIRE

Un mot est remplacé par son contraire : faible pour fort, céder pour capter, totalement pour partiellement, ouvert pour fermé, ou la fraction de Ka est renversée.

fort ↔ faible · céder ↔ capter · ouvert ↔ fermé · augmente ↔ diminue · Ka renversé

« Un acide fort a un pKa négatif. »

```
❶ « pKa »
❷ pKa < 0 : acide fort
❸ même chose
```

✓ **Vrai**

« Ka = [AH] × [H_3O^+] ÷ [A^-]. »

```
❶ « Ka »
❷ Ka = [H₃O⁺] × [A⁻] ÷ [AH]
❸ fraction renversée
```

× **Faux** — fraction renversée

« La dissociation d'un électrolyte faible diminue quand on le dilue. »

```
❶ « dissociation »
❷ loi d'Ostwald : elle augmente à la dilution
❸ mot échangé
```

× **Faux** — elle augmente

« Le tampon phosphate est le principal tampon du sang. »

```
❶ « principal tampon »
❷ bicarbonate / acide carbonique
❸ mot échangé
```

× **Faux** — bicarbonate

E · Le pH est faux d'un facteur

rubrique E du mémo · « quel est le pH, calculer… »

MÉTHODE · L'ARBRE, DANS L'ORDRE

❶ Les quantités sont-elles en mol et en mol/L ?
non → mg → g ; n = m ÷ M ; mL → L ; C = n ÷ V ; µmol/L = 10^{-6} mol/L
oui → aller en ❷

❷ Quelle espèce est en solution ? (pKa < 0 : fort ; 0 < pKa < 14 : faible)
acide fort seul → pH = −log C ; très dilué (C < 10^{-5}) : pH = −log(C + 10^{-7})
acide faible seul → pH = ½ (pKa − log C)
base forte seule → pH = 14 + log C
base faible seule → pH = 7 + ½ (pKa + log C)
acide faible et sa base → pH = pKa + log(n base ÷ n acide)
acide ou base forte ajoutée à un tampon → retirer d'abord les moles qui réagissent, puis le tampon
sang → pH = 6,1 + log([HCO_3^-] ÷ (0,03 × PCO_2))

❸ Comparer à la valeur obtenue avec la ligne du mémo.
égale → ✓ vrai
½ oublié, formule de l'acide fort au lieu du faible, rapport renversé, H_3O^+ et OH^- échangés, 10^{-7} de l'eau oublié → × faux

À SURVEILLER · LA VALEUR OBTENUE AVEC UNE SEULE ERREUR

Le distracteur est la valeur obtenue avec une seule erreur : formule de l'acide fort pour un acide faible, ½ oublié, rapport base sur acide renversé, OH^- pris pour H_3O^+, H^+ de l'eau oubliés, moles ajoutées non retirées.

½ oublié · fort ↔ faible · base ÷ acide renversé · H_3O^+ ↔ OH^- · + 10^{-7} oublié · bilan des moles oublié

« Acide fort à 2·10^{-3} mol/L (log 2 ≈ 0,3) : pH = 2,7. »

```
❶ déjà en mol/L
❷ pH = −log C
❸ 3 − 0,3 = 2,7
```

✓ **Vrai**

« Acide faible de pKa 4,2 à 10^{-2} mol/L : pH = 2. »

```
❶ mol/L
❷ ½ (pKa − log C)
❸ ½ (4,2 + 2) = 3,1 ; 2 = formule de l'acide fort
```

× **Faux** — 3,1

« À pH = 9, [OH^-] = 10^{-9} mol/L. »

```
❶ rien à convertir
❷ [OH⁻] = 10⁻¹⁴ ÷ 10⁻⁹
❸ 10⁻⁵ ; 10⁻⁹ = [H₃O⁺]
```

× **Faux** — 10^{-5}

« 56 mg de KOH (M = 56 g/mol, base forte) dans 100 mL : pH = 12. »

```
❶ 10⁻³ mol ÷ 0,1 L = 10⁻² mol/L
❷ 14 + log C
❸ 14 − 2 = 12
```

✓ **Vrai**

« Tampon : 0,002 mol d'acide et 0,02 mol de base, pKa 7,2 : pH = 6,2. »

```
❶ en mol
❷ pKa + log(base ÷ acide)
❸ 7,2 + 1 = 8,2 ; 6,2 = rapport renversé
```

× **Faux** — 8,2

« Sang : [HCO_3^-] 27 mmol/L, PCO_2 45 mmHg (log 20 ≈ 1,3) : pH = 7,4. »

```
❶ mmol/L et mmHg
❷ 6,1 + log(27 ÷ 1,35)
❸ 6,1 + 1,3 = 7,4
```

✓ **Vrai**

« Acide fort à 10^{-8} mol/L : pH = 8. »

```
❶ C < 10⁻⁵
❷ très dilué : −log(10⁻⁸ + 10⁻⁷)
❸ un peu sous 7 ; 8 = eau oubliée
```

× **Faux** — un peu sous 7

« 0,01 mol de A^- et 0,01 mol de AH (pKa 6,8), puis 0,005 mol de HCl (log 3 ≈ 0,48) : pH = 6,32. »

```
❶ en mol
❷ ajout : A⁻ 0,005 ; AH 0,015
❸ 6,8 + log(1/3) = 6,32
```

✓ **Vrai**

Une question complète, comme pendant l'épreuve (≈ 1 min 30)

QRU. On dissout 0,02 mol d'un acide faible AH (pKa = 5,0) et 0,01 mol de NaOH dans 1 L d'eau. Quelle affirmation est exacte ?

A. La solution n'est pas un tampon, car elle contient une base forte.
B. Le pH de la solution vaut 5,0.
C. La forme A^- prédomine.
D. Ajouter encore 0,01 mol de NaOH donne un tampon de pH 6,0.
E. Diluer la solution 10 fois fait passer son pH à 6,0.

Étape 1 · annoter l'énoncé une fois (≈ 20 s)

```
AH : 0,02 − 0,01 = 0,01 mol
A⁻ : 0,01 mol formée
pKa = 5,0
→ tampon, pH = pKa
```

Étape 2 · trancher chaque item avec son arbre (≈ 10 s chacun)

A	`AH 0,01 · A⁻ 0,01 : tampon`	✗	**C** · arbre
B	`5,0 + log(0,01 ÷ 0,01) = 5,0`	✓	**E** · arbre
C	`pH = pKa : autant des deux`	✗	**C** · arbre
D	`plus d'acide : équivalence`	✗	**C** · arbre
E	`dilution : pH inchangé`	✗	**C** · arbre

Étape 3 · QRU : quatre items éliminés ⇒ **B**. On coche sans relire.

Ce qu'il faut retenir

- Jamais de jugement « à l'impression » : faire le bilan des moles, comparer pH et pKa, puis trancher.
- Annoter une seule fois l'énoncé (moles, espèces, pKa) sert à tous les items.
- Un mélange acide faible + base forte devient un tampon tant qu'il reste de l'acide (items A et D).

La routine en 15 secondes par item — **quel trouble ?** pH, puis la valeur qui va dans son sens (A) · **compenser, causer ?** l'autre organe, même sens (B) · **tampon, forme qui prédomine ?** bilan, pH contre pKa (C) · **un mot, une formule ?** la phrase du cours (D) · **un nombre ?** convertir, ligne du mémo, facteur d'écart (E). Note chaque erreur avec la lettre de son piège.

Relevé sur les annales classées pH et équilibre acido-basique (2015-2026, PASS, PACES, LAS), le contrôle n°1, l'ECB n°1 et les QCM supplémentaires (séance 1) Médisup 2026-2027