

أدوية القلب للأطفال

سوف يساعدك هذا الكتيب على تحقيق فهم أفضل على تحقيق فهم أفضل

لازكس Lasix يحتوى على المادة الفعالة فروسميد و التي تعمل كمدر للبول لذلك يخلص الجسم من السوائل الزائدة. * ق

* يعمل على خفض ضغط الدم وهذا يعني أن يتم السماح للأوعية الدموية على الإسترخاء والإتساع وبالتالي تدفق الدم بسهولة
* بعض الناس قد تعاني من دوخة الناتجة عن إخفاض ضغط الدم في الأيام القليلة الأولى من تناول هذا الدواء.
إذا كنت في كثير من الأحيان تشعر بالدوار يجب إبلاغ الطبيب.
يمكن للمنبطات ان تسبب أحيانا الحساسية و عند ذلك التوقف عن تناول هذا الدواء واستشارة الطبيب فوراً.
يفضل تناول الكابتوتين قبل الأكل بنصف ساعة.

ألداكتون Aldacton

* من المدرات الحافظة للبوتاسيوم.
* ويجب عند وصفة مراقبة مستوى البوتاسيوم في الدم بشكل دوري لأن الداكتون يؤدي في بعض الأحيان إلى رفع مستوى
* تجنب الأطعمة المالحة.
* ملاحظة كمية البول.

أسبوسيد Aspocid يمنع تكون الجلطات الدموية في الأشخاص المعرضين لتكوين جلطات دموية و يستخدم للأطفال بعد ج
تعليمات يجب المريض اتباعها مع هذا الدواء:
الاسبرين قد يسبب ردود فعل شديدة الحساسية لذلك يجب توضي الحذر.
عليك تناول الأسبوسيد بعد الأكل لانه قد يتسبب في ألأمم بالمعدة.
يجب توضي الحذر إذا كنت تعاني من النزيف و إبلاغ الطبيب فوراً