

التطعيمات والاثار الجانبية للاطفال بعد التطعيم  
سوف يساعدك هذا الكتيب على تحقيق فهم أفضل  
على تحقيق فهم أفضل

عند الولادة وخلال ١٥ يوما بعد الولادة  
الدرن

- شلل الأطفال
- تألم الطفل في مكان الحقنة.
- تورم بسيط واحمرار مكان الحقن وقد يبقى لبضعة أيام.
- ارتفاع في درجة الحرارة ليومين كامل.
- ظهور بعض التشنجات مع ارتفاع درجة الحرارة (عرض غير منتشر).
- إرهاق وتعب عام
- تعتبر الأعراض الجانبية لتطعيم الحصبة هي أكثرها برورا وحدة لأن المصل هو جرثوم حي من المرض فيتسبب في ظهور ارتفاع درجة الحرارة .
- ظهور طفح جلدي بعد ٥ أيام وأحيانا بعد أسبوع أو ١٠، ١١، ١٢.....

عمر الشهرين

## الجرعة الأولى ضد شلل الأطفال

الجرعة الأولى ضد الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي

الديكى

الجرعة الأولى ضد الالتهاب الكبدي «ب»

الجرعة الأولى ضد الروتا - الإنغولنزيا البكتيرية

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

هناك بعض التحذيرات الهامة التي ينبغي على الأم الانتباه لها لمقاومة الأعراض والتقليل من آثارها:

- لا تقديمي الطعام لطفلك بعد التفتيم ولا تعرضي عليه الرضاعة لمدة نصف ساعة وتحديدا في التطعيمات الفموية مثل شلل
- عند ارتفاع درجة الحرارة لا مانع من استخدام خافضات الحرارة والتي سبق أن وصفها له الطبيب قدمي له مزيدا من الس
- استخدمتي كمادات الماء البارد أو امنحيه حماما فاترا ويمكنك تخفيف الملابس.
- لا تسرفي في ذلك حتى لا يصيبه نزلة برد.
- كمادات الماء البارد أيضا مناسبة لمكان الحقن المؤلم.
- يمكنك استشارة الطبيب في وصف اسم لكريم مسخن.

عمر 9 شہور

الجرعة الرابعة ضد شلل الأطفال



عمر 10 شهرا

الجرعة الرابعة ضد شلل الأطفال

الجرعة الأولى ضد الحصبة والحصبة الألمانية

والنكاف

الجرعة الأولى ضد الجدري المائي والكبد الوبائي «أ».





















































- متى يجب عليك الامتناع عن تطعيم صغيرك؟
- إن كان طفلك أجرى عملية قلب مفتوح ولم يكمل ١٠ أسابيع من تاريخ العملية
  - إن كان طفلك يعالج من مرض آخر باستخدام الكورتيزون
  - إن كان الطفل يعاني من أمراض ضعف المناعة أو أي نوع من السرطان
  - إن كان الطفل يعاني من حساسية شديدة ضد بعض الأدوية واللقاحات والأطعمة
  - إذا كان الطفل مصاباً بنزلة معوية أو التهاب اللوزتين ويؤجل لوقت شغائه