

スケジュール 後半 (予定)

- ★ 休講 (国内出張) (12/11)
- 8 マトロイドに対する操作 (12/18)
- 9 マトロイドの交わり (12/25)
- ★ 冬季休業 (1/1)
- 10 マトロイド交わり定理 (1/8)
- ★ 休講 (センター試験準備) (1/15)
- 11 マトロイド交わり定理: アルゴリズム (1/22)
- 12 最近のトピック (1/29)
- ★ 授業等調整日 (予備日) (2/5)
- ★ 期末試験 (2/12?)

注意: 予定の変更もありうる

今日の目標

今日の目標

グラフの最小全域木問題とマトロイドの関係を探る

- ▶ グラフの最小全域木問題 \leftrightarrow マトロイドの最小基問題
- ▶ Kruskal のアルゴリズム \leftrightarrow 貪欲アルゴリズム
- ▶ 貪欲アルゴリズムの正当性
- ▶ 「貪欲アルゴリズムの正当性」におけるマトロイドの必要性

グラフと閉路マトロイド


グラフ $G = (V, E)$, G の閉路マトロイド \mathcal{I}

命題: 閉路マトロイドをグラフの用語で捉え直す

G の辺部分集合 $X \subseteq E$ に対して

$X \in \mathcal{I} \iff$ グラフ $G[X] = (V, X)$ が閉路を含まない

例:



スケジュール 前半 (予定)

- ★ 休講 (卒研準備発表会) (10/2)
- 1 組合せ最適化問題におけるマトロイドの役割 (10/9)
- ★ 休講 (海外出張) (10/16)
- 2 マトロイドの定義と例 (10/23)
- 3 マトロイドの基と階数関数 (10/30)
- 4 グラフとマトロイド (11/6)
- 5 マトロイドとグラフの全域木 (11/13)
- ★ 休講 (調布祭) (11/20)
- 6 マトロイドに対する貪欲アルゴリズム (11/27)
- 7 マトロイドのサーキット (12/4)

注意: 予定の変更もありうる

テーマ: 解きやすい組合せ最適化問題が持つ「共通の性質」

疑問

どうしてそのような違いが生まれるのか?

\rightsquigarrow 解きやすい問題が持つ「共通の性質」は何か?

回答

よく分かっていない

しかし, 部分的な回答はある

部分的な回答

問題が「マトロイドの構造」を持つと解きやすい

ポイント

効率的なアルゴリズムが設計できる背景に「美しい数理構造」がある

この講義では, その一端に触れたい

目次

- 1 グラフとマトロイド: 前回の復習
- 2 最小全域木問題とマトロイド
- 3 貪欲アルゴリズム
- 4 貪欲アルゴリズム: マトロイドである必要性
- 5 今日のまとめ と 次回の予告

森と木: 証明の前に用語の整理

無向グラフ $G = (V, E)$

森と木

- ▶ G が**森** (あるいは林, forest) であるとは, G が閉路を含まないこと
- ▶ G が**木** (tree) であるとは, G が連結であり, 閉路を含まないこと

全域森と全域木


$X \subseteq E$ に対して, $G[X] = (V, X)$ とする

- ▶ $G[X]$ が G の**全域森** (spanning forest) であるとは, $G[X]$ が閉路を含まないこと
- ▶ $G[X]$ が G の**全域木** (spanning tree) であるとは, $G[X]$ が連結であり, 閉路を含まないこと

例において、 G の閉路マトロイドの基族 \mathcal{B} は

$$\begin{aligned} \mathcal{B} = \{ & \{e_1, e_3, e_4, e_5\}, \{e_1, e_3, e_4, e_7\}, \{e_1, e_3, e_5, e_7\}, \{e_1, e_3, e_5, e_8\}, \\ & \{e_1, e_3, e_7, e_8\}, \{e_1, e_4, e_5, e_8\}, \{e_1, e_4, e_7, e_8\}, \{e_1, e_5, e_7, e_8\}, \\ & \{e_2, e_3, e_4, e_5\}, \{e_2, e_3, e_4, e_7\}, \{e_2, e_3, e_5, e_7\}, \{e_2, e_3, e_5, e_8\}, \\ & \{e_2, e_3, e_7, e_8\}, \{e_2, e_4, e_5, e_8\}, \{e_2, e_4, e_7, e_8\}, \{e_2, e_5, e_7, e_8\} \} \end{aligned}$$

閉路マトロイドの基が
 G の全域木に対応
($\because G$ が連結)



目次

① グラフとマトロイド：前回の復習

② 最小全域木問題とマトロイド

③ 貪欲アルゴリズム

④ 貪欲アルゴリズム：マトロイドである必要性

⑤ 今日のまとめ と 次回の予告

グラフの最小全域木問題：Kruskal のアルゴリズム

最小全域木問題を効率よく解く方法

Kruskal のアルゴリズム


- 1 G の辺を費用の小さい順に並べる
($c(e_1) \leq c(e_2) \leq \dots \leq c(e_n)$ であると仮定する)
- 2 $B \leftarrow \emptyset$
- 3 すべての $i \leftarrow 1, \dots, n$ に対して、以下を繰り返し
$$B \leftarrow \begin{cases} B \cup \{e_i\} & (B \cup \{e_i\} \text{ が閉路を含まないとき}) \\ B & (B \cup \{e_i\} \text{ が閉路を含むとき}) \end{cases}$$
- 4 B を出力

これは正しいアルゴリズム (必ず最小全域木を出力する)

- ▶ 証明：『アルゴリズム論第一』か『アルゴリズム論第二』を参照
- ▶ 別証明：この講義 (マトロイドを使用)

グラフの最小全域木問題：例 — Kruskal のアルゴリズムを実行

辺の上に書いてある数字が、その辺の重み



Kruskal のアルゴリズム：最小全域木を計算する貪欲アルゴリズム

連結グラフ G

G の全域森

G の全域木

閉路を含む G の部分グラフ

G の閉路

G の閉路マトロイド

独立集合

基

従属集合

サーキット

復習： E 上のマトロイド \mathcal{I} に対して

- ▶ $X \subseteq E$ が \mathcal{I} の従属集合であるとは、 $X \notin \mathcal{I}$
- ▶ $X \subseteq E$ が \mathcal{I} のサーキットであるとは、 $X \notin \mathcal{I}$ で、任意の $e \in X$ に対して、 $X - \{e\} \in \mathcal{I}$ (つまり、 X は極小な従属集合)

注意：文献では「全域森」を違う意味で使うこともある

グラフの最小全域木問題


グラフの最小全域木問題とは？

連結無向グラフ $G = (V, E)$ と重み $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{e \in B} c(e) \\ & \text{subject to} && G[B] = (V, B) \text{ は } G \text{ の全域木} \end{aligned}$$

グラフの最小全域木問題：例

辺の上に書いてある数字が、その辺の重み



グラフの最小全域木問題：閉路マトロイドのことばで言い換える

グラフの最小全域木問題とは？: 閉路マトロイドで言い換え

連結無向グラフ $G = (V, E)$ と重み $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{e \in B} c(e) \\ & \text{subject to} && B \text{ は } G \text{ の閉路マトロイド } \mathcal{I} \text{ の基} \end{aligned}$$

マトロイドの最小基問題

有限集合 E 上のマトロイド \mathcal{I} と重み $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{e \in B} c(e) \\ & \text{subject to} && B \text{ は } \mathcal{I} \text{ の基} \end{aligned}$$

マトロイドの最小基問題

有限集合 E 上のマトロイド \mathcal{I} と重み $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{e \in B} c(e) \\ & \text{subject to} && B \text{ は } \mathcal{I} \text{ の基} \end{aligned}$$

一方，第 1 回講義で考えた問題は次のもの

マトロイドの最大独立集合問題

有限集合 E 上のマトロイド \mathcal{I} と重み $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して

$$\begin{aligned} & \text{maximize} && \sum_{e \in X} w(e) \\ & \text{subject to} && X \in \mathcal{I} \end{aligned}$$

マトロイドの最小基問題とマトロイドの最大独立集合問題：関係

非空な有限集合 E , E 上のマトロイド \mathcal{I} , その基族 \mathcal{B}

命題

- ▶ 任意の $c: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ を考える
- ▶ このとき， $C = \sum_{e \in E} c(e)$ として， $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ を次のように定義する

$$\text{任意の } e \in E \text{ に対して, } w(e) = C - c(e)$$

このとき，

$$\min \left\{ \sum_{e \in B} c(e) \mid B \in \mathcal{B} \right\} = C \cdot r(E) - \max \left\{ \sum_{e \in X} w(e) \mid X \in \mathcal{I} \right\}$$

最小基問題の最適値

最大独立集合問題の最適値

- ▶ 補足： $r(E)$ は E の階数 (= \mathcal{I} の基の要素数)
- ▶ 注意：任意の $e \in E$ に対して， $w(e) \geq 0$


証明 (1)

観察 1

最大独立集合問題の最適解として，基であるものが存在する

- ▶ 独立集合 $X \in \mathcal{I}$ が最適解であるとする
- ▶ このとき， X を含む基 $B \in \mathcal{I}$ が存在 (cf. 演習問題 3.14)
- ▶ $X \subseteq B$ なので， $\sum_{e \in X} w(e) \leq \sum_{e \in B} w(e)$
- ▶ したがって， B も最適解

□



証明 (3)

- ▶ 観察 2 より，

$$\min \left\{ \sum_{e \in B} c(e) \mid B \in \mathcal{B} \right\} = C \cdot r(E) - \max \left\{ \sum_{e \in B} w(e) \mid B \in \mathcal{B} \right\}$$

- ▶ 観察 1 より

$$\max \left\{ \sum_{e \in B} w(e) \mid B \in \mathcal{B} \right\} = \max \left\{ \sum_{e \in X} w(e) \mid X \in \mathcal{I} \right\}$$

- ▶ したがって，

$$\min \left\{ \sum_{e \in B} c(e) \mid B \in \mathcal{B} \right\} = C \cdot r(E) - \max \left\{ \sum_{e \in X} w(e) \mid X \in \mathcal{I} \right\}$$

□

観察 2

集合 $X, Y \subseteq E$ に対して，

$$\sum_{e \in X} c(e) \leq \sum_{e \in Y} c(e) \Leftrightarrow C|X| - \sum_{e \in X} w(e) \leq C|Y| - \sum_{e \in Y} w(e)$$

$$\begin{aligned} C|X| - \sum_{e \in X} w(e) &\leq C|Y| - \sum_{e \in Y} w(e) \\ \Leftrightarrow \sum_{e \in X} (C - w(e)) &\leq \sum_{e \in Y} (C - w(e)) \\ \Leftrightarrow \sum_{e \in X} c(e) &\leq \sum_{e \in Y} c(e) \quad \square \end{aligned}$$

目次

① グラフとマトロイド：前回の復習

② 最小全域木問題とマトロイド

③ 貪欲アルゴリズム

④ 貪欲アルゴリズム：マトロイドである必要性

⑤ 今日のまとめ と 次回の予告

E 上の独立集合族 \mathcal{F} , 重み $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$

最大独立集合問題に対する貪欲アルゴリズム

1

E の要素 e を $w(e)$ の大きい順に並べる
($w(e_1) \geq w(e_2) \geq \dots \geq w(e_n)$ であると仮定する)

2

$X \leftarrow \emptyset$

3

すべての $i \leftarrow 1, 2, \dots, n$ に対して, 以下を繰り返し
$$X \leftarrow \begin{cases} X \cup \{e_i\} & (X \cup \{e_i\} \in \mathcal{F} \text{ のとき}) \\ X & (X \cup \{e_i\} \notin \mathcal{F} \text{ のとき}) \end{cases}$$

4

X を出力

第 1 回の講義で紹介した形と違うが, 動きは同じ (で効率が良い)

証明 (1)

- $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ で, $w(e_1) \geq \dots \geq w(e_n)$ であるとする
- 貪欲アルゴリズムの出力を B とする (B は \mathcal{I} の基)
 - 最適解の 1 つを B^* とする (B^* は \mathcal{I} の基)
 - 任意の $i \in \{1, \dots, n\}$ に対して, 次のように集合を定める

$$\begin{aligned} B_i &= B \cap \{e_1, \dots, e_i\} \\ B_i^* &= B^* \cap \{e_1, \dots, e_i\} \end{aligned}$$

- r を \mathcal{I} の階数関数とすると, 次の成り立つ

- 1

$|B_i| = r(\{e_1, \dots, e_i\})$

(なぜか?)
- 2

$|B_i^*| \leq r(\{e_1, \dots, e_i\})$

(なぜか?)
- したがって, $|B_i| \geq |B_i^*|$

証明 (2)

確認

2

$|B_i^*| \leq r(\{e_1, \dots, e_i\})$

▶ B_i^* の定義より, $B_i^* \subseteq B^*$

▶ $B^* \in \mathcal{I}$ なので, (I2) より, $B_i^* \in \mathcal{I}$

▶ 階数関数の性質より, $r(B_i^*) = |B_i^*|$

▶ $B_i^* \subseteq \{e_1, \dots, e_i\}$ なので, 単調性より, $r(B_i^*) \leq r(\{e_1, \dots, e_i\})$

▶ したがって, $|B_i^*| = r(B_i^*) \leq r(\{e_1, \dots, e_i\})$

□

岡本 吉央 (電通大) 離散最適化基礎論 (5) 2015 年 11 月 13 日 29 / 39

証明 (4)

したがって, $B_0 = B_0^* = \emptyset$, $w(e_{n+1}) = 0$ としたとき, 次の成り立つ

$$\begin{aligned} \sum_{e \in B} w(e) &= \sum_{i=1}^n (|B_i| - |B_{i-1}|) w(e_i) \\ &= \sum_{i=1}^n |B_i| (w(e_i) - w(e_{i+1})) \\ &\geq \sum_{i=1}^n |B_i^*| (w(e_i) - w(e_{i+1})) \\ &= \sum_{i=1}^n (|B_i^*| - |B_{i-1}^*|) w(e_i) \\ &= \sum_{e \in B^*} w(e) \end{aligned}$$

すなわち, B も最適解である □

岡本 吉央 (電通大) 離散最適化基礎論 (5) 2015 年 11 月 13 日 31 / 39

マトロイドと貪欲アルゴリズム

非空な有限集合 E , E 上の独立集合族 \mathcal{F}

マトロイドに対する貪欲アルゴリズムの正当性

\mathcal{F} がマトロイド

⇒

任意の重み $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して,
貪欲アルゴリズムの出力は
最大独立集合問題の最適解

つまり, Kruskal のアルゴリズムも正しい

岡本 吉央 (電通大) 離散最適化基礎論 (5) 2015 年 11 月 13 日 26 / 39

復習: マトロイドの階数関数

E 上のマトロイドの階数関数 $r: 2^E \rightarrow \mathbb{N}$ とは?

- 任意の $X \in 2^E$ に対して $r(X) = \max\{|Y| \mid Y \subseteq X, Y \in \mathcal{I}\}$
- つまり, $r(X)$ は X の基の要素数

X の基とは?: 次の満たす集合 B_X

- $B_X \subseteq X$, かつ, $B_X \in \mathcal{I}$
- 任意の $e \in X - B_X$ に対して, $B_X \cup \{e\} \notin \mathcal{I}$

階数関数の性質 (第 3 回講義より)

- $X \in \mathcal{I}$ ならば, $r(X) = |X|$
- $X \subseteq Y$ ならば, $r(X) \leq r(Y)$ (単調性)

岡本 吉央 (電通大) 離散最適化基礎論 (5) 2015 年 11 月 13 日 28 / 39

証明 (3)

確認

1

$|B_i| = r(\{e_1, \dots, e_i\})$

▶ B_i が $\{e_1, \dots, e_i\}$ の基であることを示せばよい

▶ B_i の定義より, $B_i \subseteq \{e_1, \dots, e_i\}$

▶ $B_i \subseteq B$ と $B \in \mathcal{I}$ と (I2) より, $B_i \in \mathcal{I}$

▶ 任意の $e_j \in \{e_1, \dots, e_i\} - B_i$ を考える

▶ $B_i \cup \{e_j\} \in \mathcal{I}$ であるとして, 貪欲アルゴリズムの第 i 反復で B_i が得られることに矛盾

▶ したがって, $B_i \cup \{e_j\} \notin \mathcal{I}$

▶ つまり, B_i は $\{e_1, \dots, e_i\}$ の基である

岡本 吉央 (電通大) 離散最適化基礎論 (5) 2015 年 11 月 13 日 30 / 39

目次

① グラフとマトロイド: 前回の復習

② 最小全域木問題とマトロイド

③ 貪欲アルゴリズム

④ 貪欲アルゴリズム: マトロイドである必要性

⑤ 今日のまとめ と 次回の予告

岡本 吉央 (電通大) 離散最適化基礎論 (5) 2015 年 11 月 13 日 32 / 39

非空な有限集合 E , E 上の独立集合族 \mathcal{F}

定理：マトロイドであることの必要性

任意の重み $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して貪欲アルゴリズムの出力が最適解
 $\Rightarrow \mathcal{F}$ はマトロイド

証明：対偶を示す

- ▶ \mathcal{F} がマトロイドではないと仮定する

証明すること

ある重み $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して貪欲アルゴリズムは最適解を出力しない

- ▶ \mathcal{F} は独立集合族なので, \mathcal{F} は (I1), (I2) を満たす
- ▶ つまり, \mathcal{F} は (I3) を満たさない
- ▶ すなわち, $|X| > |Y|$ を満たす $X, Y \in \mathcal{F}$ が存在して, 任意の $e \in X - Y$ に対して $Y \cup \{e\} \notin \mathcal{F}$ となる

目次

① グラフとマトロイド：前回の復習

② 最小全域木問題とマトロイド

③ 貪欲アルゴリズム

④ 貪欲アルゴリズム：マトロイドである必要性

⑤ 今日のまとめ と 次回の予告

今日のまとめ と 次回の予告

今日のまとめ

グラフの最小全域木問題とマトロイドの関係を探る

- ▶ グラフの最小全域木問題 \leftrightarrow マトロイドの最小基問題
- ▶ Kruskal のアルゴリズム \leftrightarrow 貪欲アルゴリズム
- ▶ 貪欲アルゴリズムの正当性
- ▶ 「貪欲アルゴリズムの正当性」におけるマトロイドの必要性

次回

- ▶ 貪欲アルゴリズムの応用

- ▶ このとき, $k = |Y|$ として, 次のように $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ を定義

$$w(e) = \begin{cases} k+2 & (e \in Y \text{ のとき}) \\ k+1 & (e \in X - Y \text{ のとき}) \\ 0 & (\text{その他}) \end{cases}$$

- ▶ B を貪欲アルゴリズムの出力とすると, $Y \subseteq B$
- ▶ つまり, B は $X - Y$ の要素をどれも含まない
- ▶ $\therefore \sum_{e \in B} w(e) = |Y|(k+2) = k(k+2)$
- ▶ 一方, $\sum_{e \in X} w(e) \geq |X|(k+1) \geq (|Y|+1)(k+1) = (k+1)(k+1)$
- ▶ $k(k+2) < (k+1)(k+1)$ なので, B は最適解ではない \square

第 1 回講義のスライドから

非空な有限集合 E , 独立集合族 $\mathcal{F} \subseteq 2^E$

定理

次の 2 つは同値

- 1 任意の重み関数 $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して, 貪欲アルゴリズムが最適解を出力する
- 2 独立集合族 \mathcal{F} がマトロイドである

つまり,

- ▶ **マトロイド** (matroid) とは特殊な性質を持つ独立集合族
- ▶ マトロイドに対しては, 貪欲アルゴリズムが**必ず**最適解を出力する
 \leadsto マトロイドはとても性質のよい独立集合族

今回, これを確かに証明した

残った時間の使い方

- ▶ 演習問題をやる
 - ▶ 相談推奨 (ひとりでやらない)
- ▶ 質問をする
 - ▶ 教員は巡回
- ▶ 退室時, 小さな紙に感想など書いて提出する \leftarrow **重要**
 - ▶ 内容は何でも OK
 - ▶ 匿名で OK