



Calculadora



Preparación



Inoculación



Incubación



Fructificación

Calculadora de Pasteurización

Tipo de pasteurización

Agua Caliente (70–80°C)



Se sumerge el sustrato en agua a 70–80°C durante 1–2 horas. Simple y efectiva para paja.
Humedad final $\approx$ 65–75%.

Tipo y volumen

Tipo de recipiente

Tarro / Cubo 10 L



Volumen por recipiente (L)

10

Densidad de la mezcla (kg/L)

0,65

Porcentaje de llenado (%)

100

Paja pasteurizada $\approx$ 0.55–0.70 · Aserrín $\approx$ 0.60–0.75

Dejar espacio para el spawn

Composición del sustrato

SUSTRATO BASE

Tipo

Paja de trigo

Peso seco (kg)

10

SUPLEMENTO 1

SUGERIDO: SALVADO DE TRIGO (15%)

Tipo

Pelecha de avena

+ Guardar

Porcentaje (% del sustrato base)

15

= 1.50 kg



MIS SUPLEMENTOS GUARDADOS

Pelecha de avena



SUPLEMENTO 2

SUGERIDO: YESO AGRÍCOLA (2%)

Tipo

Yeso agrícola

+ Guardar

Porcentaje (% del sustrato base)

2

= 0.20 kg

Datos del proceso

Temperatura del agua (°C)

75

Mantener entre 70–80°C

Tiempo de inmersión (min)

90

60–120 min según densidad del sustrato

% Spawn / Semilla de micelio

6

Yeso agrícola (% sobre sustrato base)

2

Sugerido: 3–6%

Sugerido: 2% · Mejora estructura

Carbonato de calcio (% sobre sustrato base)

1

Sugerido: 0% · Buffer de pH

Cálculo automático

Agua Caliente (70–80°C)

70–80°C · 60–120 min

SUSTRATOS (PESO SECO)

Paja de trigo	10.00 kg	base
Pelecha de avena	1.50 kg	(15%)
Yeso agrícola	0.20 kg	(2%)
Total sustrato seco	11.70 kg	

AGUA Y ADITIVOS

Agua necesaria	80.0 L	para inmersión
Yeso agrícola	0.20 kg	(2%)
Carbonato de calcio	0.10 kg	(1%)
SEMILLA DE MICELIO (SPAWN)		
Spawn necesario	2.02 kg	(6% sobre mezcla húmeda)
Rango recomendado	1.01-2.02 kg	(3-6%)
MEZCLA POST-PASTEURIZACIÓN		
Peso húmedo del sustrato	33.43 kg	(humedad ≈ 65%)
Peso total con spawn	35.75 kg	
Volumen estimado mezcla	55.0 L	(densidad 0.65 kg/L)
RECIPIENTES ESTIMADOS		
Volumen efectivo/recipiente	10.0 L	(100% de 10 L)
Cantidad de recipientes	6	Tarro / Cubo 10 L
Peso aprox./recipiente	5.96 kg	
PRODUCCIÓN ESTIMADA		
Rendimiento biológico min.	3.37 kg	(10%)
Rendimiento biológico max.	6.75 kg	(20%)