

# ECE 133A HW 1

Lawrence Liu

October 17, 2022

## Exercise T8.8

For a specific  $t_i$  we have

$$\begin{aligned}f(t_i) &= y_i \\ \frac{c_1 + c_2 t_i + c_3 t_i^2}{1 + d_1 t_i + d_2 t_i^2} &= y_i \\ c_1 + c_2 t_i + c_3 t_i^2 &= y_i (1 + d_1 t_i + d_2 t_i^2) \\ c_1 + c_2 t_i + c_3 t_i^2 - y_i d_1 t_i - y_i d_2 t_i^2 &= y_i\end{aligned}$$

Therefore we can construct a matrix  $A$  and a vector  $b$ , such that  $A\theta = b$ , where  $\theta = [c_1, c_2, c_3, d_1, d_2]^T$ . We have that for 5 values of  $t_i$  and the corresponding 5 values of  $y_i$ ,

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & -y_1 t_1 & -y_1 t_1^2 \\ 1 & t_2 & t_2^2 & -y_2 t_2 & -y_2 t_2^2 \\ 1 & t_3 & t_3^2 & -y_3 t_3 & -y_3 t_3^2 \\ 1 & t_4 & t_4^2 & -y_4 t_4 & -y_4 t_4^2 \\ 1 & t_5 & t_5^2 & -y_5 t_5 & -y_5 t_5^2 \end{bmatrix}$$

and

$$B = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{bmatrix}$$

Therefore we can then just solve for  $\theta$  with  $\theta = A^{-1}b$ .

Thus for the values of  $t$  and  $y$  given, we can get the values of  $\theta$  with the following code:

```
t=[1,2,3,4,5]
y=[-1,12,10,1,-3]
A=zeros(5,5)

for i=1:5
    A[i,:]=[1,t[i],t[i]^2,-y[i]*t[i],-y[i]*t[i]^2]
end
print("theta= ")
println(round.(A\y,digits=3))
```

We get that

$$\theta = \boxed{(-6.117, 6.99, -1.322, -0.709, 0.158)}$$

## Exercise T8.10

Squaring these, we get that for  $1 \leq i \leq 4$ :

$$\begin{aligned}\rho_i^2 &= \|x - a_i\|^2 \\ &= (x_1 - a_{i1})^2 + (x_2 - a_{i2})^2 + (x_3 - a_{i3})^2\end{aligned}$$

Subtracting  $\rho_4^2$  from the others, we get that for  $1 \leq i \leq 3$

$$\begin{aligned}\rho_i^2 - \rho_4^2 &= (2a_{41} - 2a_{i1})x_1 + a_{i1}^2 - a_{41}^2 \\ &\quad + (2a_{42} - 2a_{i2})x_2 + a_{i2}^2 - a_{42}^2 \\ &\quad + (2a_{43} - 2a_{i3})x_3 + a_{i3}^2 - a_{43}^2\end{aligned}$$

Therefore for the values of  $\rho_i$  and  $a_i$  we get that:

$$x = (0.605, 0.405, -0.503)$$

Which can be found with the following code in Julia

```
using LinearAlgebra

A=transpose([[-10, 10, 10] [0, 10, 0] [-10, 10, 0] [-20, -10, -10]])
rho=[17.7518, 9.6417, 14.3198, 24.9654]

M=zeros(3,3)
b=zeros(3)
# println(size(A))
```

```

for i=1:3
    # println(b)
    b[i]=rho[i].^2-rho[4].^2
    for j=1:3
        M[i,j]=2*(A[4,j]-A[i,j])
        b[i]+=A[4,j].^2-A[i,j].^2
    end
end

x=M\b
print("x= ")
println(round.(x,digits=3))

for i=1:4
    println(norm(x-A[i,:]))
end

```

## Exercise A3.8

(a)

We have that  $f(s_k, t_k) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 c_i j s_k^{i-1} t_k^{j-1} = y_k$ , then we will have

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & s_1 & s_1 t_1 & s_1 t_1^2 & s_1^2 & s_1^2 t_1 & s_1^2 t_1^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & t_9 & t_9^2 & s_9 & s_9 t_9 & s_9 t_9^2 & s_9^2 & s_9^2 t_9 & s_9^2 t_9^2 \end{bmatrix}$$

$$x = [c_1 1, c_1 2, c_1 3, c_2 1, c_2 2, c_2 3, c_3 1, c_3 2, c_3 3]^T$$

$$b = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_9 \end{bmatrix}$$

(b)

Using the code below:

```

S=[0,0,0,1,1,1,2,2,2]
T=[0,1,2,0,1,2,0,1,2]
Y=[4,0,5,7,4,9,0,3,4]
M=zeros(9,9)

for k in 1:9
    for i in 1:3

```

```

        for j in 1:3
            M[k,3*(i-1)+j]=S[k]^(i-1)*T[k]^(j-1)
        end
    end

println(M\Y)

```

We get that

$$\begin{array}{rclclcl}
 c_{11} & = & 4.0 & c_{12} & = & -8.5 & c_{13} & = & 4.5 \\
 c_{21} & = & 8.0 & c_{22} & = & -3.25 & c_{23} & = & 1.75 \\
 c_{31} & = & -5.0 & c_{32} & = & 4.75 & c_{33} & = & -2.25
 \end{array}$$