

Graphe:

Un Graphe est défini comme suit:

$$G = (V(G), E(G))$$

$V(G)$: l'ensemble des sommets de G ; $v(G)$: nombre de sommets

$E(G)$: l'ensemble des arêtes de G ; $e(G)$: nombre d'arêtes

Ainsi que: $\Psi_G: E(G) \rightarrow \{u, v\}$ définit sur $E(G)$

Ainsi que Ψ_G définit sur $E(G)$

$$\Psi_G: E(G) \rightarrow V(G)$$

$$\forall e \in E(G), \{u, v\} \in V(G) \text{ tq } \Psi_G(e) = \{u, v\}$$

u, v non distinct. Le lit e relie u et v , avec u et v extrémités de e .

(Représentation Graphique (Dessin):
Sommets = point, arête = ligne.)

Les extrémités d'une arête sont dites incidentes et vice versa
l'ensemble des sommets voisins d'un sommet v dans un graphe G
est noté $N_G(v)$.

Une arête dont les extrémités sont identiques est appelée une boucle.

Deux liens ayant la même paire d'extrémités sont appelés des arêtes parallèles.




Un graphe est finit si son ensemble de sommet et d'arêtes le sont eux aussi ($V(G)$ et $E(G)$).

Un graphe nul est un graphe sans sommet. (0)

Un graphe avec 1 sommet est dit trivial (1) $1 > \Rightarrow$ non trivial

Un ensemble V et un ensemble E de sous-ensemble à 2 éléments de V définissent un graphe simple (V, E) , où les extrémités d'une arête ont précisément les sommets v et w .

On peut donc se passer de la fonction d'incidence dans ces cas ci, en renommant chaque arête par la paire de ses extrémités.



$$\begin{aligned} 2mk + 2k &= 2m(k-1) \\ 2(m+1)k &= k(m+2) \\ &= 2k + 2km + k \\ &= 2k + 2km + k \end{aligned}$$

Un graphe complet est un graphe simple dans lequel 2 sommets quelconque sont toujours adjacents.

Un graphe vide est un graphe dans lequel il n'y a pas de sommets adjacents ($\Rightarrow E(G) = \emptyset$).

Un graphe biparti si son ensemble de sommets peut être partitionné en 2 sous-ensemble X et Y de façon à ce que toute les arêtes ait une extrémité dans X et dans Y .


On appelle une partition (X, Y) : bipartition du graphe et X et Y ses parties.

graphe bipartite notation $G[X, Y]$


Si $G[X, Y]$ est simple et tout sommet de X est relié à tout sommet de Y le graphe est dit complet.

Biparti.


Ex: graphe bipartite complet



graphe complet



graphe bipartite
+ complet



Etoile*
(avec $|X| = 1$)

*: Etoile est un graphe bipartite complet $G[X, Y]$





avec:

$$|X| = 1 \text{ ou } |Y| = 1$$


Un chemin est un graphe simple dont les sommets ~~ont~~ peuvent être rangés suivant un ordre linéaire de telle manière que 2 sommets adjacents sont consécutifs dans l'ordre.

De même un cycle sur 3 sommets ou plus (triangle $\geq n$) est un graphe simple dont les sommets peuvent être rangés suivant un ordre cyclique de manière à ce que 2 sommets adj. sont consécutifs dans l'ordre et on adj. sinon.

Ex: cycle






Ex: chemin



Nota Bene:

Tout graphe peut être dessiné sur une surface de façon à ce que ses arêtes ne s'intersectent qu'en leur extrémités. (un tel dessin est appelé: plongement du graphe sur la surface)

Un graphe connexe, si pour toute partition de son ensemble de sommets en deux sous-ensemble non-vides X et Y , il existe une arête avec une extrémité dans X et une extrémité dans Y , dans le cas contraire le graphe est séparé.



a) graphe connexe


b) graphe séparé

Un graphe qui peut être dessiné dans le plan de telle manière que les arêtes s'intersectent uniquement en des points correspondant à leur extrémités communes est un graphe planaire, un tel dessin est un plongement planaire du graphe

planaire:



pas planaire:



(Autre représentation) Matrice d'Incidence et d'Adjacence :

Soit G un graphe d'ensemble de sommet V et d'ensemble d'arêtes E .

- matrice d'incidence est la matrice $n \times m$ $M_G := (m_{ve})$
 m_{ve} : nb de fois où le sommet v et l'arête e sont incidents
(0, 1 ou 2) \rightarrow Avec n : nb sommet et $m = |E(G)|$: nb arête
- matrice d'adjacence est la matrice $n \times n$ $A_G := (a_{ve})$
 a_{ve} : nb d'arêtes reliant les sommets

On stocke souvent matrice ~~adjacence~~ car arêtes-nb \gg nb-sommet.
 $M_G \gg A_G$

Pour graphe simple :

pour chaque sommet v , les voisins de v sont listés selon ordre quelconque, liste d'adjacence du graphe ($N(v) : v \in V$).

Pour graphe Biparti :

Comme pas arêtes reliant 2 parties \Rightarrow

$G[X, Y]$ avec $X := \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$ $Y := \{y_1, \dots, y_s\}$

matrice d'adjacence biparti : $r \times s$ $B_G = (b_{ij})$ où

b_{ij} : nb arête reliant x_i et y_j .

Degré des Sommets:

Noté $d_G(v)$ il est le nombre d'arêtes de G incidentes avec v
 $v \in V(G)$. Si graphe simple = nb voisins.

sommet degré 0: sommet isolé

$\delta(G)$ et $\Delta(G)$ degré min et max des sommets de G

$d(G)$ degré moyen, $\frac{1}{n} \sum_{v \in V} d(v)$.

Th: Pour tout graphe G ,

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m \quad \nwarrow \text{colonne de } M$$

Corollaire: Dans tout graphe, le nombre de sommets de degré impair est pair.

Un graphe G est k -régulier si $d(v) = k \quad \forall v \in V$; un graphe régulier est un graphe k -régulier pour un certain k .

ex: ^{n sommets} graphe ~~biparti~~ complet est $(n-1)$ régulier.

graphe biparti complet avec k sommets dans chaque partie est k -régulier.

graphe 3-régulier très complexe: graphe cubique
(+ très utilisé le graphe, remarquable).

Soos-Graphe:

(\diamond) Operation de suppression d'arête et suppression de sommet

$G \setminus e$	$G - v$
sous-graphe à arête supprimer	" " sommet

Def:

si $V(F) \subseteq V(G)$, $E(F) \subseteq E(G)$ et φ_F

ψ_F est la restriction de ψ_G à $E(F)$

Alors $F \subseteq G$.

Tout sous-graphe de G peut être obtenu par appli successive (\Leftarrow)
 son-graphe nul sous-graphe tout graphe

Un sous-graphe d'un graphe G est un graphe H qui contient G en tant que sous-graphe.

rowspan graphes propre $C \neq \subseteq$

Detection cycle

Théorème Soit G un graphe dans lequel tous les sommets ont un degré au moins 2. Alors G contient un cycle.

Demo: roib git.

Un chemin maximal = chemin qui ne peut-être étendu en aucun autre chemin plus long en ses 2 extrémités;

Soit \mathcal{F} une famille de sous-graphes de G . Alors \mathcal{F} est maximal dans \mathcal{F} si aucun membre de \mathcal{F} ne est strictement proprement

Resp min, Resp chemin min max

Par ex: \mathcal{F} sous graphe connexe enroulé alors les membre max de \mathcal{F} est les composantes de G .

Tout cycle d'un graphe est un cycle max car aucun cycle n'est contenu dans un autre.

longueur plus long cycle = circonférence et longueur plus petit = maille

Sous-graphe couvrant:

sous-graphe obtenu par suppression d'arêtes uniquement.

Soit $G' \text{ s.g. } \subset G$ alors $V(G) = V(G')$ mais $E(G) \supseteq E(G')$

$G' = G \setminus S$ avec S ensemble ^{arête} ~~sommet~~ supprimé.

Tout graphe simple est sous-graphe \subset d'un graphe complet.

sous-graphe couvrant \Rightarrow ajout arête: $G + S \neq G \setminus S$

Soit G et H 2 graphes; en ajoutant les arêtes reliant tout sommet sommet de G et H , on définit le joint de G et H denoté $G \vee H$.

$C_n \vee K_1$ avec K_1 sommet isolé = roue (~~et Wagner graph~~ à n rayon) noté W_n

Ajouter sommet aussi au graphe $G + x$

Chemin et cycle couvrant = cycle hamiltonien
chemin

sous graphe K reg couvrant = K -facteur