

HELSINGIN YLIOPISTO  
MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA  
MATEMATIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS

---

Pro gradu -tutkielma

# Stone–Čech kompaktisointi

Pekka Keipi

---

Ohjaaja: Erik Elfving

25. toukokuuta 2017

# Sisältö

1	Johdanto	2
2	Esitietoja	3
3	Uniformiset rakenteet	5
4	Pseudometriikat	9
5	Pseudometriikan määrittelemä uniformisuus	11
6	Uniformisoituvat avaruudet	17
7	Hausdorff uniforminen avaruus	19

Luku 1

Johdanto

# Luku 2

## Esitietoja

Oletamme koko tutkielman ajan, että  $\mathbb{R}_+ = \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ .

Olkoon  $X$  joukko ja  $V$  ja  $W$  karteesisen tulon  $X \times X$  osajoukkoja. Merkitään tällöin seuraavasti:

$$V \circ W = \{(x, z) \mid \text{on olemassa sellainen } y \in X, \text{ jolla } (x, y) \in V \text{ ja } (y, z) \in W\},$$

$$W^2 = W \circ W \text{ ja } W^n = W \circ W^{n-1}.$$

**Määritelmä 2.1.** Topologisen avaruuden  $(X, \mathcal{T})$  osajoukko  $A \subset X$  on avoin, jos se on kokoelman  $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(X)$  alkio.

**Määritelmä 2.2.** *Ympäristö.* Olkoon  $(X, \mathcal{T})$  topologinen avaruus ja  $x \in X$  alkio. Osajoukko  $A \subset X$ , johon alkio  $x$  kuuluu, on alkion  $x$  *ympäristö*, jos on olemassa avoin osajoukko  $B \subset X$ , joka sisältää osajoukon  $A$ .

*Huomautus 2.3.* Topologisen avaruuden  $(X, \mathcal{T})$  avoin osajoukko  $A \subset X$  on jokaisen alkionsa  $x \in A$  ympäristö.

**Määritelmä 2.4.** *Ympäristökanta.* Olkoon  $(X, \mathcal{T})$  topologinen avaruus ja  $x \in X$  alkio. Kokoelma  $B(x)$  alkion  $x$  ympäristöjä on alkion  $x$  *ympäristökanta* (topologiassa  $\mathcal{T}$ ), jos jokainen alkion  $x$  ympäristö sisältää kokoelman  $B(x)$  jonkin jäsenen.

**Korollaari 2.5.** *Topologisen avaruuden  $(X, \mathcal{T})$  alkion  $x \in X$  kaikkien ympäristöjen kokoelma  $B(x)$  on alkion  $x$  ympäristökanta.*

**Esimerkki 2.6.** Jos joukkoperhe  $B \subset \mathcal{P}(X)$  on avaruuden  $(X, \mathcal{T})$  kanta ja  $x \in X$  alkio, niin joukko  $B(x) = \{A \mid x \in A \in B\}$  on alkion  $x$  eräs ympäristökanta. Käänteisesti, jos jokaisella alkiolla  $x \in X$  on annettu ympäristökanta  $B(x)$  avaruudessa  $(X, \mathcal{T})$ , niin kokoelma  $\bigcup\{B(x) \mid x \in X\}$  on avaruuden  $(X, \mathcal{T})$  kanta.

**Lause 2.7.** *Olkoon  $A$  joukon  $X$  peite. Tällöin  $A$  on joukon  $X$  erään topologian  $\mathcal{T}$  esikanta. Lisäksi  $\mathcal{T}$  on karkein niistä joukon  $X$  topologioista, joilla  $A \subset \mathcal{T}$ . Tämä topologia  $\mathcal{T}$  on peitteen  $A$  yksikäsitteisesti määräämä, ja sitä sanotaan peitteen  $A$  virittämäksi joukon  $X$  topologiaksi.*

*Todistus.* Topologia II [3] lause 2.19. □

**Määritelmä 2.8.** *Topologioiden vertailu.* Olkoon  $X$  joukko ja  $\mathcal{T}_1$  ja  $\mathcal{T}_2$  topologioita joukolle  $X$ . Topologia  $\mathcal{T}_2$  on karkeampi kuin topologia  $\mathcal{T}_1$ , jos jokaisella  $U \in \mathcal{T}_2$  pätee  $U \in \mathcal{T}_1$ , eli  $\mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}_1$ . Tällöin  $\mathcal{T}_1$  on hienompi kuin  $\mathcal{T}_2$ .

# Luku 3

## Uniformiset rakenteet

Tässä kappaleessa tutustutaan uniformisiin rakenteisiin ja näiden keskeisiin ominaisuuksiin [1].

**Määritelmä 3.1.** Uniforminen rakenne (tai uniformisuus) joukolle  $X$  annetaan karteesisen tulon  $X \times X$  potenssijoukon  $\mathcal{P}(X \times X)$  osajoukkona  $\mathcal{U}$ , jolle pätee

- (U1) Jos  $V \in \mathcal{U}$  ja  $V \subset W \subset X \times X$  niin  $W \in \mathcal{U}$ ,
- (U2) Jokainen äärellinen leikkaus joukon  $\mathcal{U}$  alkioista kuuluu joukkoon  $\mathcal{U}$ ,
- (U3) Joukko  $\{(x, x) \mid x \in X\}$  on jokaisen joukon  $V \in \mathcal{U}$  osajoukko,
- (U4) Jos  $V \in \mathcal{U}$ , niin  $V^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in V\} \in \mathcal{U}$ ,
- (U5) Jos  $V \in \mathcal{U}$ , niin on olemassa sellainen  $W \in \mathcal{U}$ , jolla  $W^2 \subset V$ .

Uniformisen rakenteen muodostavia joukkoja  $V \in \mathcal{U}$  sanotaan uniformisuuden  $\mathcal{U}$  lähistöiksi. Joukkoa  $X$  joka on varustettu uniformisuudella  $\mathcal{U}$  sanotaan uniformiseksi avaruudeksi.

*Huomautus 3.2.* Uniformisuuden  $\mathcal{U}$  lähistöön (entourage)  $V \in \mathcal{U}$  kuuluvan pisteparin  $(x, y) \in V$  pisteiden  $x, y \in X$  sanotaan olevan  $V$ -lähellä, tarpeeksi lähellä tai mielivaltaisen lähellä toisiaan.

*Huomautus 3.3.* Mikäli muut ehdot pätevät voidaan ehdot (U4) ja (U5) korvata yhtäpitävällä ehdolla:

- (Ua) Jos  $V \in \mathcal{U}$ , niin on olemassa sellainen  $W \in \mathcal{U}$ , jolla  $W \circ W^{-1} \subset V$ .

*Huomautus 3.4.* Kokoelma  $\{\emptyset\}$  on ainoa ehdot täyttävä uniformiteetti tyhjälle joukolle.

**Määritelmä 3.5.** Olkoon  $X$  joukko ja kokoelma  $\mathcal{U} \subset X \times X$  uniformeetti joukolle  $X$ . Tällöin lähistöjen joukko  $B \subset \mathcal{U}$  on uniformeetin  $\mathcal{U}$  kanta, jos jokaiselle lähistölle  $V \in \mathcal{U}$  löytyy kannan alkio  $W \in B$ , jolla pätee  $W \subset V$ .

**Lause 3.6.** Olkoon  $X$  joukko. Kokoelma  $B \subset \mathcal{P}(X \times X)$  on joukon  $X$  erään uniformeetin kanta, jos kokoelmalle  $B$  pätee

(B1) Jos  $V_1, V_2 \in B$  niin on olemassa sellainen  $V_3 \in B$ , jolla  $V_3 \subset V_1 \cap V_2$ ,

(B2) Joukko  $\{(x, x) \mid x \in X\}$  on jokaisen joukon  $V \in B$  osajoukko,

(B3) Jos  $V \in B$ , niin on olemassa sellainen  $V' \in B$ , jolla  $V' \subset V^{-1}$ ,

(B4) Jos  $V \in B$ , niin on olemassa sellainen  $W \in B$ , jolla  $W^2 \subset V$ .

*Todistus.* □

**Lause 3.7.** Uniformisen avaruuden topologia. Olkoon joukko  $X$  varustettu uniformisuudella  $\mathcal{U}$ . Olkoon  $x \in X$  alkio ja  $V \in \mathcal{U}$  lähistö. Olkoon tällöin

$$V(x) = \{y \in X \mid (x, y) \in V\} \quad \text{ja} \quad B(x) = \{V(x) \mid V \in \mathcal{U}\}$$

joukkoja. Uniformeetti  $\mathcal{U}$  määrää topologian joukolle  $X$  niin, että joukko  $V(x)$  on (lähistön  $V$  määräämä) ympäristö alkiolle  $x$  ja joukko  $B(x)$  on alkion  $x$  ympäristökanta kyseisessä topologiassa.

*Todistus.* Olkoon joukko  $X$  varustettu uniformisuudella  $\mathcal{U}$ ,  $x \in X$  alkio ja  $V \in \mathcal{U}$  lähistö avaruudessa  $X$ . Lisäksi olkoot joukot  $V(x)$  ja  $B(x)$  kuten edellä. Joukko  $V(x)$  on epätyhjä, sillä  $x \in V(x)$ . Olkoon  $W \in \mathcal{U}$  lähistö, jolloin  $W(x)$  on alkion  $x$  ympäristö. Alkion  $x$  ympäristöille  $V(x)$  ja  $W(x)$  pätee

$$\begin{aligned} V(x) \cap W(x) &= \{y \in X \mid (x, y) \in V \text{ ja } (x, y) \in W\} \\ &= \{y \in X \mid (x, y) \in V \cap W\} \in B(x), \end{aligned}$$

sillä määritelmän 3.1 ehdon (U2) nojalla pätee  $V \cap W \in B$ . Ehdosta (U1) seuraa, että joukko  $B(x)$  on alkion  $x$  kaikkien ympäristöjen joukko ja siten korollarin 2.5 nojalla ympäristökanta. □

**Huomautus 3.8.** Uniformeetin määräämää topologiaa sanotaan uniformeetin indusoimaksi topologiaksi.

**Määritelmä 3.9.** Olkoot  $X$  ja  $X'$  uniformeja avaruuksia ja  $f: X \rightarrow X'$  kuvaus. Kuvaus  $f$  on *uniformisti jatkuva* (tasaisesti jatkuva), jos jokaiselle avaruuden  $X'$  lähistölle  $V'$  on olemassa avaruuden  $X$  lähistö  $V$  niin, että jokaiselle  $(x, y) \in V$  pätee  $(f(x), f(y)) \in V'$ .

**Korollaari 3.10.** *Olkoot  $X$  ja  $X'$  uniformeja avaruuksia ja  $f: X \rightarrow X'$  uniformisti jatkuva kuvaus. Olkoon  $g: X \times X \rightarrow X' \times X'$  kuvaus, jolla pätee  $g(x, y) = (f(x), f(y))$  kaikilla  $x, y \in X$ . Tällöin jos  $V'$  on avaruuden  $X'$  lähistö, niin alkukuva  $g^{-1}V'$  on avaruuden  $X$  lähistö.*

*Todistus.* Korollaari on suora seuraus määritelmästä 3.9 ja uniformisuuden määritelmän 3.1 ehdosta (U1).  $\square$

**Lause 3.11.** *Olkoot  $X$  ja  $X'$  uniformeja avaruuksia ja  $f: X \rightarrow X'$  uniformisti jatkuva kuvaus. Tällöin kuvaus  $f$  on jatkuva, kun varustetaan joukot  $X$  ja  $Y$  uniformiteettiensa indusoimilla topologioilla.*

*Todistus.* Olkoot  $X$  ja  $X'$  uniformeja avaruuksia ja  $f: X \rightarrow X'$  uniformisti jatkuva kuvaus. Olkoon  $g: X \times X \rightarrow X' \times X'$  kuvaus, jolla pätee  $g(x, y) = (f(x), f(y))$  kaikilla  $x, y \in X$ . Olkoon  $V'$  avaruuden  $X'$  lähistö ja  $x' \in X'$  alkio. Avaruuden  $X'$  uniformiteetin indusoimassa topologiassa kaava

$$V'(x') = \{y' \in X' \mid (x', y') \in V'\}$$

määrää alkion  $x'$  ympäristön avaruudessa  $X$ . Korollarin 3.10 mukaan lähistön  $V'$  alkukuva  $g^{-1}V'$  on avaruuden  $X$  lähistö. Olkoon nyt  $x \in X$  sellainen alkio, jolla  $f(x) = x'$ . Tällöin joukko  $(g^{-1}V')(x)$  on alkion  $x$  ympäristö. Erityisesti ympäristö  $(g^{-1}V')(x)$  kuvautuu ympäristöön  $V'(x')$ , sillä ehdosta  $(x, y) \in g^{-1}V'$  seuraa  $(x', f(y)) \in V'$  kaikilla  $y \in X$ .

Siis ympäristön alkukuva on ympäristö ja siten uniformisti jatkuva kuvaus on jatkuva.  $\square$

**Lause 3.12.** *Olkoot  $X$ ,  $X'$  ja  $X''$  uniformeja avaruuksia ja  $f: X \rightarrow X'$  ja  $g: X' \rightarrow X''$  uniformisti jatkuvia kuvauksia. Tällöin yhdistetty kuvaus  $g \circ f: X \rightarrow X''$  on uniformisti jatkuva.*

*Todistus.* Olkoot  $X$ ,  $X'$  ja  $X''$  uniformeja avaruuksia,  $f: X \rightarrow X'$  ja  $g: X' \rightarrow X''$  uniformisti jatkuvia kuvauksia ja  $V''$  avaruuden  $X''$  lähistö. Tällöin uniformisti jatkuvan kuvauksen määritelmän nojalla on olemassa avaruuden  $X'$  lähistö  $V'$ , jolla jokaisella  $(x', y') \in V'$  pätee  $(g(x'), g(y')) \in V''$ . Edelleen lähistölle  $V'$  on olemassa avaruuden  $X$  lähistö  $V$ , jolla jokaisella  $(x, y) \in V$  pätee  $(f(x), f(y)) \in V'$ . Näin ollen lähistölle  $V''$  on olemassa lähistö  $V$ , jolla jokaisella  $(x, y) \in V$  pätee  $(g(f(x)), g(f(y))) \in V''$ , eli  $((g \circ f)(x), (g \circ f)(y)) \in V''$ .

Siis yhdistetty kuvaus  $g \circ f: X \rightarrow X''$  on uniformisti jatkuva.  $\square$

**Määritelmä 3.13.** *Olkoot  $X$  ja  $X'$  uniformeja avaruuksia ja  $f: X \rightarrow X'$  bijektiivinen kuvaus. Kuvaus  $f$  on *isomorfismi*, jos sekä kuvaus  $f$  että sen käänteiskuvaus  $f^{-1}$  ovat uniformisti jatkuvia.*



**Määritelmä 3.14.** *Uniformiteettien vertailtavuus.* Olkoon  $X$  joukko ja  $\mathcal{U}_1$  ja  $\mathcal{U}_2$  uniformiteetteja joukolle  $X$ . Uniformiteetti  $\mathcal{U}_1$  on hienompi kuin uniformiteetti  $\mathcal{U}_2$ , jos identtinen kuvaus  $id: (X, \mathcal{U}_1) \rightarrow (X, \mathcal{U}_2)$  on uniformisti jatkuva. Tällöin uniformiteetti  $\mathcal{U}_2$  on karkeampi kuin uniformiteetti  $\mathcal{U}_1$ . Jos lisäksi pätee  $\mathcal{U}_1 \neq \mathcal{U}_2$ , niin  $\mathcal{U}_1$  on aidosti hienompi kuin  $\mathcal{U}_2$  ja vastaavasti  $\mathcal{U}_2$  on aidosti karkeampi kuin  $\mathcal{U}_1$ . Sanotaan, että kahta uniformiteettia  $\mathcal{U}_1$  ja  $\mathcal{U}_2$  voidaan vertailla, jos  $\mathcal{U}_1$  on hienompi tai karkeampi kuin  $\mathcal{U}_2$ . Uniformiteeteille  $\mathcal{U}_1$  ja  $\mathcal{U}_2$  pätee  $\mathcal{U}_1 = \mathcal{U}_2$ , jos  $\mathcal{U}_1$  on sekä hienompi että karkeampi kuin  $\mathcal{U}_2$ .

**Korollari 3.15.** *Olkoon  $X$  joukko ja  $\mathcal{U}_1$  ja  $\mathcal{U}_2$  uniformiteetteja joukolle  $X$ . Uniformiteetti  $\mathcal{U}_1$  on hienompi kuin uniformiteetti  $\mathcal{U}_2$  jos ja vain jos jokaisella lähistöllä  $V \in \mathcal{U}_2$  pätee  $V \in \mathcal{U}_1$ .*

**Korollari 3.16.** *Olkoon  $X$  joukko,  $\mathcal{U}_1$  ja  $\mathcal{U}_2$  uniformiteetteja joukolle  $X$  ja  $\mathcal{U}_1$  on hienompi kuin  $\mathcal{U}_2$ . Tällöin uniformiteetin  $\mathcal{U}_1$  indusoima topologia on hienompi kuin uniformiteetin  $\mathcal{U}_2$  indusoima topologia.*

**Määritelmä 3.17.** *Kuvausperheen indusoima uniformiteetti* (initial uniformities). Olkoon  $X$  joukko ja  $Y_i$  uniformiteetilla varustettuja joukkoja kaikilla  $i \in I$ , jollain indeksijoukolla  $I$ . Olkoon  $f_i: X \rightarrow Y_i$  uniformisti jatkuvia kuvauksia kaikilla  $i \in I$ . Olkoon  $g = f_i \times f_i: X \times X \rightarrow Y_i \times Y_i$  kuvaus kaikilla  $i \in I$ . Olkoon

$$B = \left\{ \bigcap_{i \in I} g^{\leftarrow}(V_i) \mid V_i \in \mathcal{U}_i \right\}$$

missä  $\mathcal{U}_i$  on avaruuden  $Y_i$  uniformiteetti. Tällöin  $B$  on kanta eräälle avaruuden  $X$  uniformiteetille  $\mathcal{U}$ . Kyseinen uniformiteetti  $\mathcal{U}$  on karkein niistä uniformiteeteista, joiden suhteen kaikki kuvaukset  $f_i$  ovat uniformisti jatkuvia.

**Määritelmä 3.18.** *Uniformiteettien pienin yläraja.* Olkoon  $X$  joukko ja  $I$  jokin indeksijoukko. Olkoon  $(\mathcal{U}_i)_{i \in I}$  perhe uniformiteetteja joukolle  $X$ . Tällöin perheen  $(\mathcal{U}_i)_{i \in I}$  *pienin yläraja* on uniformiteetti  $\mathcal{U}$ , joka on kuvausten  $id: X \rightarrow (X, \mathcal{U}_i)$  määritelmän 3.17 mukaisesti indusoima.

# Luku 4

## Pseudometriikat

Tässä kappaleessa tutustutaan pseudometriikoihin, jotka ovat tavanomaisten metriikoiden yleistys. Lisää aiheesta [2].

**Määritelmä 4.1.** Olkoon  $X$  joukko ja  $f: X \times X \rightarrow [0, +\infty]$  kuvaus. Kuvaus  $f$  on *pseudometriikka*, jos seuraavat ehdot pätevät:

(P1)  $f(x, x) = 0$  kaikilla  $x \in X$ ,

(P2)  $f(x, y) = f(y, x)$  kaikilla  $x, y \in X$ ,

(P3)  $f(x, y) \leq f(x, z) + f(z, y)$  kaikilla  $x, y, z \in X$ .

*Huomautus 4.2.* Pseudometriikan määritelmästä saadaan metriikan määritelmä, jos rajoitetaan äärellisiin arvoihin ja vahvistetaan ehtoa (P1) muotoon

(M1)  $f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$  kaikilla  $x, y \in X$ .

Metriikan ehdot täyttävä kuvaus on pseudometriikka, joten jokainen metriikka on myös pseudometriikka.

**Esimerkki 4.3.** Euklidinen etäisyys on pseudometriikka.

**Esimerkki 4.4.** Olkoon  $X$  epätyhjä joukko ja  $f: X \times X \rightarrow [0, +\infty]$  sellainen kuvaus, jolla

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{jos } x = y \\ \infty, & \text{muulloin.} \end{cases}$$

Tällöin  $f$  on pseudometriikka.

**Esimerkki 4.5.** Olkoon  $X$  epätyhjä joukko ja  $g: X \rightarrow \mathbb{R}$  (äärellisarvoinen) kuvaus. Tällöin kuvaus  $f: X \times X \rightarrow [0, +\infty]$  kaavalla  $f(x, y) = |g(x) - g(y)|$  on pseudometriikka.

**Esimerkki 4.6.** Olkoon  $X$  kaikkien muotoa  $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  olevien jatkuvien kuvausten joukko. Tällöin kuvaus  $f: X \times X \rightarrow [0, +\infty]$  kaavalla  $f(x, y) = \int_0^1 |x(t) - y(t)| dt$  määrittelee pseudometriikan joukolle  $X$ .

*Huomautus 4.7.* Määritelmän 4.1 ehdon (P3) nojalla epäyhtälöstä  $f(x, z) + f(z, y) < \infty$  seuraa  $f(x, y) < \infty$ . Näin ollen epäyhtälöistä

$$f(x, z) \leq f(x, y) + f(y, z) \text{ ja } f(y, z) \leq f(y, x) + f(x, z)$$

seuraa epäyhtälö  $|f(x, z) - f(z, y)| \leq f(x, y)$ .

**Esimerkki 4.8.** Olkoon  $f$  pseudometriikka joukolle  $X$  ja  $\lambda \in \mathbb{R}$  reaaliluku, jolla  $\lambda > 0$ . Tällöin kuvaus  $\lambda f$ , jolla  $(\lambda f)(x) = \lambda(f(x))$  kaikilla  $x \in X \times X$  on pseudometriikka.

**Esimerkki 4.9.** Olkoon  $(f_i)_{i \in I}$  perhe joukon  $X$  pseudometriikoita. Tällöin summakuvaus

$$f: X \times X \rightarrow [0, +\infty], \quad f(x, y) = \sum_{i \in I} f_i(x, y)$$

kaikilla  $x, y \in X$  on pseudometriikka.

**Esimerkki 4.10.** Olkoon  $(f_i)_{i \in I}$  perhe joukon  $X$  pseudometriikoita. Tällöin kaikilla alkioilla  $x, y \in X$  epäyhtälöstä  $f_i(x, y) \leq f_i(x, z) + f_i(z, y)$  seuraa epäyhtälö

$$\sup_{i \in I} f_i(x, y) \leq \sup_{i \in I} (f_i(x, z) + f_i(z, y)).$$

Tällöin kuvaus  $f: X \times X \rightarrow [0, +\infty]$  missä

$$f(x, y) = \sup_{i \in I} f_i(x, y) \quad \text{kaikilla } x, y \in X$$

on pseudometriikka.

## Luku 5

# Pseudometriikan määrittely uniformisuus

**Lause 5.1.** Olkoon  $a \in \mathbb{R}_+$  reaaliluku ja  $U_a \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$  joukko kaavalla

$$U_a = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}^n, |x - y| \leq a\}.$$

Kokoelma  $B = \{U_a \mid a \in \mathbb{R}_+\}$  muodostaa joukon  $\mathbb{R}^n$  uniformisuuden kannan.

*Todistus.* Lauseen 3.6 ehdot pätevät:

- (B1) Olkoon  $a_1, a_2 \in \mathbb{R}_+$  reaalilukuja, joilla  $a_1 \leq a_2$ . Tällöin kaavasta  $|x - y| \leq a_1$  seuraa  $|x - y| \leq a_2$  kaikilla  $x, y \in \mathbb{R}$ . Näin ollen  $U_{a_1} \subset U_{a_2}$  ja siis  $U_{a_1} \subset U_{a_1} \cap U_{a_2}$ ,
- (B2) Olkoon  $x \in \mathbb{R}^n$ . Tällöin kaikilla  $a \in \mathbb{R}_+$  pätee  $|x - x| = 0 < a$ , joten joukko  $\{(x, x) \mid x \in X\}$  on jokaisen joukon  $U_a \in B$  osajoukko,
- (B3) Olkoon  $x', y' \in \mathbb{R}^n$  ja  $a \in \mathbb{R}_+$ . Tällöin jos  $|x' - y'| \leq a$  niin myös  $|y' - x'| \leq a$ . Näin ollen

$$\begin{aligned} U_a &= \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{R}^n, |x - y| \leq a\} \\ &= \{(y, x) \mid x, y \in \mathbb{R}^n, |x - y| \leq a\} \\ &= U_a^{-1}. \end{aligned}$$

Siis jokaiselle  $U_a$  pätee  $U_a \subset U_a^{-1}$ .

- (B4) Olkoon  $a \in \mathbb{R}_+$  reaaliluku ja  $x, y, z \in \mathbb{R}^n$  sellaisia pisteitä, joilla  $(x, z) \in U_a$  ja  $(z, y) \in U_a$ , eli  $|x - z| \leq a$  ja  $|z - y| \leq a$ . Tällöin kolmioepäytälön avulla saadaan

$$|x - y| \stackrel{\Delta\text{-ey}}{\leq} |x - z| + |z - y| \leq a + a = 2a,$$

eli  $|x - y| \leq 2a$ . Tästä seuraa, että  $U_a^2 \subset U_{2a}$ , joten jokaiselle reaaliluvun  $b \in \mathbb{R}_+$  määräämälle joukolle  $U_b$  löytyy joukko  $U_{b/2}$ , jolla  $U_{b/2}^2 \subset U_b$ .

Siis kokoelma  $B = \{U_a \mid a \in \mathbb{R}_+\}$  muodostaa joukon  $\mathbb{R}^n$  uniformisuuden kannan.  $\square$

Edeltävää lausetta voidaan yleistää seuraavasti:

**Lause 5.2.** *Olkoon  $X$  joukko ja  $f$  pseudometriikka joukolle  $X$ . Tällöin pseudometriikka  $f$  määrittelee sellaisen uniformiteetin joukolle  $X$ , jonka kannan muodostaa kokoelma*

$$B = \{f^{\leftarrow}[0, a] \subset X \times X \mid a \in \mathbb{R}_+\}.$$

*Todistus.* Olkoon  $a \in \mathbb{R}_+$  reaaliluku ja merkitään joukkoa  $f^{\leftarrow}[0, a] \subset X \times X$  kaavalla  $f^{\leftarrow}[0, a] = U_a$ . Lauseen 3.6 ehdot pätevät:

(B1) Olkoot  $a_1, a_2 \in \mathbb{R}_+$  reaalilukuja, joilla  $a_1 \leq a_2$ . Tällöin pätee

$$U_{a_1} = f^{\leftarrow}[0, a] \subset f^{\leftarrow}[0, b] = U_{a_2}$$

ja siis  $U_{a_1} \subset U_{a_1} \cap U_{a_2}$ ,

(B2) Kuvaus  $f$  on pseudometriikka, joten pseudometriikan määritelmän 4.1 ehdon (P1) nojalla kaikilla  $x \in X$  pätee  $f(x, x) = 0$ . Toisin sanoen pistepareista  $(x, x)$  muodostuvan joukon  $\{(x, x) \mid x \in X\}$  jokainen alkio kuvautuu pseudometriikassa nolaksi. Näin ollen joukko  $\{(x, x) \mid x \in X\}$  sisältyy jokaisen suljetun välin  $[0, a]$  alkukuvaan  $f^{\leftarrow}[0, a]$  kaikilla  $a \in \mathbb{R}_+$ .

(B3) Pseudometriikan ehdosta (P2) seuraa, että  $f(x, y) = f(y, x)$  kaikilla  $x, y \in X$ . Tällöin  $(x, y) \in U_a \Leftrightarrow (y, x) \in U_a$  ja siis  $U_a^{-1} = U_a$ , eli jokaiselle  $U_a$  pätee  $U_a \subset U_a^{-1}$ .

(B4) Olkoon  $a \in \mathbb{R}_+$  reaaliluku ja  $x, y, z \in X$  sellaisia alkioita, joilla  $(x, z) \in U_a$  ja  $(z, y) \in U_a$ , eli  $f(x, z) \leq a$  ja  $f(z, y) \leq a$ . Tällöin pseudometriikan ehdosta (P3) seuraa

$$f(x, y) \leq f(x, z) + f(z, y) \leq a + a = 2a,$$

eli  $f(x, y) \leq 2a$ . Tästä seuraa, että  $U_a^2 \subset U_{2a}$ , joten jokaiselle reaaliluvun  $b \in \mathbb{R}_+$  määräämälle joukolle  $U_b$  löytyy joukko  $U_{b/2}$ , jolla  $U_{b/2}^2 \subset U_b$ .

Siis kokoelma  $B = \{U_a \mid a \in \mathbb{R}_+\} = \{f^{\leftarrow}[0, a] \mid a \in \mathbb{R}_+\}$  muodostaa joukon  $\mathbb{R}^n$  uniformisuuden kannan ja voimme nyt muodostaa seuraavan määritelmän.  $\square$

**Määritelmä 5.3.** Olkoon  $X$  joukko ja  $f$  ja  $g$  pseudometriikoita joukolle  $X$ . Tällöin lauseen 5.2 nojalla pseudometriikat  $f$  ja  $g$  määrittelevät jotkut uniformiteetit joukolle  $X$ . Pseudometriikat  $f$  ja  $g$  ovat *ekvivalentteja*, jos ne määräävät saman uniformiteetin.

**Korollari 5.4.** Olkoon  $X$  joukko ja  $f$  ja  $g$  pseudometriikoita joukolle  $X$ . Määritelmästä 5.3 seuraa, että pseudometriikan  $f$  määräämä uniformiteetti  $\mathcal{U}_f$  on karkeampi kuin pseudometriikan  $g$  määräämä uniformiteetti  $\mathcal{U}_g$ , jos ja vain jos jokaiselle  $a \in \mathbb{R}_+$  on olemassa sellainen  $b \in \mathbb{R}_+$ , jolla  $g(x, y) \leq b \Rightarrow f(x, y) \leq a$  kaikilla  $x, y \in X$ .

Lisäksi, jos jokaiselle  $a \in \mathbb{R}_+$  on olemassa  $b \in \mathbb{R}_+$ , jolla  $f(x, y) \leq b \Rightarrow g(x, y) \leq a$  kaikilla  $x, y \in X$ , niin  $f$  ja  $g$  ovat ekvivalentteja pseudometriikoita.

*Todistus.* Olkoon  $X$  joukko ja  $f$  ja  $g$  pseudometriikoita joukolle  $X$ . Määritelmän 5.2 mukaan pseudometriikan  $f$  määrittelemän uniformiteetin  $\mathcal{U}_f$  kannan muodostaa kokoelma

$$B_f = \{f^{\leftarrow}[0, a] \subset X \times X \mid a \in \mathbb{R}_+\}.$$

Tällöin uniformiteetti  $\mathcal{U}_f$  on kokoelma

$$\mathcal{U}_f = \{V \subset X \times X \mid f^{\leftarrow}[0, a] \subset V, \text{ jollain } a \in \mathbb{R}_+\}.$$

Vastaavasti uniformiteetin  $\mathcal{U}_g$  kannan muodostaa kokoelma

$$B_g = \{g^{\leftarrow}[0, a] \subset X \times X \mid a \in \mathbb{R}_+\}$$

ja uniformiteetti  $\mathcal{U}_g$  on kokoelma

$$\mathcal{U}_g = \{V \subset X \times X \mid g^{\leftarrow}[0, a] \subset V, \text{ jollain } a \in \mathbb{R}_+\}.$$

Osoitetaan väitteen implikaatio molempiin suuntiin.

$\Rightarrow$  Olkoon uniformiteetti  $\mathcal{U}_f$  karkeampi kuin  $\mathcal{U}_g$  ja näin ollen määritelmän 3.14 mukaan identtinen kuvaus  $id: (X, \mathcal{U}_g) \rightarrow (X, \mathcal{U}_f)$  on uniformisti jatkuva. Tällöin määritelmän 3.9 mukaan jokaiselle maalijoukon lähistölle  $V' \in \mathcal{U}_f$  on olemassa lähtöjoukon lähistö  $V \in \mathcal{U}_g$  niin, että jokaiselle  $(x, y) \in V$  pätee  $(x, y) \in V'$  kaikilla  $x, y \in X$ . Tarkastelemalla uniformiteettien kantojen jäseniä voidaan edeltävä ehto muotoilla seuraavasti: Jokaisella  $a \in \mathbb{R}_+$  on olemassa  $b \in \mathbb{R}_+$  niin, että kaikilla  $x, y \in X$  pätee  $(x, y) \in g^{\leftarrow}[0, b] \Rightarrow (x, y) \in f^{\leftarrow}[0, a]$ , eli  $g(x, y) \leq b \Rightarrow f(x, y) \leq a$ .

$\Leftarrow$  Oletetaan, että jokaiselle reaaliluvulle  $a \in \mathbb{R}_+$  on olemassa sellainen  $b \in \mathbb{R}_+$ , jolla  $g(x, y) \leq b \Rightarrow f(x, y) \leq a$ , eli  $(x, y) \in g^{\leftarrow}[0, b] \Rightarrow (x, y) \in f^{\leftarrow}[0, a]$ , kaikilla  $x, y \in X$ . Siis jokaiselle uniformiteetin  $\mathcal{U}_f$  kannan jäsenelle  $f^{\leftarrow}[0, a']$  missä  $a' \in \mathbb{R}_+$  on olemassa uniformiteetin  $\mathcal{U}_g$  kannan jäsen  $g^{\leftarrow}[0, b']$ ,  $b' \in \mathbb{R}_+$  niin, että  $(x, y) \in g^{\leftarrow}[0, b'] \Rightarrow (x, y) \in f^{\leftarrow}[0, a']$ , kaikilla  $x, y \in X$ . Näin ollen identtinen kuvaus  $id: (X, \mathcal{U}_g) \rightarrow (X, \mathcal{U}_f)$  on uniformisti jatkuva ja siten uniformiteetti  $\mathcal{U}_g$  on uniformiteettia  $\mathcal{U}_f$  hienompi. Siis pseudometriikan  $f$  määräämä uniformiteetti  $\mathcal{U}_f$  on karkeampi kuin pseudometriikan  $g$  määräämä uniformiteetti  $\mathcal{U}_g$ .

Lisäksi määritelmistä 3.14 ja 5.3 seuraa, että jos  $\mathcal{U}_f$  on sekä hienompi että karkeampi kuin  $\mathcal{U}_g$ , niin pseudometriikat  $f$  ja  $g$  ovat ekvivalentteja.  $\square$

**Määritelmä 5.5.** Olkoon  $X$  joukko ja  $(f_i)_{i \in I}$  joukon  $X$  pseudometriikkaperhe. Tällöin pseudometriikkojen  $f_i$  määrittelemien uniformiteettien  $\mathcal{U}_{f_i}$  pienintä ylärajaa sanotaan perheen  $(f_i)_{i \in I}$  määrittelemäksi uniformiteetiksi.

**Määritelmä 5.6.** Olkoon  $X$  joukko ja olkoot  $(f_i)_{i \in I}$  ja  $(g_j)_{j \in J}$  joukon  $X$  pseudometriikkaperheitä. Perheet  $(f_i)$  ja  $(g_j)$  ovat ekvivalentteja, jos niiden määrittelemät uniformiteetit ovat samoja.

**Määritelmä 5.7.** Olkoon  $X$  joukko ja  $(f_i)_{i \in I}$  joukon  $X$  pseudometriikkaperhe. Olkoon  $H \subset I$  äärellinen joukko ja  $g_H: X \rightarrow [0, \infty]$  kuvaus, jolla  $g_H(x) = \sup_{i \in H} f_i(x)$ . Nyt

$$\{g_H^{\leftarrow}([0, a]) \subset X \times X \mid H \subset I \text{ äärellinen}, a \in \mathbb{R}_+\}$$

on joukon  $X$  erään uniformiteetin kanta. Olkoon nyt  $J = \{H \mid H \subset I, H \text{ äärellinen}\}$  potenssijoukon  $\mathcal{P}(I)$  äärellinen osajoukko ja  $g_J$  kuvaus, jolla  $\sup_{H \in J} g_H \in (g_H)_{H \subset I}$ .

Nyt siis  $\sup_{H \in J} g_H \in (g_H)_{H \subset I}$  ja  $H \subset I$  on äärellinen joukko. Tällöin sanotaan, että perhe  $(g_H)$  on *saturoitu* (saturated), *ekvivalentti* perheen  $(f_i)_{i \in I}$  kanssa ja saatu saturoimalla perhe  $(f_i)_{i \in I}$ .

Mikäli indeksijoukko  $I$  on äärellinen, niin perheen  $(f_i)_{i \in I}$  määräämä uniformiteetti on sama kuin pseudometriikan  $g = \sup_{i \in I} f_i$  määräämä.

**Määritelmä 5.8.** Olkoon uniformiteetit  $\mathcal{U}$  ja  $\mathcal{U}'$  saturoitujen perheiden  $(f_i)_{i \in I}$  ja  $(g_j)_{j \in J}$  määräämiä. Uniformiteetti  $\mathcal{U}$  on karkeampi kuin uniformiteetti  $\mathcal{U}'$ , jos jokaisella  $i \in I$  ja  $a \in \mathbb{R}_+$  löytyy  $j \in J$  ja  $b \in \mathbb{R}_+$ , joilla ehdosta  $g_j(x, y) \leq b$  seuraa  $f_i(x, y) \leq a$ .

**Lemma 5.9.** Olkoon  $X$  joukko ja  $\mathcal{U}$  uniformiteetti joukolle  $X$ . Tällöin on olemassa pseudometriikkaperhe  $(f_i)_{i \in I}$ , joka määrittelee uniformiteetin  $\mathcal{U}$ .

*Todistus.* Jokaiselle  $U \in \mathcal{U}$  määritellään perhe  $(V_n)$ , jolla  $V_1 \subset U$  ja  $V_{n+1}^2 \subset V_n$  kaikilla  $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ . Nyt perhe  $(V_n)$  on kanta eräälle joukon  $X$  uniformiteetille  $\mathcal{U}_V$ , joka on karkeampi kuin  $\mathcal{U}$ . Erityisesti  $\mathcal{U}$  on uniformiteettien  $\mathcal{U}_V, V \in \mathcal{U}$  pienin yläraja. Tällöin lemma on seuraus seuraavasta lauseesta, sillä  $(U_n)$  on uniformiteetin  $\mathcal{U}$  numeroituva kanta.  $\square$

**Lause 5.10.** Olkoon  $X$  joukko ja  $\mathcal{U}$  uniformiteetti joukolle  $X$ . Jos uniformiteetilla  $\mathcal{U}$  on numeroituva kanta, niin on olemassa pseudometriikka  $f: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ , jonka määräämä uniformiteetti on identtinen uniformiteetin  $\mathcal{U}$  kanssa.

*Todistus.* Olkoon  $(V_n)$  numeroituva kanta uniformiteetille  $\mathcal{U}$ . Tällöin olkoon  $(U_n)$  perhe symmetrisiä uniformiteetin  $\mathcal{U}$  lähistöjä, joilla  $U_1 \subset V_1$  ja  $U_{n+1}^3 \subset U_n \cap V_n$ , kun  $n \geq 1$ . Nyt

$(U_n)$  on myös uniformiteetin  $\mathcal{U}$  kanta ja erityisesti  $U_{n+1}^3 \subset U_n \cap V_n$ , kun  $n \geq 1$ .

Olkoon  $g: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$  kuvaus, jolla

$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & , \text{ jos } (x, y) \in U_n \text{ kaikilla } n \geq 1 \\ 1 & , \text{ jos } (x, y) \notin U_1. \\ 2^{-k} & , \text{ jos } (x, y) \in U_n \text{ kaikilla } n \leq k \text{ ja } (x, y) \notin U_{k+1} \end{cases}$$

Nyt  $g$  on symmetrinen, positiivinen ja  $g(x, x) = 0$  kaikilla  $x \in X$ .

Olkoon nyt  $f: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$  kuvaus, jolla

$$f(x, y) = \inf \sum_{i=0}^{p-1} g(z_i, z_{i+1}),$$

missä  $p \in \mathbb{N}, p \geq 1$  ja  $(z_i)_{0 \leq i \leq p}$  joukon  $X$  alkioista muodostuva jono, jossa  $z_0 = x$  ja  $z_p = y$ . Kuvauksen  $f$  määrittelystä seuraa, että  $f$  on symmetrinen, kolmioepäyhtälö pätee ja kaavat  $f(x, y) \geq 0$  ja  $f(x, x) = 0$  pätevät kaikilla  $x, y \in X$ . Siis  $f$  on pseudometriikka. Näytetään seuraavaksi, että epäyhtälöt

$$(5.11) \quad \frac{1}{2} g(x, y) \leq f(x, y) \leq g(x, y)$$

pätevät. Kaavan oikea puoli, eli  $f(x, y) \leq g(x, y)$  seuraa siitä, että

$$f(x, y) = \inf \sum_{i=0}^{p-1} g(z_i, z_{i+1}) \leq \sum_{i=0}^1 g(z_i, z_{i+1}) = g(z_0, z_1) = g(x, y).$$

Kaavan 5.11 vasen puoli osoitetaan induktion avulla. Olkoon  $p \in \mathbb{N}$  luonnollinen luku. Nyt jokaisella  $p + 1$  alkion jonolla joukon  $X$  alkioita  $(z_i)_{0 \leq i \leq p}$ , jolla  $z_0 = x$  ja  $z_p = y$ , saadaan

$$(5.12) \quad \sum_{i=0}^{p-1} g(z_i, z_{i+1}) \geq \frac{1}{2} g(x, y).$$

Jos  $p = 1$ , niin summassa on vain yksi termi

$$g(z_0, z_1) = g(x, y) \geq \frac{1}{2} g(x, y).$$

Merkitään

$$a = \sum_{i=0}^{p-1} g(z_i, z_{i+1}).$$



Määrittelyn nojalla  $g(x, y) \leq 1$ , joten jos  $a \geq 1/2$ , niin yhtälö 5.12 pätee muodossa  $a \geq \frac{1}{2} \geq \frac{1}{2}g(x, y)$ . Oletetaan, että  $a < 1/2$  ja että  $h$  on suurin niistä indekseistä  $q$ , joilla  $\sum_{i < q} g(z_i, z_{i+1}) \leq a/2$ . Tällöin

$$\sum_{i < h} g(z_i, z_{i+1}) \leq a/2 \quad \text{ja} \quad \sum_{i < h+1} g(z_i, z_{i+1}) > a/2,$$

joten  $\sum_{i > h} g(z_i, z_{i+1}) \leq a/2$ . Induktio-oletuksen nojalla  $g(x, z_h) \leq a$ ,  $g(z_{h+1}, y) \leq a$  ja toisaalta myös  $g(x, z_h) \leq a$  pätevät. Olkoon  $k \in \mathbb{N}$  pienin luku, jolla  $2^{-k} \leq a$ . Tällöin  $k \geq 2$  ja kuvauksen  $g$  määrittelystä seuraa, että  $(x, z_h) \in U_k$ ,  $(z_h, z_{h+1}) \in U_k$  ja  $(z_{h+1}, y) \in U_k$ . Nyt  $(x, y) \in U_k^3 \subset U_{k-1}$  ja edelleen  $g(x, y) \leq 2^{-(k-1)} = 2^{1-k} \leq 2a$ , eli  $\frac{1}{2}g(x, y) \leq a$ . Näin ollen kaavan 5.11 epäyhtälöt pätevät ja niistä seuraa, että jokaisella  $a > 0$  pätee  $U_k \subset f^{\leftarrow}([0, a])$ , kun  $2^{-k} < a$ . Toisaalta myös  $f^{\leftarrow}([0, a]) \subset U_k$ , joten joukot  $f^{\leftarrow}([0, a])$  muodostavat kannan uniformiteetille  $\mathcal{U}$ . Siis löydettiin pseudometriikka  $f$ , joka määrittelee uniformiteetin  $\mathcal{U}$ .  $\square$

## Luku 6

# Uniformisoituvat avaruudet

Tässä luvussa perehdytään uniformisoituihin (uniformizable) avaruuksiin.

**Määritelmä 6.1.** Olkoon  $(X, \mathcal{T})$  topologinen avaruus ja  $\mathcal{U}$  uniformiteetti joukolle  $X$ . Uniformiteetti  $\mathcal{U}$  on *yhteensopiva* topologian  $\mathcal{T}$  kanssa, jos uniformiteetin  $\mathcal{U}$  indusoima topologia  $\mathcal{T}_{\mathcal{U}}$  on karkeampi kuin topologia  $\mathcal{T}$ .

**Määritelmä 6.2.** Topologinen avaruus  $(X, \mathcal{T})$  on *uniformisoituva*, jos joukolle  $X$  voidaan muodostaa topologian  $\mathcal{T}$  kanssa yhteensopiva uniformiteetti.

**Lause 6.3.** Olkoon  $(X, \mathcal{T})$  topologinen avaruus. Avaruuden  $(X, \mathcal{T})$  uniformisoituvuus on yhtäpitävää seuraavan ehdon kanssa:

(Z) Kaikkien alkioiden  $x \in X$  kaikilla ympäristöillä  $V \in \mathcal{T}$  on olemassa jatkuva reaalivertainen kuvaus  $f: X \rightarrow [0, 1]$ , jolla  $f(x) = 0$  ja  $f(y) = 1$  kaikilla  $y \in X \setminus V$ .

*Todistus.* Näytetään ensin, että ehto on välttämätön. Lauseen 5.9 nojalla uniformiteetille voidaan määrittää pseudometriikkaperhe, joka indusoi kyseisen uniformiteetin. Lisäksi uniformiteetin indusoiman pseudometriikkaperheen voidaan olettaa tuloksen ?? nojalla olevan saturoitu. Tällöin määritelmän 5.2 nojalla on olemassa  $a \in \mathbb{R}_+$ ,  $\alpha \in I$  ja pseudometriikka  $f_\alpha \in (f_i)_{i \in I}$ , jolla  $f_\alpha(x_0, x) \geq a$  kaikilla  $x \in X \setminus V_0$  ja  $f_\alpha(x_0, x) = 0$ . Tämän seurauksena kuvaus  $g: X \rightarrow [0, 1]$  kaavalla  $g(x) = \inf (1, \frac{1}{a} f_\alpha(x_0, x))$  pisteelle  $x_0$  ja ympäristölle  $V_0$  toteuttaa ehdon (Z).

Toisaalta ehto on myös riittävä: Olkoon  $(X, \mathcal{T})$  topologinen avaruus, jolla ehto (Z) pätee. Olkoon  $x_0 \in X$  alkio,  $V_0 \subset X$  alkion  $x_0$  ympäristö ja  $f: X \rightarrow [0, 1]$  ehdon (Z) antama kuvaus alkioille  $x_0$  ja sen ympäristölle  $V_0$ . Tällöin kuvaus  $g: X \times X \rightarrow [0, \infty]$  kaavalla  $g(x_0, x) = f(x)$  on pseudometriikka. Olkoon  $\mathcal{U}$  pseudometriikan  $g$  määrittämä uniformiteetti ja  $a \in \mathbb{R}_+$  reaaliluku. Tällöin  $g^{\leftarrow}[0, a] = \{(x, y) \mid g(x, y) \leq a\}$  on lähistö pseudometriikan  $g$  määrittämässä uniformiteetissa  $\mathcal{U}$ . Merkitään  $g^{\leftarrow}[0, a] = U_a$ , jolloin

joukko  $U_a(x_0) = \{y \mid g(x_0, y) \leq a\}$  on alkion  $x_0$  ympäristö uniformiteetin  $\mathcal{U}$  indusoimassa topologiassa  $\mathcal{T}'$ . Joukkojen määrittelyistä seuraa, että jos  $a < 1$ , niin  $U_a(x) \subset V_0$  ja tällöin kokoelma  $B = \{U_a(x_0) \mid g(x_0, y) \leq a\}$  on alkion  $x_0$  ympäristökanta topologiassa  $\mathcal{T}$ .

Siis avaruus  $(X, \mathcal{T})$ , joka toteuttaa ehdon (Z) on uniformisoituva. □

# Luku 7

## Hausdorff uniforminen avaruus

Tässä luvussa määritellään Hausdorff uniformiset avaruudet ja esitetään niiden ominaisuuksia, oleellisinpana täydelliseen Hausdorff uniformiseen avaruuteen laajentaminen.

**Määritelmä 7.1.** Olkoon  $X$  joukko ja  $\mathcal{U}$  uniformiteetti joukolle  $X$ . Uniformiteetti  $\mathcal{U}$  on Hausdorff, jos kaikille  $x, y \in X, x \neq y$  on olemassa pseudometriikka  $f_i \in (f_i)_{i \in I}$ , jolla  $f_i(x, y) \neq 0$ . Erityisesti, jos uniformiteetti  $\mathcal{U}$  on Hausdorff ja yhden pseudometriikan  $f$  määrittelemä, niin  $f(x, y) \neq 0$  kaikilla  $x, y \in X$ .

Uniformiteetti  $\mathcal{U}$  ei ole Hausdorff, jos on olemassa sellaiset alkiot  $x, y \in X$ , joilla  $x \neq y$  ja  $f_i(x, y) = 0$  kaikilla  $i \in I$ .

**Lemma 7.2.** Olkoon  $X$  uniforminen avaruus,  $A \subset X$  epätyhjä osajoukko ja  $f$  pseudometriikka joukolle  $X$ . Tällöin pseudometriikan rajoittuma  $f|_A: A \times A \rightarrow [0, \infty]$  kaavalla  $f|_A(x) = f(x)$  kaikilla  $x \in A \times A$  on pseudometriikka joukolle  $A$ .

**Lemma 7.3.** Olkoon  $X$  uniforminen avaruus,  $A \subset X$  epätyhjä osajoukko ja  $(f_i)_{i \in I}$  pseudometriikkaperhe, joka määrää joukon  $X$  uniformiteetin. Tällöin joukon  $X$  uniformiteetti määrää joukolle  $A$  saman uniformiteetin kuin pseudometriikkaperhe  $(f_i|_A)_{i \in I}$ .

**Määritelmä 7.4.** Olkoon  $X$  uniforminen avaruus. Tällöin on olemassa täydellinen (complete) Hausdorff uniforminen avaruus  $\hat{X}$  ja uniformisti jatkuva kuvaus  $i: X \rightarrow \hat{X}$ , jolle pätee seuraava ominaisuus:

- (P) Olkoon  $Y$  täydellinen Hausdorff uniforminen avaruus ja  $f: X \rightarrow Y$  uniformisti jatkuva kuvaus. Tällöin on olemassa yksikäsitteinen uniformisti jatkuva  $g: \hat{X} \rightarrow Y$ , jolla pätee  $f = g \circ i$

Olkoon lisäksi  $X_1$  täydellinen Hausdorff uniforminen avaruus ja  $i_1: X \rightarrow X_1$  uniformisti jatkuva kuvaus, jolla on ominaisuus (P). Tällöin on olemassa yksikäsitteinen isomorfismi  $\varphi: \hat{X} \rightarrow X_1$ , jolla pätee  $i_1 = \varphi \circ i$ .

**Korollaari 7.5.** *Jos  $X$  on Hausdorff uniforminen avaruus, niin "kanoninen kuvaus"  $i: X \rightarrow \hat{X}$  määrää isomorfismin  $X \rightarrow X'$ , jossa  $X'$  on tiheä joukossa  $\hat{X}$ .*

# Kirjallisuutta

- [1] Nicolas Bourbaki: General Topology Part 1, 1. painos, Hermann, 1966.
- [2] Nicolas Bourbaki: General Topology Part 2, 1. painos, Hermann, 1966.
- [3] Jussi Väisälä: Topologia II, 2. korjattu painos, Limes ry, 2005.