

# Kuratowskin upotuslause

Pekka Keipi

9. elokuuta 2016

# Sisältö

1	Johdanto	2
2	Funktion rajoittuma, normi ja sup-normi	3
3	Metrinen avaruus	6
4	Konvekxi verho	9
5	Banachin avaruus	11
6	Kuratowskin upotuslause	12

# Luku 1

## Johdanto

Tämän tutkielman tarkoituksena on todistaa Kuratowskin upotuslause. Lause on nimetty puolalaisen matemaatikon Kazimierz Kuratowskin mukaan. Osa lauseen todistuksesta on tehtävänä kurssikirjassa Topologia 1, joka on yksi matematiikan pääaineopiskelijoiden aineopintoja.

Kazimierz Kuratowski (2.2.1896 - 18.6.1980) oli puolalainen matemaatikko, joka keskittyi tutkimuksessaan abstraktiin topologiaan ja metrisiin struktuureihin. jne.. Luku 2, ks. [2]

## Luku 2

# Funktion rajoittuma, normi ja sup-normi

Tässä kappaleessa esitellään vektori- ja normiavaruuksien ja näiden funktioiden perusominaisuuksia. [2]

### **Määritelmä 2.1.** *Vektoriavaruus*

Joukko  $V$  on  $\mathbb{R}$ -kertoiminen vektoriavaruus, jos kaikkiin  $v, w \in V$  ja  $a \in \mathbb{R}$  on liitetty yksikäsitteinen summa  $v + w \in V$  ja tulo  $av \in V$  niin, että seuraavat ominaisuudet ovat voimassa:

- i)  $(u + v) + w = u + (v + w)$  kaikilla  $u, v, w \in V$ .
- ii)  $v + w = w + v$  kaikilla  $v, w \in V$ .
- iii) On olemassa sellainen  $0 = 0_v$ , että  $v + 0 = v$  kaikilla  $v \in V$ .
- iv) Jokaiseen  $v \in V$  liittyy sellainen  $-v \in V$ , että  $v + (-v) = 0$ .
- v)  $a(v + w) = av + aw$  kaikilla  $a \in \mathbb{R}, v, w \in V$ .
- vi)  $(a + b)v = av + bv$  kaikilla  $a, b \in \mathbb{R}, v \in V$ .
- vii)  $a(bv) = (ab)v$  kaikilla  $a, b \in \mathbb{R}, v \in V$ .
- viii)  $1_v = v$  kaikilla  $v \in V$ .

Tässä avaruuden  $V$  alkioita kutsutaan vektoreiksi ja avaruuden  $\mathbb{R}$  alkioita skalaareiksi.

### **Määritelmä 2.2.** *Vektorialiavaruus*

Osajoukko  $W \subset V$  on vektoriavaruuden  $V$  (vektori)aliavaruus, jos

- i)  $v + w \in W$  kaikilla  $v, w \in W$ ,
- ii)  $av \in W$  kaikilla  $a \in \mathbb{R}, v \in W$  ja
- iii)  $0_v \in W$

**Määritelmä 2.3.** *Rajoitettu funktio*

Olkoon  $D$  avaruus ja  $F(D, \mathbb{R})$  kaikkien avaruudessa  $D$  määriteltyjen reaaliarvoisten funktioiden  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  joukko. Joukko  $F(D, \mathbb{R})$  on vektoriavaruus [2]. Funktio  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  on rajoitettu, jos on olemassa sellainen  $M \in \mathbb{R}, M \geq 0$ , jolla  $|f(x)| \leq M$  kaikilla  $x \in D$ .

Rajoitettujen funktioiden avaruus  $Raj(D, \mathbb{R})$  koostuu kaikista rajoitetuista funktioista  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Lemma 2.4.** *Rajoitettujen funktioiden avaruus  $Raj(D, \mathbb{R})$  on reaaliarvoisten funktioiden vektoriavaruuden  $F(D, \mathbb{R})$  aliavaruus.*

*Todistus.* Olkoon  $f, g \in Raj(D, \mathbb{R}), M, N \in \mathbb{R}, M, N \geq 0$  niin, että  $|f(x)| \leq M$  ja  $|g(x)| \leq N$  kaikilla  $x \in D$ . Tällöin seuraavat kohdat pätevät:

- i)  $|f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq M + N \leq \infty$ , siis  $f + g \in Raj(D, \mathbb{R})$  kaikilla  $f, g \in Raj(D, \mathbb{R})$ ,
- ii)  $|af(x)| = |a| \cdot |f(x)| \leq |a| \cdot M \leq \infty$ , siis  $af \in Raj(D, \mathbb{R})$  kaikilla  $a \in \mathbb{R}, f \in Raj(D, \mathbb{R})$  ja
- iii)  $0_{F(D, \mathbb{R})}(x) = 0$  kaikilla  $x \in D$ , jolloin  $0_{F(D, \mathbb{R})} \in Raj(D, \mathbb{R})$ .

□

**Määritelmä 2.5.** *Normi*

Olkoon  $E$  vektoriavaruus ja  $|\cdot|: E \rightarrow \mathbb{R}_+, x \mapsto |x|$  kuvaus joukossa  $E$ . Kuvaus  $|\cdot|$  on normi avaruudessa  $E$ , jos seuraavat ominaisuudet pätevät kaikilla  $x, y \in E, a \in \mathbb{R}$ .

- (N1)  $|x + y| \leq |x| + |y|$ ,
- (N2)  $|ax| = |a||x|$ ,
- (N3) Jos  $|x| = 0$ , niin  $x = \bar{0}$ .

Vektoriavaruutta, jossa on annettu jokin normi, sanotaan normiavaruudeksi.

**Esimerkki 2.6.** Määritellään joukossa  $\mathbb{R}^n$  tavallinen euklidinen normi  $|x| = \sqrt{x_1^2 + \cdots + x_n^2}$ .

**Määritelmä 2.7.** *Sup-normi*

Olkoon  $D$  epätyhjä joukko ja  $Raj(D, \mathbb{R})$  kaikkien avaruudessa  $D$  määriteltyjen rajoitettujen funktioiden  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  vektoriavaruus. Yhtälö  $\|f\| = \sup\{|f(x)|: x \in D\}$  määrittelee normin avaruudessa  $Raj(D, \mathbb{R})$ . Tätä normia sanotaan avaruuden  $Raj(D, \mathbb{R})$  sup-normiksi.

*Todistus.* (N1) Olkoon  $f, g \in Raj(D, \mathbb{R})$  ja  $x \in D$ . Tällöin

$$|f + g|(x) = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\| + \|g\|$$

kaikilla  $x \in D$ , joten  $\|f + g\| = \sup\{|f(x) + g(x)|\} \leq \|f\| + \|g\|$ .

(N2) Olkoon  $f \in Raj(D, \mathbb{R})$  ja  $x \in D$ . Tällöin

$$|af|(x) = |af(x)| = |a||f(x)| \leq |a|\|f\|$$

kaikilla  $x \in D$ , joten  $\|af\| \leq |a|\|f\|$ . Jos  $a = 0$ , niin (N2) pätee muodossa  $0 = 0$ . Jos  $a \neq 0$ , niin  $f = a^{-1}af$  ja edellisen mukaan  $\|f\| \leq |a^{-1}|\|af\|$  ja edelleen  $\|af\| \geq |a|\|f\|$  kaikilla  $x \in D$ . Tällöin siis  $\|af\| = |a|\|f\|$ .

(N3) Jos  $\|f\| = 0$ , niin  $|f(x)| = 0$  kaikilla  $x \in D$ , eli  $f = \bar{0}$ .

□

**Esimerkki 2.8.** Tapauksessa  $D = \mathbb{N}$  saadaan kaikkien rajoitettujen jonojen joukko  $raj(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ . Joukon alkioita ovat rajoitetut jonot  $x = (x_1, x_2, \dots)$ . Tälle joukolle käytetään usein merkintää  $l_\infty$ .

# Luku 3

## Metriten avaruus

Tässä luvussa esitellään metrinen avaruuksien ominaisuuksia. Metrisiä avaruuksia käsitellään syvemmin kirjassa Topologia I

**Määritelmä 3.1.** *Metriten avaruus* on pari  $(X, d)$ , jossa  $X$  on joukko ja  $d$  on *metriikka* joukossa  $X$ . Tällöin  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$  on kuvaus, jolle pätee seuraavat ominaisuudet kaikilla  $x, y, z \in X$ :

$$(M1) \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

$$(M2) \quad d(x, y) = d(y, x)$$

$$(M3) \quad d(x, y) = 0, \text{ jos ja vain jos } x = y.$$

**Esimerkki 3.2.** Euklidinen metriikka avaruuden  $\mathbb{R}^n$  kahden pisteen  $p = (p_1, p_2, \dots, p_n)$  ja  $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)$  välillä on määritelty

$$d(p, q) = \sqrt{(p_1 - q_1)^2 + (p_2 - q_2)^2 + \dots + (p_n - q_n)^2}.$$

**Esimerkki 3.3.** Normiavaruus on aina metriten avaruus.

*Todistus.* Olkoon  $E$  normiavaruus ja  $x, y \in E$ . Metriikaksi voidaan valita  $d(x, y) = |x - y|$ , jolloin kaikilla  $x, y \in E$  pätee

$$(M1) \quad d(x, z) = |x - z| = |x - y + y - z| = |(x - y) + (y - z)| \leq |x - y| + |y - z| = d(x, y) + d(y, z)$$

$$(M2) \quad d(x, y) = |x - y| = |y - x| = d(y, x)$$

$$(M3) \quad d(x, y) = |x - y| = 0, \text{ jos ja vain jos } x = y.$$

□

**Määritelmä 3.4.** *Joukkojen välinen etäisyys*

Olkoon  $(X, d)$  metrinen avaruus ja  $A, B \subset X$ . Tällöin etäisyys osajoukkojen  $A$  ja  $B$  välillä on määritelty  $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A, b \in B\}$ , eli etäisyyksien  $d(a, b)$  suurin alaraja, kun  $a \in A$  ja  $b \in B$ .

Tällöin pätee  $d(A, B) \geq 0$  ja jos  $A = \emptyset$  tai  $B = \emptyset$ , niin  $d(A, B) = 0$ .

**Lause 3.5.** *Olkoon  $(X, d)$  metrinen avaruus,  $x, y \in X$  ja  $A \subset X$  epätyhjä. Tällöin  $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ . Erityisesti  $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$  kaikilla  $z \in X$ .*

*Todistus.* Olkoon  $a \in A$ . Tällöin kaikilla  $y \in A$  pätee  $d(x, A) \leq d(x, a) \leq d(x, y) + d(y, a)$ . Ottamalla infimum kaikkien  $a \in A$  yli saadaan  $d(x, A) \leq d(x, y) + d(y, A)$  ja edelleen  $d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$ . Vastaavasti olkoon  $y \in A$ , jolloin kaikilla  $x \in X$  pätee  $d(y, A) - d(x, A) \leq d(y, x) = d(x, y)$ . Nyt  $d(x, A) - d(y, A) \leq d(x, y)$  ja  $d(y, A) - d(x, A) \leq d(x, y)$ , jolloin siis  $|d(x, A) - d(y, A)| \leq d(x, y)$ . □

**Määritelmä 3.6.** *Homeomorfismi* tarkoittaa kuvausta  $f: X \rightarrow Y$ , jolla

(H1)  $f$  on bijektio,

(H2)  $f$  on jatkuva,

(H3)  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  on jatkuva.

**Määritelmä 3.7.** *Upotus* tarkoittaa kuvausta  $f: X \rightarrow Y$ , joka määrittelee homeomorfismin  $f_1: X \rightarrow fX$ , jolla  $f_1(x) = f(x)$  kaikilla  $x \in X$ .

**Määritelmä 3.8.** *Isometria* on etäisyydet säilyttävä kuvaus. Olkoon  $(X, d)$  ja  $(X', d')$  metrisiä avaruuksia. Tällöin kuvaus  $h: X \rightarrow X'$  on isometria, jos  $d(x_1, x_2) = d'(h(x_1), h(x_2))$  kaikilla  $x_1, x_2 \in X$ .

**Esimerkki 3.9.** Peilaus, rotaatio ja siirtokuvaus ovat geometriasta tuttuja isometrioita avaruudessa  $\mathbb{R}^2$ .

**Lemma 3.10.** *Bijektiivinen isometria on aina homeomorfismi.*

*Todistus.* Olkoon  $(X, d)$  ja  $(X', d')$  metrisiä avaruuksia ja olkoon kuvaus  $h: X \rightarrow X'$  isometria. Tällöin  $d(x_1, x_2) = d'(h(x_1), h(x_2))$  kaikilla  $x_1, x_2 \in X$ . Tällöin

(H1)  $h$  on määritelmän nojalla bijektio,

(H2) Kaikilla  $\epsilon > 0$  on olemassa  $\delta > 0$ , jolla pätee: Jos  $d(x_1, x_2) < \delta$ , niin  $d'(h(x_1), h(x_2)) = d(x_1, x_2) < \delta < \epsilon$ . Siis  $h$  on jatkuva.



(H3) Edellisen kohdan ja isometrisuuden nojalla myös  $f^{-1}: Y \rightarrow X$  on jatkuva.

□

**Lemma 3.11.** *Olkoon  $(X, d)$  metrinen avaruus. Tällöin*

$$d': X \times X \rightarrow \mathbb{R}, \quad d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in X$$

*on metriikka joukossa  $X$  ja joukon  $X$  pisteiden  $d'$ -etäisyydet toisistaan ovat korkeintaan 1.*

*Todistus.* Olkoon  $(X, d)$  metrinen avaruus. Kaikilla  $x, y, z \in X$  pätee

$$\begin{aligned} \text{(M1)} \quad d'(x, z) &= \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} \leq \frac{d(x, y) + d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} \\ &= \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} \\ &\leq \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} = d'(x, y) + d'(y, z), \end{aligned}$$

$$\text{(M2)} \quad d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = d'(y, x) \text{ ja}$$

$$\text{(M3)} \quad d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = 0, \text{ jos ja vain jos } d(x, y) = 0, \text{ eli jos ja vain jos } x = y.$$

Joukon  $X$  pisteiden  $d'$ -etäisyydet toisistaan ovat korkeintaan 1, sillä  $d(x, y) \leq 1 + d(x, y)$  kaikilla  $x, y \in X$ . □

# Luku 4

## Konvekssi verho

Tässä luvussa esitellään konveksius, konvekssi verho ja tämän ominaisuuksia. Näitä käsitteitä tarkastellaan syvemmin kirjoissa Topologia I ja Topologia II.

**Määritelmä 4.1.** *Konveksius.* Olkoon  $E$  normiavaruus,  $A \subset E$  ja  $a, b \in A$ . Yhtälö

$$\alpha(t) = a + t(b - a) = (1 - t)a + tb$$

määrittelee janapolun  $\alpha: [0, 1] \rightarrow E$ . Kuvajoukko  $\alpha[0, 1] = [a, b]$  on jana, jonka päätepisteet ovat  $\alpha(0) = a \in A$  ja  $\alpha(1) = b \in A$ . Joukko  $A \subset E$  on konvekssi, jos ja vain jos  $[a, b] \subset A$  kaikilla  $a, b \in A$ .

**Esimerkki 4.2.** Avaruuden  $\mathbb{R}^n$  suljettu yksikkökuula  $\bar{B}(0, 1) = \{x \in \mathbb{R}^n: |x| \leq 1\}$  on konvekssi.

**Määritelmä 4.3.** *Konvekssi verho.* Olkoon  $E$  normiavaruus,  $A \subset E$  ja  $(A_j)_{j \in J} \subset \mathcal{P}(E)$  kaikkien sellaisten konveksien osajoukkojen  $A_k \subset E$ ,  $k \in J$  muodostama perhe, joilla  $A \subset A_k$ . Tällöin joukko  $C(A) = \bigcap_{j \in J} A_j$  on joukon  $A$  konvekssi verho.

**Lemma 4.4.** *Konvekssi verho  $C(A)$  on konvekssi.*

*Todistus.* Olkoon  $a, b \in C(A) = \bigcap_{j \in J} A_j$ . Tällöin  $a, b \in A_i$  kaikilla  $i \in J$ . Jokainen  $A_i$  on konvekssi, joten kaikilla  $i \in J$  pätee  $[a, b] \subset A_i$ . Tällöin kaikilla  $a, b \in C(A)$  pätee  $[a, b] \subset C(A)$ , joten konvekssi verho  $C(A)$  on konvekssi.  $\square$

**Korollari 4.5.** *Konvekssi verho  $C(A)$  on pienin konvekssi joukko, joka sisältää joukon  $A$ .*

*Todistus.* Olkoon  $B$  sellainen konvekssi joukko, jolla  $A \subset B \subset C(A)$ . Joukko  $B$  on konvekssi ja  $A \subset B$ , joten  $B \in (A_j)_{j \in J}$ . Tällöin

$$C(A) = \bigcap_{j \in J} A_j \subset B.$$

Siis  $B = C(A)$  ja  $C(A)$  on pienin konvekssi joukko, jolla  $A \subset C(A)$ .  $\square$

**Lemma 4.6.** Olkoon  $E$  normiavaruus ja  $A \subset E$ . Konvekksi verho  $C(A)$  on muotoa

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i x_i, \quad \text{missä } x_i \in A, \lambda_i \geq 0 \text{ ja } \sum_{i=0}^n \lambda_i = 1$$

olevien lineaarikombinaatioiden muodostama joukko.

*Todistus.* Konvekksi verho  $C(A)$  on konvekksi ja  $A \subset C(A)$ , joten kaikilla  $a, b \in A$  pätee  $[a, b] \subset C(A)$ , toisin sanoen,  $(1-t)a + tb \in C(A)$  kaikilla  $0 \leq t \leq 1$ , erityisesti

$$(4.7) \quad c_0 a + c_1 b \in C(A), \text{ kun } c_0, c_1 \geq 0 \text{ ja } c_0 + c_1 = 1.$$

Olkoon  $x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1} \in A$ ,  $d_0, d_1, \dots, d_n, e, \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda_{n+1} \in \mathbb{R}$  ja  $d_i, e, \lambda_i \geq 0$  kaikilla  $i \in \mathbb{N}$ . Oletetaan, että jollain  $n \geq 1$  pätee

$$d_0 x_0 + d_1 x_1 + \dots + d_n x_n \in C(A), \text{ kun } d_0 + d_1 + \dots + d_n = 1.$$

Olkoon  $\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n + \lambda_{n+1} = 1$ . Tällöin

$$\begin{aligned} & \lambda_0 x_0 + \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1} x_{n+1} \\ &= e \left( \frac{\lambda_0}{e} x_0 + \frac{\lambda_1}{e} x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{e} x_n \right) + \lambda_{n+1} x_{n+1} \in C(A) \end{aligned}$$

Olkoon  $\lambda_0 + \lambda_1 + \dots + \lambda_n + \lambda_{n+1} = 1$ . Tällöin

$$\begin{aligned} & \lambda_0 x_0 + \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1} x_{n+1} \\ &= (1 - \lambda_{n+1}) \left( \frac{\lambda_0}{1 - \lambda_{n+1}} x_0 + \frac{\lambda_1}{1 - \lambda_{n+1}} x_1 + \dots + \frac{\lambda_n}{1 - \lambda_{n+1}} x_n \right) + \lambda_{n+1} x_{n+1} \in C(A) \end{aligned}$$

Tällöin konvekksiuden ja kaavan 4.7 nojalla pätee

$$\begin{aligned} & e(d_0 x_0 + d_1 x_1 + \dots + d_n x_n) + \lambda_{n+1} x_{n+1} \\ &= e d_0 x_0 + e d_1 x_1 + \dots + e d_n x_n + \lambda_{n+1} x_{n+1} \in C(A), \end{aligned}$$

kun  $e + \lambda_{n+1} = 1$ . Valitsemalla  $e d_i = \lambda_i$  kaikilla  $i \in 0, 1, \dots, n$  saadaan

$$\lambda_0 x_0 + \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n + \lambda_{n+1} x_{n+1} \in C(A).$$

Siis  $C(A)$  sisältää kaikki muotoa

$$\lambda_0 x_0 + \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n, \quad \text{missä } x_i \in A, \lambda_i \geq 0, \text{ ja } \sum_{i=0}^n \lambda_i = 1$$

olevat lineaarikombinaatiot. Osoitetaan seuraavaksi, että  $C(A)$  sisältää ainoastaan kyseisiä lineaarikombinaatiota.

□

# Luku 5

## Banachin avaruus

**Määritelmä 5.1.** Kompakti joukko

**Määritelmä 5.2.** *Cauchyn jono* Jono  $(x_n: n \in \mathbb{N})$

**Määritelmä 5.3.** Banachin avaruus on täydellinen normiavaruus.

**Määritelmä 5.4.** *Separoituva avaruus.* Olkoon  $X$  metrinen avaruus ja  $\mathcal{B} \subset \mathcal{P}(X)$  epätyhjien avointen osajoukkojen perhe. Tällöin avaruus  $X$  on separoituva, jos seuraava ehto pätee: On olemassa numeroituva tiheä osajoukko  $\{a_0, a_1, \dots\} = A \subset X$ , toisin sanoen, jokaista  $B \in \mathcal{B}$  kohti löytyy ainakin yksi  $a_i \in A$ , jolla  $a_i \in B$  jollain  $i \in \mathbb{N}$ .

**Määritelmä 5.5.** *Homotopia*

Kaksi kuvausta ovat homotooppisia keskenään, jos ne voidaan muuntaa jatkuvalla kuvauksella toisikseen. Olkoon  $f, g: X \rightarrow Y$ . Sanomme kuvauksen  $f$  olevan homotooppinen kuvauksen  $g$  kanssa, jos on olemassa jatkuva  $h: X \times I \rightarrow Y$ , jolla  $h(x, 0) = f(x)$  ja  $h(x, 1) = g(x)$  kaikilla  $x \in X$ . Merkitsemme tällöin  $f \simeq g$  ja  $h: f \simeq g$ . Kuvaus  $h$  on homotopia, joka yhdistää kuvaukset  $f$  ja  $g$ .

# Luku 6

## Kuratowskin upotuslause

**Lause 6.1.** *Jokaista metristä avaruutta  $(X, d)$  kohti on olemassa normiavaruus  $Z$  ja upotus  $h: X \rightarrow Z$  missä  $hX \subset Z$  on suljettu konveksissa verhossa  $C(hX)$ .*

*Todistus.* Olkoon  $(X, d)$  metrinen avaruus. Tällöin

$$d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}, \quad x, y \in X$$

on lemmän 3.11 mukaan metriikka joukossa  $X$  ja joukon  $X$  pisteiden  $d'$ -etäisyydet toisistaan ovat korkeintaan 1.

Olkoon  $Z = \text{Raj}(X, \mathbb{R})$  joukon  $X$  kaikkien rajoitettujen reaaliarvoisten funktioiden vektoriavaruus. Tällöin avaruudella  $Z$  on määritelmän 2.7 mukaan muotoa

$$\|f_1\| = \sup_{x \in X} |f_1(x)|, \quad f_1 \in Z$$

oleva sup-normi.

Seuraavaksi määritellään homeomorfismi  $h: X \rightarrow hX \subset Z$ . Tätä varten asetetaan funktio  $f_x \in Z$  jokaiselle  $x \in X$  yhtälön  $f_x(y) = d'(x, y)$  mukaisesti, eli

$$h(x) = f_x, \quad x \in X.$$

Tällöin pätee

$$\|f_{x_1} - f_{x_2}\| = \sup_{x \in X} |d'(x_1, x) - d'(x_2, x)| \geq |d'(x_1, x_2) - d'(x_2, x_2)| = d'(x_1, x_2).$$

Toisaalta mielivaltaiselle  $y \in X$  pätee

$$|f_{x_1}(y) - f_{x_2}(y)| = |d'(x_1, y) - d'(x_2, y)| \leq d'(x_1, x_2),$$

jolloin siis

$$\|f_{x_1} - f_{x_2}\| = \sup_{x \in X} |d'(x_1, x) - d'(x_2, x)| \leq d'(x_1, x_2).$$

Edeltävistä epäyhtälöistä saadaan  $\|f_{x_1} - f_{x_2}\| = d'(x_1, x_2)$ , jolloin kuvaus  $h: X \rightarrow hX$  on isometria. Funktio  $h$  on bijektio, sillä kaikilla  $x, x' \in X$ ,  $x \neq x'$  pätee

$$f_x(x) = d'(x, x) = 0 \neq d'(x', x) = f_{x'}(x)$$

ja edelleen

$$h(x) = f_x \neq f_{x'} = h(x').$$

Lemman 3.10 nojalla funktio  $h$  on homeomorfismi kuvajoukolle  $hX$ .

Seuraavaksi osoitetaan, että  $hX$  on suljettu konveksissa verhossa  $C(hX)$ . Tavoitteena on osoittaa, että avaruuden  $hX$  alkioista muodostuvan suppenevan jonon raja-arvo kuuluu avaruuteen  $hX$ . Olkoon  $f \in C(hX)$ ,  $f_{x_i} \in hX$  ja  $x_i \in X$  kaikilla  $i \in \mathbb{N}$ . Oletetaan, että

$$f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{x_n}.$$

Tällöin koska  $f$  kuuluu konvekseen verhoon  $C(hX)$ , niin lemmän 4.6 nojalla  $f$  on lineaarikombinaatio vektorialiavaruuden  $hX$  vektoreista. Tällöin olkoon  $a_0, a_1, \dots, a_k \in X$ ,  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$  ja  $\lambda_i \geq 0$ , kaikilla  $i \in \mathbb{N}$  niin, että

$$f = \sum_{i=0}^k \lambda_i f_{a_i}, \quad \text{missä} \quad \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1.$$

Nyt jollain  $i \leq k$  pätee  $\lambda_i \geq 1/(k+1)$ . Tämä seuraa siitä, että jos  $\lambda_i < 1/(k+1)$  kaikilla  $i \leq k$ , niin

$$\sum_{i=0}^k \lambda_i < \sum_{i=0}^k \frac{1}{k+1} = \frac{k+1}{k+1} = 1,$$

joka on ristiriidassa oletuksen  $\sum_{i=0}^k \lambda_i = 1$  kanssa. Voidaan siis valita sellaiset  $a_0, a_1, \dots, a_k$ ,  $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_k$ , että

$$\lambda_0 \geq \frac{1}{k+1} \text{ ja } f = \sum_{i=0}^k \lambda_i f_{a_i}, \quad \text{missä} \quad \sum_{i=0}^k \lambda_i = 1.$$

Tällöin

$$\|f - f_{x_n}\| \geq |f(x_n) - f_{x_n}(x_n)| = |f(x_n) - d'(x_n, x_n)| = |f(x_n)|$$

ja edelleen

$$|f(x_n)| = \sum_{i=0}^k \lambda_i f_{a_i}(x_n) \geq \lambda_0 f_{a_0}(x_n) \geq \frac{1}{k+1} d(a_0, x_n).$$

Tällöin yhtälöstä  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{x_n} = f$  seuraa, että  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a_0$ .  
Siis  $f = \lim_{n \rightarrow \infty} f_{x_n} = f_{a_0} \in hX$ , joten  $hX \subset C(hX)$  on suljettu.

□

# Kirjallisuutta

- [1] Karol Borsuk: Theory of retracts, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1967.
- [2] Jussi Väisälä: Topologia I, 4. korjattu painos, Limes ry, 2007.
- [3] Jussi Väisälä: Topologia II, 2. korjattu painos, Limes ry, 2005.
- [4] Juha Heinonen: Geometric embeddings of metric spaces, luentomoniste, Jyväskylän yliopisto, 2003