



[Cod: CM4F1A-CM4F1B]

[Curso: Análisis y Modelamiento Numérico I]

Práctica Calificada N° 1

1. Dada la integral $I_n = \int_0^1 x^n e^{x-1} dx$

- a) Es cierto que $I_n = 1 - nI_{n-1}$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$ (*)
- b) Usando I_0 valor calculado usando la integral. Halle $I_1, I_2, \dots, I_n, \dots$, $n \geq 15$, observe que sucede en algunos de sus resultados encontrados.
- c) Es el algoritmo de recurrencia (*) inestable o estable para el problema?
- d) Si $I_{n-1} = \frac{1-I_n}{n}$ y $I_{20} = 0$. (**)

Determine $I_{19}, I_{18}, \dots, I_1$.

Observe la coherencia e incoherencias de los resultados.


Es el algoritmo de recurrencia (**) inestable o estable para el problema?.

2. Suppose that $fl(y)$ is a k -digit rounding approximation to y . Show that

$$\left| \frac{y - fl(y)}{y} \right| \leq 0,5 \times 10^{-k+1}$$

[Hint: If $d_{k+1} < 5$, then $fl(y) = 0.d_1.d_2\dots d_k \times 10^n$. If $d_{k+1} \geq 5$, then $fl(y) = 0.d_1.d_2\dots d_k \times 10^n + 10^{n-k}$.]

3. La velocidad del flujo de salida de un fluido ideal por un orificio en el lado de un tanque está dada por $v = \sqrt{\frac{2P}{\rho}}$. Si los errores relativos máximo cometidos en la medición de v y P son del orden del 0,1 %, y 0,3 % respectivamente. Determine una cota máxima de error en la medición de ρ .
4. Un ingeniero civil desea construir un parque cuya forma es como se da en la figura (rectángulo coronado por una semicircunferencia). Si las medidas lineales a lo largo fueron realizadas con un error no superior al 0,20 % a lo ancho fue realizado con un error no superior al 0,15 %



- a) Determinar el error que se puede cometer al calcular el área del terreno.
- b) En qué rango se encuentra el valor exacto del área?.

5. Suppose that as x approaches zero,

$$F_1(x) = L_1 + O(x^\alpha) \text{ and } F_2(x) = L_2 + O(x^\beta).$$

Let c_1 and c_2 be nonzero constants, and define

$$F(x) = c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x) \text{ and } G(x) = F_1(c_1 x) + F_2(c_2 x).$$

Show that if $\gamma = \text{minimum } \{\alpha, \beta\}$, then as x approaches zero,

a) $F(x) = c_1 L_1 + c_2 L_2 + O(x^\gamma)$

b) $G(x) = L_1 + L_2 + O(x^\gamma)$

Los Profesores.

UNI, 17 de junio de 2020.