

2010 年度 大問 1

hari64boli64 (hari64boli64@gmail.com)

2025 年 4 月 23 日

1 問題

一意な行列の分解を求めよ 難問だと思う

2 解答

(1)

A は正定値対称行列なので、 $A = Q^T D Q$ と書ける。ただし、 Q は直交行列、 D は要素が全て正の対角行列である。

D はその平方根 \sqrt{D} が取れることに注意すると、

$$\begin{aligned}(Q^T \sqrt{D} Q)^2 &= (Q^T \sqrt{D} Q)(Q^T \sqrt{D} Q) \\ &= Q^T D Q \\ &= A\end{aligned}$$

となり、 $B = Q^T \sqrt{D} Q$ である。

一意性を示す。 $B^2 = C^2 = A$ とする。

$\|x\|_2 = 1$ を満たす全ての x に対して、 B, C の正定値性に注意すると、

$$\begin{aligned}x^T B x &= \sqrt{(x^T B x)^2} \\ &= \sqrt{x^T B^2 x} \\ &= \sqrt{x^T C^2 x} \\ &= \sqrt{(x^T C x)^2} \\ &= x^T C x\end{aligned}$$

しかし、 $\|x\|_2 = 1$ を満たす全ての x に対して、

$$x^\top (B - C)x = 0$$

であると、これは $B - C = O \Leftrightarrow B = C$ を意味する。

(ここの部分の証明は、対称性などを使えば決して難しい訳ではない。しかし、簡潔な証明はよく分からなかった)

よって、 B は一意である。

(2)

特異値分解より、 $F = R'\Sigma S$ と分解できる。ただし、 R', S は直交行列、 Σ は全ての要素が正の対角行列である。 F が正則な為、フルランクであり、 Σ の対角成分に 0 はない。

よって、 $F = R'(SS^\top)\Sigma S = (R'S)(S^\top\Sigma S)$ と書いて、 $R'S^\top$ は R' と S がそれぞれ直交行列な為、直交行列である。

以上より、 $R = R'S^\top, U = S^\top\Sigma S$ とすれば良い。

一意性については、 $F^\top F = U^\top R^\top R U = U^\top U = U^2 = W$ とすると、 W は正定値対称行列だが、(1) より、 U は一意と分かる。よって、 R も一意である。

全体で一意。

(3)

$$\begin{aligned} FR^\top &= RUR^\top \\ &= RQ'D'Q^\top R^\top \end{aligned}$$

より、 $V = FR^\top$ は正定値対称行列。よって、 $F = VR$ となる。一意性は自明。

3 知識

2020 年度問 1 をまず参照のこと。

(1) について

計数の人のブログらしきものがあった。[2]

(2)

直交行列と直交行列の積は直交行列であることは、簡単に示せる。

$$(RS)^\top (RS) = S^\top R^\top RS = I$$

特異値分解についてまとめる。

特異値分解の定義, 性質, 具体例 [3]

特異値分解とは、 $m \times n$ 行列 A を $A = U\Sigma V$ と分解することです。ただし、

- U は $m \times m$ の直交行列 (各列が互いに直交する行列)
- V は $n \times n$ の直交行列
- Σ は ... 非対角成分は 0、対角成分は非負で大きさの順に並んだ行列

です。任意の行列はこのような分解できます。また、 Σ の対角成分で 0 でないもの (0 を含むこともある) を特異値と言います。

なお、行列の (0 でない) 特異値の数は、その行列のランクと一致する。

以下に、参考文献の続きを載せると、

特異値分解の定義, 性質, 具体例 [3]

A が対称行列のとき、 A の固有値と特異値は一致します。対称行列は直交行列で対角化できるからです。

$A^T A$ の 0 でない固有値の正の平方根は A の特異値です。理由は、 $A = U\Sigma V$ と特異値分解できるとき $A^T A = V^T (\Sigma^T \Sigma) V$ と固有値分解できるからです。同様に AA^T の 0 でない固有値の正の平方根も A の特異値です。

となっている。

行列分解

本問を解く際に、特異値分解以外の分解に関しても考慮したが、知識が足りず苦労した。それを以下に簡単にまとめる。

QR 分解を用いて解くことも出来るのだろうか?

LU 分解

以下、参考文献 [4] より引用。

正方行列 A を下三角行列 L と上三角行列 U との積によって、 $A = LU$ と表すことを LU 分解 (lower-upper(LU) decomposition) という。

行列が LU 分解可能であるための必要十分条件は、全ての主座小行列の行列式が 0 でないことである。

QR 分解

以下、参考文献 [5] より引用。

QR 分解 (キューアールぶんかい、英: QR decomposition, QR factorization) とは、 $m \times n$ 実行列 A を、 m 次直交行列 Q と $m \times n$ 上三角行列 R との積への分解により表すこと、またはそう表した表現をいう。このような分解は常に存在する。

QR 分解は線型最小二乗問題を解くために使用される。また、固有値問題の数値解法の 1 つである QR 法の基礎となっている。

すべての実正方行列 A は直交行列 Q と上三角行列 (別名右三角行列) R を用いて $A = QR$ と分解できる。もし A が正則ならば、 R の対角成分が正になるような因数分解は一意に定まる。

QR 分解を計算する手法として、グラム・シュミット分解、ハウスホルダー変換、ギブンス回転などがある。

コレスキー分解

以下、参考文献 [6] より引用。

行列 A を下三角行列 C とその転置行列の C^T の積に分解すること、すなわち、 $A = CC^T$ と分解することを、コレスキー分解 (cholesky decomposition) という。

行列 A が正定値行列であるならば、コレスキー分解可能である。

参考文献

- [1] 高校数学の美しい物語.”同時対角化可能 \Leftrightarrow 交換可能の意味と証明”.2021 年 3 月 7 日.<https://manabitimes.jp/math/1196>
- [2] Lilliput Steps. “半正定値行列の平方根行列の存在と一意性”.HatenaBlog.2020 年 5 月 6 日.<https://kagamiz.hatenablog.com/entry/2020/05/16/212214>
- [3] 高校数学の美しい物語.”特異値分解の定義, 性質, 具体例”.2022 年 11 月 3 日.<https://manabitimes.jp/math/1280>
- [4] 理数アラカルト.”LU 分解を解説 ～具体例と必要十分条件～”.2022 年 4 月 17 日.<http://risalc.info/src/LU-decomposition.html>
- [5] Wikipedia.”QR 分解”.2022 年 11 月 20 日.<https://ja.wikipedia.org/wiki/QR%E5%88%86%E8%A7%A3>
- [6] 理数アラカルト.”コレスキー分解とは?”.2023 年 4 月 2 日.<http://risalc.info/src/cholesky-decomposition.html>