

2023 年度 大問 2

hari64boli64 (hari64boli64@gmail.com)

2023 年 8 月 20 日

1 問題

$$F_i(x) = x_i \left(v_i + \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \right) \\ \frac{dx_i(t)}{dt} = F_i(x(t))$$

2 解答

(1)

まず、 $F_i(x^*) = 0$ という条件より、また、 $x^* \in \mathcal{X}_n$ より、 $x_i^* \neq 0$ であることより、 $v_i = -\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^*$ である。

条件を整理していくと、

$$\begin{aligned} L(x') &= \left. \frac{dL(x(t))}{dt} \right|_{t=0} \\ &= \sum_{i=1}^n c_i \left(-\frac{x_i^*}{x_i'} + 1 \right) \left. \frac{dx_i}{dt} \right|_{t=0} \\ &= \sum_{i=1}^n c_i \left(-\frac{x_i^*}{x_i'} + 1 \right) F_i(x') \\ &= \sum_{i=1}^n c_i \left(-\frac{x_i^*}{x_i'} + 1 \right) x_i' \left(v_i + \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j' \right) \\ &= \sum_{i=1}^n c_i (-x_i^* + x_i') \left(v_i + \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j' \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\sum_{i=1}^n c_i x_i^* v_i - \sum_{i=1}^n c_i x_i^* \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j' \right) + \sum_{i=1}^n c_i x_i' v_i + \sum_{i=1}^n c_i x_i' \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j' \right) \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i x_i^* a_{ij} x_j^* - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i x_i^* a_{ij} x_j' - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i x_i' a_{ij} x_j^* + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_i x_i' a_{ij} x_j' \\
&= x^{*T} C A x^* - x^{*T} C A x' - x'^T C A x^* + x'^T C A x' \\
&= (x^* - x')^T C A (x^* - x')
\end{aligned}$$

となる。

よって、

$$\begin{aligned}
&(\forall x' \in \mathcal{X}_n \setminus \{x^*\}) L(x') < 0 \\
&\Leftrightarrow (\forall x' \in \mathcal{X}_n \setminus \{x^*\}) (x^* - x')^T C A (x^* - x') < 0 \\
&\Leftrightarrow (\forall x' \in \mathcal{X}_n \setminus \{x^*\}) ((x^* - x')^T C A (x^* - x') < 0) \wedge ((x^* - x')^T A^T C (x^* - x') < 0) \\
&\Leftrightarrow (\forall y \in \mathbb{R}^n) y^T (C A + A^T C) y < 0 \\
&\Leftrightarrow C A + A^T C \prec 0
\end{aligned}$$

となる。なお、 $x^* - x'$ から y への変換には注意が必要である。全ての $y \in \mathbb{R}^n$ に対して、 $x^* - x' = y$ を満たす $x' \in \mathcal{X}_n \setminus \{x^*\}$ が存在するとは限らない。ここでは長さに関する定数倍の変換が挟まっている。

(2)

まず、 $\nabla H_w(z) = (w_1 z_1, \dots, w_n z_n)^T$ である。

ここで、

$$\begin{aligned}
\frac{dz_i(t)}{dt} &= \frac{dx_i(t)}{dt} \\
&= F_i(x(t)) \\
&= x_i(t) \left(v_i + \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j(t) \right) \\
&= (x_i(t) - x_i^* + x_i^*) \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} (x_j(t) - x_j^*) \right) \\
&= (z_i(t) + x_i^*) \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} z_j(t) \right)
\end{aligned}$$

となるので、

$$\begin{aligned}
\frac{dz(t)}{dt} &= (Z + X^*) A z(t) \\
&= (Z + X^*) A W^{-1} W z(t)
\end{aligned}$$

$$= (Z + X^*)AW^{-1}\nabla H_w(z(t))$$

となる。

(3)

条件をより平易な表現で言い表すと、 $\lim_{z(t) \rightarrow 0}$ において、 $\frac{dH_w(z(t))}{dt} < 0$ を満たすような w を、 c を用いて表現せよ、ということになる。

このことを念頭に置いて式変形していくと、

$$\begin{aligned} \frac{dH_w(z(t))}{dt} &= \sum_{i=1}^n w_i z_i(t) \frac{dz_i(t)}{dt} \\ &= \nabla H_w(z(t))^T G(z(t)) \nabla H_w(z(t)) \\ &= \nabla H_w(z(t))^T ((Z + X^*)AW^{-1}) \nabla H_w(z(t)) \end{aligned}$$

となり、

$$\begin{aligned} \frac{dH_w(z(t))}{dt} &< 0 \\ \Leftrightarrow \nabla H_w(z(t))^T ((Z + X^*)AW^{-1}) \nabla H_w(z(t)) &< 0 \\ \Leftrightarrow \nabla H_w(z(t))^T ((Z + X^*)C^{-1}(CA + A^T C)W^{-1}) \nabla H_w(z(t)) &< 0 \end{aligned}$$

となる。なお、最後の変形で、 W, X^*, Z が対角行列であることを用いた。

以上より、 $(Z + X^*)C^{-1}(CA + A^T C)W^{-1}$ が $CA + A^T C$ に関する二次形式の形で記述出来る時、これはその負定値性より負になる。

これは、

$$\begin{aligned} W^{-1T} &= (Z + X^*)C^{-1} \\ \Leftrightarrow W &= (Z + X^*)^{-1}C \end{aligned}$$

を意味し、 $Z \rightarrow 0$ を考慮すると、 $W = X^*C$ を満たすような w であれば、題意を満たすことが分かる。