

2023 年度 大問 3

hari64boli64 (hari64boli64@gmail.com)

2023 年 10 月 24 日

1 問題

$$I(f) = \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) d\theta, \quad I_N(f) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^N f(e^{\frac{2\pi i k}{N}})$$

2 解答

(1)

$e^{i\theta} = z$ とおくと、 $\frac{dz}{d\theta} = ie^{i\theta} = iz$ であるので、

$$\begin{aligned} I(f) &= \int_0^{2\pi} f(e^{i\theta}) d\theta \\ &= \int_{\Gamma(1)} f(z) \frac{1}{iz} dz \\ &= \oint_{\Gamma(1)} \frac{-i}{z} f(z) dz \end{aligned}$$

(2)

極は、 $z^N - 1 = 0$ より、 $z = \zeta_N^k$ ($\forall k \in [1, N]$) となる。ただし、 $\zeta_N = e^{\frac{2\pi i}{N}}$ である。
よって、留数はロピタルの定理を用いると、

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}_{z=\zeta_N^k} g_N[f](z) &= \lim_{z \rightarrow \zeta_N^k} (z - \zeta_N^k) \frac{-iz^{N-1}}{z^N - 1} f(z) \\ &= \lim_{z \rightarrow \zeta_N^k} \frac{-iz^{N-1}}{Nz^{N-1}} f(z) \\ &= \frac{-i}{N} f(\zeta_N^k) \end{aligned}$$

となる。

(3)

(2) の結果と留数定理より、

$$\begin{aligned}\oint_{\Gamma(r')} g_N[f](z) dz &= \oint_{\Gamma(r')} \frac{-iz^{N-1}}{z^N - 1} f(z) dz \\ &= 2\pi i \sum_{k=1}^N \operatorname{Res}_{z=\zeta_N^k} g_N[f](z) \\ &= \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^N f(\zeta_N^k)\end{aligned}$$

となる。ただし、 $1 < r' < r$ とする。

なお、ここで r' を r としなかったのは、 $f(z)$ が $D_r = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < r\}$ でのみ定義されている関数であり、 $\Gamma(r)$ で未定義であるからである。

これを用いて、与式を評価すると、

$$\begin{aligned}|I(f) - I_N(f)| &= \left| \oint_{\Gamma(1)} \frac{-i}{z} f(z) dz - \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^N f(\zeta_N^k) \right| \\ &= \left| \oint_{\Gamma(r')} \frac{-i}{z} f(z) dz - \oint_{\Gamma(r')} g_N[f](z) dz \right| \\ &= \left| \oint_{\Gamma(r')} \left(\frac{-i}{z} - \frac{-iz^{N-1}}{z^N - 1} \right) f(z) dz \right| \\ &\leq \|f\| \oint_{\Gamma(r')} \left| \frac{-i}{z} - \frac{-iz^{N-1}}{z^N - 1} \right| dz \\ &= \|f\| \oint_{\Gamma(r')} \left| \frac{1}{z(z^N - 1)} \right| dz \\ &\leq \|f\| \frac{2\pi r'}{r'(r'^N - 1)} \\ &= \frac{2\pi \|f\|}{(r'^N - 1)}\end{aligned}$$

となる。

これが、任意の $1 < r' < r$ に対して成立するので、 $r' \nearrow r$ の極限をとると、

$$|I(f) - I_N(f)| \leq \frac{2\pi \|f\|}{r^N - 1}$$

となる。

(4)

まず、与式の上界が 2π であることは、(3) より明らか。

与式を下から評価して、それが 2π に収束することを示す。ここで、 $f(z) = z^N$ とすると、

$$I(f) = \int_0^{2\pi} e^{iN\theta} d\theta = \frac{1}{iN} [e^{iN\theta}]_0^{2\pi} = 0$$

$$I_N(f) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=1}^N e^{2\pi i k} = 2\pi$$

となる。

よって、

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \left(r^N \sup_f \frac{|I(f) - I_N(f)|}{\|f\|} \right) \geq |0 - 2\pi| = 2\pi$$

となる。

以上より、答えは 2π である。