# 2020年度大問4

hari64boli64 (hari64boli64@gmail.com)

2023年5月1日

## 1 問題

$$\frac{\partial}{\partial t}x(n,t) = x(n-1,t) + x(n+1,t) - 2x(n,t)$$
$$x(n+N,t) = x(n,t)$$
$$e(m,n) = \exp\left(i\frac{2\pi mn}{N}\right)$$

#### 2 解答

**(1)** 

$$\begin{split} &\frac{\partial}{\partial t}x(n,t) = x(n-1,t) + x(n+1,t) - 2x(n,t) \\ \Leftrightarrow & e(m,n)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_m(t) = e(m,n-1)f_m(t) + e(m,n+1)f_m(t) - 2e(m,n)f_m(t) \\ \Leftrightarrow & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}f_m(t) = \left(\exp\left(-i\frac{2\pi m}{N}\right) + \exp\left(i\frac{2\pi m}{N}\right) - 2\right)f_m(t) \\ \Leftrightarrow & f_m(t) = c_m e^{\left(\exp\left(-i\frac{2\pi m}{N}\right) + \exp\left(i\frac{2\pi m}{N}\right) - 2\right)t} \end{split}$$

そして、これはe(m, n + N) = e(m, n)より、条件(\*\*)を満たす。

(2)

(1) の形で書けるとまず仮定して、与えられた初期条件を適用すると、 $c_m = \frac{g_n}{e(m,n)}$  となる。 しかし、これでは  $c_m$  が n に依存してしまうので、条件に反してしまう。なので、 $c_m$  を n に依存しないように定めたい。

ここで、 $g_n = \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n)c_m'$  という形で書けることを利用する。 ただし、 $c_m' = \frac{1}{N}\sum_{n'=0}^{N-1} e(-m,n')g_{n'}$  である。これは離散フーリエ変換に相当する。 なお、このような形で書けることは、以下で確認することが出来る。

$$\begin{split} &\sum_{m=0}^{N-1} e(m,n)c_m' \\ &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n) \sum_{n'=0}^{N-1} e(-m,n')g_{n'} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n'=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n)e(-m,n')g_{n'} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n'=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n-n')g_{n'} \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n'=0}^{N-1} N\delta_{n,n'}g_{n'} \\ &= \frac{1}{N} Ng_n \\ &= g_n \end{split}$$

この事を利用すると、

$$x(n,t) = \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n) f_m(t) \quad (c_m = c'_m)$$

とすれば、

$$x(n,0) = \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n)c_m = g_n$$

となり、特に、(1) より、これは条件 (\*),(\*\*) を共に満たす。 よって、

$$x(n,t) = \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n) f_m(t)$$

$$= \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n) \left( \frac{1}{N} \sum_{n'=0}^{N-1} e(-m,n') g_{n'} \right) e^{\left(\exp\left(-i\frac{2\pi m}{N}\right) + \exp\left(i\frac{2\pi m}{N}\right) - 2\right)t}$$

が解となる。

(3)

$$\begin{split} \lim_{t \to \infty} x(n,t) &= \lim_{t \to \infty} \sum_{m=0}^{N-1} e(m,n) c_m e^{\left(\exp\left(-i\frac{2\pi m}{N}\right) + \exp\left(i\frac{2\pi m}{N}\right) - 2\right)t} \\ &= c_0 \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e(0,n) g_n \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} g_n \end{split}$$

## 3 知識

離散フーリエ変換

## 参考文献

- [1] 金沢大学."離散フーリエ変換の計算法".http://leo.ec.t.kanazawa-u.ac.jp/~nakayama/edu/file/signal\_proc\_ch4.pdf
- [2] Wikipedia."離散フーリエ変換".2022 年 12 月 28 日.https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B% A2%E6%95%A3%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%82%A8%E5%A4%89%E6%8F%9B