

# xPhO Summer Course 2025

Trưởng nhóm: *Carina*



# Mục lục

<b>Lời mở đầu</b>	<b>7</b>
<b>1 Mở Đầu Về Giải Tích</b>	<b>9</b>
1.1 Hàm Số	10
1.1.1 Đồ thị Hàm Số	10
1.1.2 Các hàm thông dụng	11
1.2 Giới Hạn Hàm Số	12
1.2.1 Ví dụ về Giới Hạn	12
1.2.2 Giới Hạn ở vô cùng và một số quy tắc tính Giới Hạn	14
1.3 Đạo Hàm	15
1.3.1 Khái niệm	15
1.3.2 Một số quy tắc đạo hàm	16
1.3.3 Xấp xỉ tuyến tính và vi phân	16
1.4 Ứng Dụng Của Đạo Hàm Và Vi Phân	17
1.5 Phương Trình Tham Số	17
1.6 Hướng Dẫn Học	19
1.7 Bài tập	19
1.8 Lời giải	24
<b>2 Vector &amp; Đại Số Tuyến Tính</b>	<b>25</b>
2.1 Vector	25
2.1.1 Giới thiệu	25
2.1.2 Các phép toán với Vector	25
2.1.3 Cơ sở Vector và Hệ Toạ Độ	25
2.1.4 Hàm Vector	25
2.2 Động Học	25
2.2.1 Toạ độ cong	25
2.2.2 Các thông số Động Học	25
2.3 Nhập môn Đại Số Tuyến Tính	25
2.3.1 Giới thiệu về ma trận	25
2.3.2 Phép biến đổi tuyến tính	25
2.3.3 Các phép toán trên ma trận	25
<b>3 Chuyển Động Của Chất Điểm Trong Mặt Phẳng</b>	<b>27</b>
3.1 Tích phân	27
3.1.1 Ý tưởng	27
3.1.2 Định lý cơ bản của giải tích	27
3.2 Phương trình vi phân (thường)	27
3.3 Chuyển động trong mặt phẳng	27
3.3.1 Bài toán ném xiên	27

3.3.2	Định lý cộng vận tốc giữa các hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến so với nhau . . . . .	27
3.3.3	Định lý cộng gia tốc giữa các hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến so với nhau . . . . .	27
3.3.4	Tiếp cận bài toán chuyển động . . . . .	27
<b>4</b>	<b>Cơ Động Lực Học Chất Điểm</b>	<b>29</b>
4.1	Ba Định Luật Newton . . . . .	29
4.1.1	Định luật thứ nhất . . . . .	29
4.1.2	Định luật thứ hai . . . . .	29
4.1.3	Định luật thứ ba . . . . .	29
4.1.4	Một số "loại" động lượng khác . . . . .	29
4.2	Nguyên lý tương đối Galileo . . . . .	29
4.2.1	Phép biến đổi Galileo . . . . .	29
4.2.2	Luận bàn . . . . .	29
4.3	Các lực cơ học . . . . .	29
4.4	Liên kết . . . . .	29
4.4.1	Các ràng buộc hình học . . . . .	29
4.4.2	Vai trò của các loại lực liên kết . . . . .	29
4.5	Phương pháp tiếp cận một bài toán động lực học . . . . .	29
<b>5</b>	<b>Dao Động</b>	<b>31</b>
<b>6</b>	<b>Phương Pháp Số Trong Mô Phỏng</b>	<b>33</b>
<b>7</b>	<b>Mở Đầu Về Giải Tích Vector &amp; Các Định Luật Bảo Toàn</b>	<b>35</b>
<b>8</b>	<b>Năng Lượng</b>	<b>37</b>
<b>9</b>	<b>Nhập Môn Cơ Học Giải Tích</b>	<b>39</b>
9.1	Liên kết động học . . . . .	39
9.1.1	Bậc tự do . . . . .	39
9.1.2	Liên kết Holonom và liên kết phi Holonom . . . . .	39
9.1.3	Lực bị động trong bài toán liên kết Holonom . . . . .	39
9.1.4	Ứng dụng đạo hàm toàn phần và ma trận Jacobian trong bài toán liên kết Holonom . . . . .	39
9.2	Cơ học Lagrange . . . . .	39
9.2.1	Nguyên lý tác dụng tối thiểu . . . . .	39
9.2.2	Phương trình Lagrange loại II . . . . .	39
9.2.3	Phương trình Lagrange loại I . . . . .	39
9.2.4	Động lượng suy rộng . . . . .	39
9.2.5	Định lý Noether . . . . .	39
9.2.6	Giải phương trình chuyển động bằng phương pháp Runge-Kutta 4 . . . . .	39
9.2.7	Tính toán lực bị động dựa trên phương trình Lagrange loại 2 . . . . .	39
9.3	Các lý thuyết cơ học giải tích khác . . . . .	39
9.3.1	Cơ học Hamilton . . . . .	39
9.3.2	Nguyên lý Gauss về liên kết tối thiểu . . . . .	39
9.3.3	Phương trình Appell cho cơ hệ phi Holonom . . . . .	39

<b>10 Bàn Về Giải Một Bài Toán Cơ Học</b>	<b>41</b>
10.1 Động lực học hệ 1 bậc tự do . . . . .	41
10.1.1 "Khối lượng hiệu dụng" trong hệ 1 bậc tự do . . . . .	41
10.1.2 Thành phần "gia tốc hướng tâm" đối với hệ tọa độ suy rộng . . . . .	41
10.2 Động lực học hệ đa bậc tự do và Robotic . . . . .	41
10.2.1 Ma trận quán tính . . . . .	41
10.2.2 Phương trình tổng quát trong điều khiển hệ đa vật và ma trận Christoffel . . . . .	41
10.3 Điều khiển Robot công nghiệp . . . . .	41
10.3.1 Mô phỏng và giải hệ phương trình vi phân trong Robotic . . . . .	41
10.3.2 Điều khiển Robot bằng thuật toán PID bù trọng trường . . . . .	41
10.4 Động học Robotic . . . . .	41
10.4.1 Động học thuận và bảng Denavit-Hartenberg . . . . .	41
10.4.2 Động học nghịch Robotic . . . . .	41
10.4.3 Thay thế ma trận Christoffel bằng ma trận hướng tâm/Coriolis . . . . .	41
<b>11 Đo Lường &amp; Xử Lý Số Liệu</b>	<b>43</b>
11.1 Phân tích thứ nguyên và dự đoán quy luật vật lý . . . . .	43
11.2 Bài toán hồi quy và hồi quy tuyến tính . . . . .	43
11.2.1 Bài toán hồi quy trong học máy . . . . .	43
11.2.2 Hồi quy hàm đơn biến, hàm mất mát và hệ số tương quan . . . . .	43
11.2.3 Hồi quy hàm đa biến . . . . .	43
11.2.4 Hồi quy đa thức . . . . .	43
11.3 Tối ưu hàm mất mát . . . . .	43
11.3.1 Thuật toán Gradient descent . . . . .	43
11.3.2 Các thuật toán tối ưu khác: Newton, Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt . . . . .	43
11.4 Học sâu và mạng Neural . . . . .	43
11.4.1 Bài toán phân loại trong học máy . . . . .	43
11.4.2 Mô hình mạng Neural . . . . .	43
11.4.3 Thuật toán lan truyền ngược . . . . .	43
<b>12 Tổng Kết</b>	<b>45</b>
<b>A Python Cơ Bản</b>	<b>47</b>
<b>B Phân Tích Thứ Nguyên</b>	<b>49</b>



# Lời mở đầu

Đây là phần mở đầu.





# Tuần 1

## Mở Đầu Về Giải Tích


- Rơi tự do là sự thay đổi vị trí theo thời gian, đường cong là một hình thay đổi hướng. Đây là hai loại thay đổi chính thúc đẩy sự phát triển của giải tích, một môn toán học xoay quanh hai phép toán là đạo hàm và tích phân.
- Sự ra đời và phát triển của nó xoay quanh hình học và vật lý với muôn vàn vấn đề thú vị mà có thể nói tóm gọn: *Giải tích là toán học của sự thay đổi.*
- Các nhà toán học cổ đại (chủ yếu làm việc với hình học) đã luôn đau đầu vì hai bài toán: *tìm tiếp tuyến của một đường cong bất kỳ*, và *tính diện tích dưới một đường cong*. Archimedes đã có một số kết quả nổi bật với phương pháp vét cạn. Nhưng phải cho tới thế kỷ XVII, với đại số của Viète, hình học giải tích của Descartes và Fermat cùng với mối quan tâm dâng cao về chuyển động của các thiên thể mới thúc đẩy mạnh mẽ việc khai thác mảnh đất hoang này với đỉnh cao là các công trình của Newton và Leibniz.
- Như vậy, một cách tự nhiên để tiếp cận giải tích là thông qua hình học giải tích, tức là hình học với các tọa độ, phương trình thay vì các lập luận logic thuần túy như trong hình học Euclid cổ điển. Cụ thể hơn, các đối tượng hình học như điểm, đường thẳng, đường cong,... sẽ được mô tả bởi các hàm số cùng phương trình qua đó ta có thể thực hiện các phép toán đại số.
- Khái niệm về giới hạn (hàm số) đã sớm nảy nở từ thời cổ đại thông qua bài toán nghịch lý Achilles và con rùa của Zeno đã quá nổi tiếng.
- Trong khi đó, ý tưởng căn bản của phép toán đạo hàm và vi phân là khảo sát sự thay đổi thông qua phân nhỏ một đại lượng hữu hạn (độ dài, thời gian,...) ra thành vô số khoảng nhỏ. Chia một thành hai phần, chia hai phần thành bốn phần và tiếp diễn như vậy vô hạn lần: các khoảng thu được là rất rất nhỏ, không bằng 0 nhưng nhỏ hơn bất cứ số thực dương nào.
- Điều này lại có liên hệ gì với khái niệm giới hạn?

Trong tuần 1, chúng tôi sẽ trình bày nội dung về hàm số và giới hạn của hàm số, đạo hàm và vi phân cùng ứng dụng của chúng.

## 1.1 Hàm Số

**Định nghĩa 1.1.1.** Hàm  $f$  là một quy tắc cho tương ứng mỗi phần tử  $x$  thuộc tập hợp  $X$  với một và chỉ một phần tử, kí hiệu  $f(x)$ , thuộc tập hợp  $Y$ .

- $X$  được gọi là tập hợp (miền) xác định của hàm  $f$ .
- $Y$  được gọi là tập hợp giá trị của hàm  $f$ .
- Nếu  $X$  và  $Y$  là tập các số thực, khi đó hàm được gọi là hàm số.




### 1.1.1 Đồ thị Hàm Số

Hàm số có thể được biểu diễn bằng công thức, bảng, đồ thị hoặc mô tả bằng lời nói. Trong đó trực quan nhất là biểu diễn thông qua đồ thị.

**Định nghĩa 1.1.2.** Đồ thị của hàm số  $f$  có miền xác định  $X$  là tập hợp các cặp có thứ tự

$$\{(x, f(x)) \mid x \in X\}.$$

Nói cách khác, đồ thị của  $f$  bao gồm mọi điểm  $(x, y)$  sao cho  $y = f(x)$  với  $x \in X$



Hình 1.1: Ví dụ về đồ thị hàm số

Các điểm này có thể là vô số, tạo thành những đường cong hoặc đường thẳng trên mặt phẳng, liên tục hoặc rời rạc. Song không phải mọi đường bất kỳ đều là đồ thị của một hàm số nào đó. Để là đồ thị của một hàm số, mỗi hoành độ  $x$  phải tương ứng với một tung độ  $y$  duy nhất. Nghĩa là không được có hai điểm khác nhau trên đồ thị có cùng hoành độ nhưng khác tung độ. Một cách trực quan, *không có đường thẳng thẳng đứng (vuông góc với trục hoành) nào cắt đồ thị của một hàm số nhiều hơn một lần.* (xem 1.1)



Hình 1.2: So sánh

### 1.1.2 Các hàm thông dụng

Trong khi xử lý các bài toán, chúng ta thường gặp các hàm số có dạng tổng quát. Các hàm này được phân loại theo dạng biểu thức của chúng. Dưới đây là một số loại hàm số cơ bản:

- Hàm *tuyến tính* có dạng  $f(x) = ax + b$ , với  $a$  và  $b$  là các hằng số. Đồ thị của hàm tuyến tính là một đường thẳng.  
Ví dụ:  $2x + 3$ .
- Hàm *đa thức* có dạng  $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ , với  $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$  là các hằng số và  $n \in \mathbb{N}$  là bậc của đa thức.  
Ví dụ:  $x^2 - 4x + 4$ ;  $x^5 + 2x^2 - 5x + 1$ ;  $3x + 2$ .
- Hàm *lũy thừa* có dạng  $f(x) = x^\alpha$ , với  $\alpha \in \mathbb{R}$  là một hằng số.  
Ví dụ:  $x^2, x^{-3} = \frac{3}{x}, x^{5/2} = \sqrt{x^5} = (\sqrt{x})^5$ .
- Hàm *tỷ lệ* có dạng  $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ , với  $P(x)$  và  $Q(x)$  là các đa thức. Ví dụ:  $\frac{x^2+1}{x-2}$ .

Trên đây được gọi chung là các hàm *đại số*, tức là các hàm có thể được biểu diễn bằng các toán tử đại số như cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa.

Ví dụ :  $\frac{(x^5+x^3-x^2+4)^{3/2}}{x+\sqrt{x}}$ .

Ta cũng liệt kê thêm một số hàm không thuộc loại trên.

Ví dụ như các hàm *siêu việt*:

- Hàm *lượng giác* là các hàm  $\sin x, \cos x, \tan x, \dots$  mà có thể được định nghĩa thông qua các điểm trên một đường tròn đơn vị.

- Hàm mũ và lôgarit lần lượt có dạng  $f(x) = a^x$  và  $f(x) = \log_a x$ , với  $a > 0$  là một hằng số. Cái sau là hàm nghịch đảo của cái trước, tức là  $\log_a a^x = x$  và  $a^{\log_a x} = x$ . Ví dụ:  $2^x$  và  $\log_2 x$ ;  $e^x$  và  $\ln x$ .

Hay, hàm xác định từng phần là các hàm được xác định bởi các công thức khác nhau trên các miền khác nhau của tập xác định.

Ví dụ, hàm giá trị tuyệt đối  $f(x) = |x|$  được định nghĩa là:

$$f(x) =$$

Trong tất cả những hàm vừa liệt kê lại có một số hàm có tính chất chung. Chẳng hạn như tính chẵn lẻ, tính đồng biến nghịch biến, tính liên tục,...

Trước khi sang phần tiếp theo, hãy nói qua thêm một khái niệm nữa, đó là *hàm hợp*. Ta biết rằng hàm số là một thứ mà ta cho vào một giá trị và sẽ cho ra một giá trị nào đó. Trên cơ sở này, hàm hợp là một hàm số mà đầu vào của nó là đầu ra của một hàm số khác.


Xét hai hàm  $f(x)$  và  $g(x)$ , hàm hợp của chúng được ký hiệu là  $f(g(x))$  và được đọc là "hàm  $f$  của hàm  $g$  tại  $x$ ". Hàm hợp này sẽ nhận đầu vào là giá trị của hàm  $g(x)$  và trả về giá trị của hàm  $f$  tại điểm đó.

Ví dụ:  $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = \sin x$  vậy  $f(g(x)) = f(\sin x) = \sin^2 x$ .

## 1.2 Giới Hạn Hàm Số

### 1.2.1 Ví dụ về Giới Hạn

Xét hàm số  $y = x^2$ , phóng to đồ thị vào gần điểm  $(1; 1)$ :



Hình 1.3: Đồ thị  $y = x^2$  được phóng to trong khoảng  $[0.9; 1.1]$

Hãy tưởng tượng có hai con bọ xuất phát từ hai điểm xanh và bò lại gần điểm màu đỏ trên con đường tạo thành từ đoạn đồ thị này. Để tiến tới đó, con bọ thứ nhất, xuất phát từ bên trái, phải đi qua các điểm nằm trong khoảng  $[0.9; 0.999]$ . Trong khi đó, con bọ thứ hai, xuất phát từ bên phải, phải trải qua các điểm nằm trong khoảng  $[1.001; 1.1]$ .

Ta thấy chúng quả thực đang tiến tới gần điểm  $(1; 1)$  bởi không chỉ hoành độ mà tung độ của chúng cũng dần tiến đến giá trị bằng 1 (như được kiểm chứng trong bảng bên dưới).

Bảng 1.1: Bảng giá trị  $y = x^2$  khi  $x$  tới gần 1

Bên trái		Bên phải	
$x$	$y$	$x$	$y$
0.900	0.8100	1.100	1.2100
0.925	0.8556	1.075	1.1556
0.950	0.9025	1.050	1.1025
0.975	0.9506	1.025	1.0506
0.990	0.9801	1.010	1.0201
0.995	0.9900	1.005	1.0100
0.999	0.9980	1.001	1.0020

Sau khi cả hai lần lượt tới điểm  $(0.999; 0.9980)$  và  $(1.001; 1.0020)$ , chúng tiếp tục di chuyển và để quan sát quá trình tiếp theo, ta tiếp tục phóng to khoảng đồ thị nằm giữa chúng:

Hình 1.4: Khoảng  $[0.999; 1.001]$  với hai vị trí ban đầu mới được đánh dấu

Như vậy sự phóng to này có thể tiếp tục vô hạn lần nữa trong khi khoảng cách giữa hai con bọ và điểm màu đỏ càng nhỏ dần. Dù vậy, ta biết rằng trong thực tế rồi chúng sẽ đến được điểm màu đỏ.<sup>1</sup>

Nhưng nếu giả sử tại hai điểm nào đó rất rất gần  $(1; 1)$ , đường bị gãy (và phía dưới chúng là vực sâu), hai chú bọ không thể tiến lên được nữa. Rồi vấn đề tiếp tục xảy đến rằng chỉ cần vị trí của các điểm này *luôn gần điểm  $(1; 1)$  hơn chúng*, hai chú bọ đáng thương sẽ phải tiếp tục di chuyển với một quá trình "phóng to vô hạn" như vậy mãi mãi.

**Định nghĩa 1.2.1.** Giả sử  $f(x)$  xác định trong một khoảng (miền) giá trị nào đó của  $x$  có chứa  $a$  (có thể xác định hoặc không xác định tại  $a$ ). Khi đó ta viết

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

và nói "giới hạn của  $f(x)$ , khi  $x$  tiến tới  $a$ , bằng  $L$ " nếu chúng ta có thể lấy các giá trị  $f(x)$  gần  $L$  một cách tùy ý bằng cách lấy các giá trị của  $x$  đủ gần  $a$  (từ bất cứ phía nào), nhưng không được bằng  $a$ .

Định nghĩa vừa đưa ra về giới hạn có vẻ khá trừu tượng và thiếu chặt chẽ. Dẫu thế trong khuôn khổ chương trình, ta sẽ không đào sâu vào vấn đề chặt chẽ trong lý luận giới hạn. Thay vào đó, hy vọng với ví dụ vừa rồi, các bạn có thể phần nào thu được trực giác về khái niệm này.

<sup>1</sup>Đoạn đường mà chúng trải qua sẽ nhỏ dần. Quãng đường chúng phải đi sẽ là một tổng có vô số hạng tử với các hạng tử phía sau ngày càng nhỏ mà may thay, tổng này có giá trị hữu hạn.

### 1.2.2 Giới Hạn ở vô cùng và một số quy tắc tính Giới Hạn

**Định nghĩa 1.2.2.** Ta viết

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

để nói rằng giới hạn của  $f(x)$  khi  $x$  tiến tới  $a$  từ phía bên trái (tức là  $x$  nhỏ hơn  $a$ ) bằng  $L$ .

Tương tự, với  $x > a$ , ta viết

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

**Định lý 1.**

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L.$$

Nghĩa là nếu giới hạn trái và phải khi  $x \rightarrow a$  cùng bằng nhau thì giới hạn của hàm số tại điểm đó là tồn tại. Ta cũng thừa nhận nếu hàm số tồn tại giới hạn tại điểm nào đó, giới hạn đó là duy nhất. Như đã thể hiện thông qua ví dụ ở trên.

**Định nghĩa 1.2.3.** Ta viết

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

nếu  $f(x)$  có thể nhận các giá trị lớn tùy ý khi cho  $x$  nhận các giá trị đủ gần  $a$ , nhưng không được bằng  $a$ .

Điều này dễ hiểu nếu xét hàm  $1/x$  với  $a = 0$  : lấy 1 chia 100, rồi lấy 1 chia 10, chia 0.1, 0.01, ... kết quả thu được sẽ ngày càng lớn. Nếu lấy 1 chia  $1/10^6$ , sẽ có được  $10^6$ . Và cứ thế. Chú ý rằng vô hạn không phải một con số. Nó, ở đây, là một giới hạn.

Ta cũng có thể có điều ngược lại:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

để diễn tả khi  $x$  nhận các giá trị lớn tùy ý (tiến tới vô cùng) thì  $f(x)$  tiến tới gần giá trị xác định  $L$  một cách tùy ý. Trong trường hợp hàm số là  $1/x$ , ý của ta là tương đương với cho  $x$  nhận một giá trị nào đó đủ lớn ( $10^2, 10^3, 10^4, 10^n \dots$ ) sao cho có thể coi  $1/x = 10^{-n} \approx 0$ .

Cũng có thể viết

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty.$$

để nói rằng  $f(x)$  có thể nhận các giá trị lớn tùy ý khi  $x$  đủ lớn.

Để kết thúc phần này, ta thừa nhận và tổng kết những tính chất sau: Giả sử  $c$  là một hằng số,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  và  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$

- $\lim_{x \rightarrow a} c = c.$
- $\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = cA.$
- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B.$
- $\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^{m/n} = A^{m/n}.$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = AB.$
- Nếu  $f(x) = g(x)$  khi  $x \neq a$ , thì  $A = B.$
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x)/g(x) = A/B, B \neq 0.$

**Định lý 2.** Xét các hàm số  $g(x), f(x), h(x)$  xác định trên miền chứa  $a$  (có thể có hoặc không xác định tại  $a$ ), với mọi  $x$  khác  $a$ :

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

,và giả sử

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L.$$

Thì,

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

## 1.3 Đạo Hàm


### 1.3.1 Khái niệm

**Định nghĩa 1.3.1.** *Đạo hàm* của hàm số  $f$  tại giá trị  $a$ , kí hiệu bởi  $f'(a)$ , là

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \quad (1.1)$$


nếu giới hạn này tồn tại.

Ý nghĩa hình học trực quan của đạo hàm là nó thể hiện độ dốc của đồ thị và tốc độ biến thiên của hàm số. Ta xét độ dốc của các đường cát tuyến đi qua A:<sup>2</sup>



Hình 1.5: Độ dốc của các đường cát tuyến đi qua A (các góc  $\theta_M, \theta_N, \theta_P$ )

Nếu các điểm  $M, N, P$  tiến gần đến điểm  $A$ , độ dốc của các đường cát tuyến này sẽ tiến gần đến một giá trị nhất định, chính là độ dốc của tiếp tuyến. Độ dốc này chính là đạo hàm của hàm số tại điểm  $A$ :



Hình 1.6: Liên hệ giữa đạo hàm và độ dốc (độ lớn góc  $\theta$ ) của đồ thị

Cũng từ hình vẽ trên, ta có thể thấy đạo hàm chính là hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị. Vì thế, ta có thể biểu diễn phương trình của đường tiếp tuyến tại  $x = a$ :

$$y = f(a) + f'(a)(x - a) \quad (1.2)$$

<sup>2</sup>Ở đây góc  $\theta_M$  và  $\theta_N$  có giá trị âm.

Một ví dụ Vật Lý có thể kể đến là chuyển động của một vật. Nếu ta xét hàm số  $s(t)$  là quãng đường vật đi được theo thời gian  $t$ , thì đạo hàm của nó tại thời điểm  $t$  chính là vận tốc của vật tại thời điểm đó, kí hiệu là  $v(t) = s'(t)$ .

### 1.3.2 Một số quy tắc đạo hàm

Dưới đây là đạo hàm của một số hàm thông dụng:

- Đạo hàm của hàm đa thức:

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1} \quad (1.3)$$

- Đạo hàm của các hàm lượng giác:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(\sin x) &= \cos x & \frac{d}{dx}(\tan x) &= \sec^2 x \\ \frac{d}{dx}(\cos x) &= -\sin x & \frac{d}{dx}(\cot x) &= -\csc^2 x \end{aligned}$$

- Đạo hàm của hàm mũ và hàm logarit:

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x, \quad \frac{d}{dx}\ln x = \frac{1}{x} \quad (1.4)$$

Tương tự như giới hạn, đạo hàm cũng có một số tính chất quan trọng:

- *Tính chất tuyến tính*: Nếu  $f(x)$  và  $g(x)$  là hai hàm số theo  $x$ , và  $c$  là một hằng số, thì

$$(cf + g)' = cf' + g' \quad (1.5)$$

- *Quy tắc nhân*: Nếu  $f(x)$  và  $g(x)$  là hai hàm số theo  $x$ , thì


$$(fg)' = fg' + f'g \quad (1.6)$$

- *Quy tắc chia*: Nếu  $f(x)$  và  $g(x)$  là hai hàm số theo  $x$ , với  $g(x) \neq 0$ , thì

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (1.7)$$

### 1.3.3 Xấp xỉ tuyến tính và vi phân

Tiếp theo ta sẽ nói về một ứng dụng quan trọng khác của đạo hàm. Nếu phóng to đồ thị tại điểm  $x = a$ , ta có thể thấy đồ thị hàm số trông khá giống với tiếp tuyến của nó tại điểm này.



Hình 1.7: Phóng to đồ thị hàm số tại điểm  $x = a$



Từ quan sát trên, ta có thể nghĩ tới một phép xấp xỉ.

**Định nghĩa 1.3.2.** Ở lân cận điểm  $x = a$ , ta có thể xấp xỉ hàm số  $f(x)$  bằng phương trình đường tiếp tuyến tại điểm này:

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a) \quad (1.8)$$


đây được gọi là **xấp xỉ tuyến tính**.

Ý tưởng đằng sau phép xấp xỉ tuyến tính đôi khi được phát biểu bằng **phép lấy vi phân**.

**Định nghĩa 1.3.3.** Nếu  $y = f(x)$ , **vi phân**  $dx$  là một biến độc lập. Lúc đó **vi phân**  $dy$  được xác định theo  $dx$  bởi phương trình:

$$dy = f'(x)dx \quad (1.9)$$

và **phép lấy vi phân** trên có ý nghĩa hình học như hình vẽ:



Hình 1.8: Ý nghĩa hình học của phép lấy vi phân


## 1.4 Ứng Dụng Của Đạo Hàm Và Vi Phân

### 1.5 Phương Trình Tham Số

**Định nghĩa 1.5.1.** Giả sử hai tọa độ  $x, y$  trên mặt phẳng tọa độ lần lượt là các hàm của một biến thứ ba,  $t$  (gọi là tham số) được biểu diễn qua các phương trình:

$$x = f(t), \quad y = g(t),$$


gọi là các phương trình tham số. Mỗi một giá trị của  $t$  xác định một điểm  $(x; y)$ . Khi tham số thay đổi, điểm  $(x; y)$  thay đổi và vẽ ra một đường cong trên mặt phẳng tọa độ gọi là đường cong tham số.




Hình 1.9: Đường cong tham số

Về tổng quát, đường cong với phương trình tham số  $x = f(t)$ ,  $y = g(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  có điểm đầu  $(f(a), g(a))$  và điểm cuối  $(f(b), g(b))$ .

Sau đây là một số ví dụ cụ thể:




(a) Đường tròn đơn vị  
 $x = \cos t$ ,  $y = \sin t$   
 $0 \leq t \leq 2\pi$




(b) Parabol nằm ngang  
 $x = t^2 - 1$ ,  $y = t$   
 $-1 \leq t \leq 1$

Hình 1.10



Hình 1.11: Đường Cardioid

$$x = 2 \cos t - \cos 2t, \quad y = 2 \sin t - \sin 2t$$



Hình 1.12: Đường Cycloid

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t \quad (0 \leq t \leq 4\pi)$$

Thông thường khi tiếp cận một bài toán chuyển động, tham số thường xuất hiện một cách tự nhiên qua các đại lượng vật lý mà diễn hình là thời gian.

Xem xét một điểm chuyển động trên mặt phẳng tọa độ, hai tọa độ sẽ có dạng  $x = x(t)$  và  $y = y(t)$ . Đây được gọi là các phương trình chuyển động, nếu biết chúng và điều kiện ban đầu sẽ có thể biết được các thông số động học của nó ở mọi thời điểm. Các thông số động học được đề cập ở đây là *vị trí, vận tốc*,... , trong đó ta định nghĩa:

- Vị trí của điểm  $t = \tau$  được xác định bởi cặp số  $(x(\tau), y(\tau))$ .
- Vận tốc của điểm tại thời điểm  $t = \tau$  được xác định bởi cặp số  $(x'(\tau), y'(\tau))$ .

## 1.6 Hướng Dẫn Học

## 1.7 Bài tập

### Hàm số

**Bài 1.1:** Tìm miền xác định của các hàm số sau

- $\frac{x-2}{2x-1}$
- $\frac{\ln(1+x)}{x-1}$
- $\sqrt{1-2x} + 3 \arcsin\left(\frac{3x-1}{2}\right) \quad (\sin x = y \leftrightarrow x = \arcsin y)$
- $\frac{1}{xe^x}$
- $\ln(3x+1) + 2 \ln(x+1)$

**Bài 1.2:** Tìm tập hợp giá trị của các hàm số sau

- $x^2 - 6x + 5$
- $2 = 3 \sin x$
- $|x| + x + 1 = y + |y|$
- $4^{-x^2}$

**Bài 1.3:** Chứng minh

- $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta.$
- $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha.$

Gợi ý: Định lý Ptoleme

## Vẽ đồ thị của hàm

**Chú ý:** Ta có thể vẽ đồ thị của hàm có dạng  $y = Af(k(x - a)) + b$  theo đồ thị của hàm  $f(x)$

- $y = f(x - a)$ : đồ thị ban đầu được tịnh tiến theo trục  $Ox$  một đại lượng  $a$ .
- $y = f(x) + b$ : đồ thị ban đầu được tịnh tiến theo trục  $Oy$  một đại lượng  $b$ .
- $y = Af(x)$ : đồ thị xuất phát được giãn ra  $A$  lần theo trục  $Oy$ .
- $y = f(kx)$ : đồ thị xuất phát được giãn ra  $1/k$  lần theo trục  $Ox$ .

**Bài 1.4:** Vẽ đồ thị các hàm số trong hai bài tập ở trên bằng

a. Desmos

b. Python (đối với hàm tuần hoàn thì vẽ trong khoảng  $[-\pi; \pi]$ ; đối với các hàm khác, lựa chọn điểm đầu và cuối sao cho thu được mọi miền của hàm)

**Bài 1.5:** Vẽ một hình tam/tứ/ngũ/lục giác đều bằng Desmos và Python.

**Bài 1.6:** Giải các phương trình sau thông qua việc vẽ đồ thị bằng Python

- $\tan x = x$ .
- $\ln x = x - 2$ .
- $x^3 - 15x = 4$ .
- $x^5 - 4x^2 + 3 = 0$ .

## Hàm hợp

**Bài 1.7:** Các hàm số trong phần là hàm hợp của những hàm nào? Hãy phân tích cụ thể thứ tự của chúng.

**Bài 1.8:** Nguyên lý quy nạp

Cho  $S_n$  là một phát biểu về số nguyên dương  $n$ . Giả sử rằng:

- $S_1$  đúng.
- $S_{k+1}$  đúng khi  $S_k$  đúng.

Khi đó  $S_n$  đúng với tất cả các số nguyên dương  $n$ .

Sử dụng điều này để giải các bài toán sau:

- Nếu  $f_0(x) = x/(x + 1)$  và  $f_{n+1}(x) = f_0(f_n(x))$  với  $n = 0, 1, 2, \dots$ , tìm một công thức cho  $f_n(x)$ .
- Nếu  $f_0(x) = x^2$  và  $f_{n+1}(x) = f_0(f_n(x))$  với  $n = 0, 1, 2, \dots$ , tìm một công thức cho  $f_n(x)$ .

## Phương trình hàm

**Bài 1.9:** Tìm hàm  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sao cho

- $f(a + b) = f(a) + f(b)$
- $f(ab) = f(a)f(b)$
- $f(a + b) = f(a)f(b)$
- $f(ab) = f(a) + f(b)$

**Giới hạn hàm số****Bài 1.10:** Chứng minh

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e = 2,71828....$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^m - 1}{x} = m.$$

**Bài 1.11:** Tính các giới hạn sau

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{5x+2}{2x+3}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x+5}{2x+7}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 + 2x^2 + 3x + 4}{4x^3 + 3x^2 + 2x + 1}$$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^4 - 2}{\sqrt{x^8 + 3x + 4}}$$

(e)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + 8x + 3} - \sqrt{x^2 + 4x + 3}$$

(f)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x}$$

(g)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 + x^2 - x - 1}$$

(h)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{1+x+x^2} - \sqrt{7+2x-x^2}}{x^2 - 2x}$$

**Bài 1.12:** Sử dụng các kết quả trong **Bài 1.10** tính

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin mx}{x}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{x^2}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 3x + 7} \right)^x$$

(d)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left( \frac{x}{2} \right)^{\frac{1}{x-2}}$$

### So sánh các vô cùng bé

Giả sử  $\alpha(x)$  và  $\beta(x)$  là các vô cùng bé khi  $x \rightarrow a$ . Hay,  $\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0$  và  $\lim_{x \rightarrow a} \beta(x) = 0$ .

- Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = 0$ , thì ta nói rằng  $\alpha$  là vô cùng bé bậc cao so với  $\beta$ , kí hiệu  $\alpha = o(\beta)$ .
- Nếu  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = m (m \neq 0)$ , thì ta nói  $\alpha$  và  $\beta$  là các vô cùng bé cùng bậc. Đặc biệt nếu  $m = 1$ , ta gọi chúng là các vô cùng bé tương đương, kí hiệu  $\alpha \sim \beta$ .
- Nếu  $\alpha^k$  và  $\beta$  là các vô cùng bé cùng bậc, trong đó  $k > 0$ , ta nói rằng vô cùng bé  $\beta$  có bậc  $k$  so với  $\alpha$ .

Ta chú ý một số tính chất của các đại lượng vô cùng bé:

- Tích hai vô cùng bé là vô cùng bé cấp cao so với các nhân thức.
- Các vô cùng bé là tương đương khi và chỉ khi hiệu của chúng là vô cùng bé cấp cao so với chúng.
- Nếu tỷ số của hai vô cùng bé có giới hạn, thì giới hạn này không đổi nếu ta thay mỗi vô cùng bé bằng một vô cùng bé tương đương.

Lưu ý sự tương đương của các đại lượng vô cùng bé sau đây: nếu  $x \rightarrow 0$  thì

$$\sin x \sim x, \tan x \sim x, \arcsin x \sim x, \arctan x \sim x, \ln(1+x) \sim x$$

**Bài 1.13:** Bằng cách thay tử và mẫu số bằng các vô cùng bé tương đương, tính

(a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - 1}{\tan 3x}$$

(b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\ln(1+x^2)}$$

(c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{3/5} - 1}{(1+x)(1+x)^{2/3} - 1}$$

## Đạo hàm

**Bài 1.14:** Tính  $y'(x)$

(a)

$$y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}).$$

(b)

$$y = \ln(\sqrt{2 \sin x + 1} + \sqrt{2 \sin x - 1}).$$

(c)

$$y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + k} + \frac{k}{2} \ln(x + \sqrt{x^2 + k}).$$

(d)

$$y = \ln^2 \frac{\sqrt{4 \tan x + 1} - 2\sqrt{\tan x}}{\sqrt{4 \tan x + 1} + 2\sqrt{\tan x}}.$$

(e)

$$y = \frac{1}{2}[(x + \alpha)\sqrt{x^2 + 2\alpha x + \beta} + (\beta - \alpha^2) \ln(x + \alpha + \sqrt{x^2 + 2\alpha x + \beta})].$$

(f)

$$y = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}.$$

## Phương pháp đạo hàm lấy lô-ga(tạm dịch)<sup>3</sup>

**Bài 1.15:** Tính

(a)

$$\frac{(2x - 1)^3 \sqrt{3x + 2}}{(5x + 4)^2 \sqrt[3]{1 - x}}.$$

(b)

$$y = x^{x^2}.$$

Hàm logarit nói chung và hàm  $\ln$  nói riêng đặc biệt có nhiều công dụng trong tính toán. Ta hãy liệt kê ra hai tính chất sẽ được bàn đến sau đây:

- $\ln(xy) = \ln x + \ln y$ .
- $\ln x^\alpha = \alpha \ln x$ .

Tính chất đầu tiên là khả năng biến một tích thành một tổng, một thứ dễ tính hơn rất nhiều. Tính chất thứ hai lại có khả năng biến một hàm mũ phức tạp thành một tích rõ ràng hơn về sự phụ thuộc vào biến.

Xét hàm  $y(x)$  có thể được viết thành tích của nhiều hàm số:

$$y = f_1^{\alpha_1}(x) \cdot f_2^{\alpha_2}(x) \cdots f_n^{\alpha_n}(x) \implies \ln y = \alpha_1 \ln f_1 + \alpha_2 \ln f_2 + \cdots + \alpha_n \ln f_n.$$

Đạo hàm hai vế,

$$\frac{y'}{y} = \alpha_1 \frac{f_1'}{f_1} + \alpha_2 \frac{f_2'}{f_2} + \cdots + \alpha_n \frac{f_n'}{f_n}.$$

Hãy quay lại xử lý **Bài 1.15** với công cụ này.

**Bài 1.16:** Tính

---

<sup>3</sup>Đọc thêm tại [Logarithmic differentiation](#)

(a)

$$y = x^{\ln x}.$$

(b)

$$y = \frac{x^2 \sqrt{1+x}}{(x-1)^3 \sqrt[5]{5x-1}}.$$

## 1.8 Lời giải



## Tuần 2

# Vector & Đại Số Tuyến Tính

## 2.1 Vector

### 2.1.1 Giới thiệu

### 2.1.2 Các phép toán với Vector

### 2.1.3 Cơ sở Vector và Hệ Toạ Độ

### 2.1.4 Hàm Vector

## 2.2 Động Học

### 2.2.1 Toạ độ cong

### 2.2.2 Các thông số Động Học

## 2.3 Nhập môn Đại Số Tuyến Tính

### 2.3.1 Giới thiệu về ma trận

### 2.3.2 Phép biến đổi tuyến tính

### 2.3.3 Các phép toán trên ma trận



## Tuần 3

# Chuyển Động Của Chất Điểm Trong Mặt Phẳng

### 3.1 Tích phân

#### 3.1.1 Ý tưởng

#### 3.1.2 Định lý cơ bản của giải tích

### 3.2 Phương trình vi phân (thường)

### 3.3 Chuyển động trong mặt phẳng

#### 3.3.1 Bài toán ném xiên

#### 3.3.2 Định lý cộng vận tốc giữa các hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến so với nhau

#### 3.3.3 Định lý cộng gia tốc giữa các hệ quy chiếu chuyển động tịnh tiến so với nhau

#### 3.3.4 Tiếp cận bài toán chuyển động



## Tuần 4

# Cơ Động Lực Học Chất Điểm

### 4.1 Ba Định Luật Newton

#### 4.1.1 Định luật thứ nhất

#### 4.1.2 Định luật thứ hai

#### 4.1.3 Định luật thứ ba

#### 4.1.4 Một số "loại" động lượng khác

### 4.2 Nguyên lý tương đối Galileo

#### 4.2.1 Phép biến đổi Galileo

#### 4.2.2 Luận bàn

### 4.3 Các lực cơ học

### 4.4 Liên kết

#### 4.4.1 Các ràng buộc hình học

#### 4.4.2 Vai trò của các loại lực liên kết

### 4.5 Phương pháp tiếp cận một bài toán động lực học



Tuần 5

# Dao Động





Tuần 6

# Phương Pháp Số Trong Mô Phỏng



Tuần 7

# Mở Đầu Về Giải Tích Vector & Các Định Luật Bảo Toàn



Tuần 8

# Năng Lượng



## Tuần 9

# Nhập Môn Cơ Học Giải Tích

### 9.1 Liên kết động học

#### 9.1.1 Bậc tự do

#### 9.1.2 Liên kết Holonom và liên kết phi Holonom

#### 9.1.3 Lực bị động trong bài toán liên kết Holonom

#### 9.1.4 Ứng dụng đạo hàm toàn phần và ma trận Jacobian trong bài toán liên kết Holonom

### 9.2 Cơ học Lagrange

#### 9.2.1 Nguyên lý tác dụng tối thiểu

#### 9.2.2 Phương trình Lagrange loại II

#### 9.2.3 Phương trình Lagrange loại I

#### 9.2.4 Động lượng suy rộng

#### 9.2.5 Định lý Noether

#### 9.2.6 Giải phương trình chuyển động bằng phương pháp Runge-Kutta 4

#### 9.2.7 Tính toán lực bị động dựa trên phương trình Lagrange loại 2

### 9.3 Các lý thuyết cơ học giải tích khác

#### 9.3.1 Cơ học Hamilton

#### 9.3.2 Nguyên lý Gauss về liên kết tối thiểu

#### 9.3.3 Phương trình Appell cho cơ hệ phi Holonom





## Tuần 10

# Bàn Về Giải Một Bài Toán Cơ Học

### 10.1 Động lực học hệ 1 bậc tự do

#### 10.1.1 "Khối lượng hiệu dụng" trong hệ 1 bậc tự do

#### 10.1.2 Thành phần "gia tốc hướng tâm" đối với hệ tọa độ suy rộng

### 10.2 Động lực học hệ đa bậc tự do và Robotic

#### 10.2.1 Ma trận quán tính

#### 10.2.2 Phương trình tổng quát trong điều khiển hệ đa vật và ma trận Christoffel

### 10.3 Điều khiển Robot công nghiệp

#### 10.3.1 Mô phỏng và giải hệ phương trình vi phân trong Robotic

#### 10.3.2 Điều khiển Robot bằng thuật toán PID bù trọng trường

### 10.4 Động học Robotic

#### 10.4.1 Động học thuận và bảng Denavit-Hartenberg

#### 10.4.2 Động học nghịch Robotic

#### 10.4.3 Thay thế ma trận Christoffel bằng ma trận hướng tâm/Coriolis



## Tuần 11

# Đo Lường & Xử Lý Số Liệu

- 11.1 Phân tích thứ nguyên và dự đoán quy luật vật vật lý
- 11.2 Bài toán hồi quy và hồi quy tuyến tính
  - 11.2.1 Bài toán hồi quy trong học máy
  - 11.2.2 Hồi quy hàm đơn biến, hàm mất mát và hệ số tương quan
  - 11.2.3 Hồi quy hàm đa biến
  - 11.2.4 Hồi quy đa thức
- 11.3 Tối ưu hàm mất mát
  - 11.3.1 Thuật toán Gradient descent
  - 11.3.2 Các thuật toán tối ưu khác: Newton, Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt
- 11.4 Học sâu và mạng Neural
  - 11.4.1 Bài toán phân loại trong học máy
  - 11.4.2 Mô hình mạng Neural
  - 11.4.3 Thuật toán lan truyền ngược



Tuần 12

# Tổng Kết



# A

## Python Cơ Bản

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

### Giới thiệu

Python là một ngôn ngữ lập trình phổ biến, được tạo ra bởi Guido van Rossum. Với tính đơn giản và dễ đọc, đây là ngôn ngữ thích hợp để nhập môn lập trình. Để bắt đầu, ta có thể tải trực tiếp Python từ trang chủ: [Python Download](#) . Sau khi cài đặt, ta có thể sử dụng Python thông qua các IDE như PyCharm, Visual Studio Code hoặc đơn giản là sử dụng terminal. Chi tiết, hãy tra mạng.

Các bạn có thể dễ dàng tự học Python thông qua các tài nguyên có sẵn trực tuyến như các khoá học trên Youtube hay qua các trang web, chẳng hạn như, [W3School](#) . Các bạn cũng có thể tham khảo các khoá học trên Udemy, Coursera, edX,... hay đọc sâu thêm trên SciPy.





# B

## Phân Tích Thứ Nguyên

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.