

Niklas von Hirschfeld

WISSEN - MATHE

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Stochastik	1
1.1 Begriffe	1
1.2 Bernoulli-Experiment	2
1.3 Binominalkoeffizient	3

Stochastik

1.1 Begriffe

Begriff	Definition
Zufallsexperiment:	Ein Vorgang, welcher unter den selben Bedingungen beliebig oft wiederholt werden kann, wobei dessen Ausgang nicht vorhersehbar ist. Beispiel: Würfel, Münzwurf.
Ergebnis:	Ein möglicher Ausgang eines Zufallsexperiment. Beispiel: Alle Zahlen zwischen Eins und Sechs (1; 2; 3; 4; 5; 6) beim würfeln eines 6-seitigen Würfel.
Ereignis:	Eine <i>Teilmenge</i> der Ereignismenge.
Wahrscheinlichkeit (P):	Eine Maß, wie wahrscheinlich das Eintreten eines Ereignisses ist. Angegeben mit einer Zahl von Null bis Eins ($[0; 1]$)
Faires Spiel:	Ein Spiel, bei dem der Erwartungswert für den Gewinn gleich Null ist: $\text{Gewinn} = \text{Auszahlung} - \text{Einsatz}$ Beispiel: Beim Würfeln soll das doppelte der Augenzahl in Euro ausgezahlt werden. Die Ergebnismenge beinhaltet die möglichen Auszahlungen: $\{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$ Somit entspricht der Erwartungswert: $\mu = \frac{1}{6} \cdot (2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12) = \frac{42}{6} = 7$ Somit muss der Einsatz 7 betragen, damit es sich um ein „Faires Spiel“ handelt
Laplace - Experiment:	Ein Versuch, bei dem alle Ereignisse gleich wahrscheinlich sind. Beispiel: Würfeln
Unabhängigkeit	Wenn das Eintreten des einen Ereignisses die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht beeinflusst.

Tabelle 1.1: Begriffe

Begriff	Definition												
Wahrscheinlichkeitsverteilung:	Wenn jedem Ereignis eines Zufallsexperiment ein Zahlenwert zugeordnet wird, spricht man von einer Zufallsgröße. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsgröße X, ist eine Tabelle, bei der jedem Wert von k von X die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ zugeordnet ist. <table><tr><td>k</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>$P(X = k)$</td><td>0,16</td><td>0,32</td><td>0,29</td><td>0,15</td><td>0,05</td></tr></table>	k	0	1	2	3	4	$P(X = k)$	0,16	0,32	0,29	0,15	0,05
k	0	1	2	3	4								
$P(X = k)$	0,16	0,32	0,29	0,15	0,05								
Varianz (V)	ist eine Maß für die Streuung einer Zufallsgröße. $V = (x_1 - \mu)^2 \cdot P(X = x_1) + \dots + (x_n - \mu)^2 \cdot P(X = x_n)$												

Tabelle 1.1: Begriffe

1.2 Bernoulli-Experiment

Bei einem Bernoulli-Experiment gibt es nur zwei Ereignisse¹. Zum Beispiel beim würfeln, ob ein 6 gewürfelt wird, oder nicht. Das Ereignis 6 gewürfelt wird in einem Baumdiagramm mit 1 dargestellt, das Gegenereignis mit 0.

Das Baumdiagramm in der **Abbildung 1.1** stellt den Würfelversuch mit drei Wiederholungen dar. Das Ergebnis "111" wird als "in allen drei Würfeln eine 6" gelesen.

Die Wahrscheinlichkeit eine 6 zu würfeln liegt bei:

$$p = \frac{1}{6}$$

Dadurch ergibt sich auch die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis:

$$1 - p = \frac{5}{6}$$

1. Wurf 2. Wurf 3. Wurf Ergebnis




Abbildung 1.1: Bernoulli-Experiment mit drei Wiederholungen

¹ Diese müssen nicht gleich wahrscheinlich sein.

Bernoulli-Experiment

Ein **Zufallsexperiment** heißt **Bernoulli-Experiment**, wenn es genau zwei Ergebnisse hat. Ein **Bernoulli-Kette** besteht aus mehreren voneinander unabhängigen Durchführungen eines Bernoulli-Experiment. Die Anzahl der Durchführungen nennt man **Länge** n der Bernoulli-Kette, die **Trefferwahrscheinlichkeit** wird mit p angegeben.

1.3 *Binominalkoeffizient*

Ab Seite: 273

Definitionen

Stochastik	1	Bernoulli-Experiment	2
-------------------------	----------	----------------------------	---

Bibliographie