

# Aufgabe 1: 2/3

$\Sigma = 11,5/16$

a, A, B, C seien Variable,  $\alpha = \{A \rightarrow 1, B \rightarrow 0, C \rightarrow 1, D \rightarrow 0\}$   
 $F = (A \rightarrow C \vee (\neg D \wedge B))$

$$\begin{aligned}\hat{\alpha}(F) &= \hat{\alpha}(A \rightarrow C \vee (\neg D \wedge B)) \\ &= \hat{\alpha}(A) \Rightarrow \hat{\alpha}(C \vee (\neg D \wedge B)) \\ &= \alpha(A) \Rightarrow (\hat{\alpha}(C) \mid \hat{\alpha}(\neg D \wedge B)) \\ &= \alpha(A) \Rightarrow (\alpha(C) \mid (\hat{\alpha}(\neg D) \& \hat{\alpha}(B))) \\ &= \alpha(A) \rightarrow (\alpha(C) \mid (!\hat{\alpha}(D) \& \alpha(B))) \\ &= 1 \rightarrow (1 \mid (!0 \& 0)) \\ &= 1\end{aligned}$$

b, Modelle  $\alpha$  für  $F = (B \leftrightarrow C) \leftrightarrow (A \wedge \neg C)$

$\alpha$  ist Modell von  $F$  ( $\alpha \models F$ ) wenn  $\alpha(F) = 1$

$$\begin{aligned}\hat{\alpha}(F) &= \hat{\alpha}((B \leftrightarrow C) \leftrightarrow (A \wedge \neg C)) \\ &= \hat{\alpha}(B \leftrightarrow C) = \hat{\alpha}(A \wedge \neg C) \\ &= (\hat{\alpha}(B) = \hat{\alpha}(C)) = (\hat{\alpha}(A) \& \hat{\alpha}(\neg C)) \\ &= (\hat{\alpha}(B) = \hat{\alpha}(C)) = (\hat{\alpha}(A) \& !\hat{\alpha}(C))\end{aligned}$$


einige  
Wahrheitstabelle.

$$\begin{aligned}\Rightarrow \hat{\alpha}(B) = \hat{\alpha}(C) = 1 \mid 0, \text{ fall} = 1: & \hat{\alpha}(A) \& !\hat{\alpha}(\neg C) = 1 \\ & \text{wenn } \hat{\alpha}(A) = 1 \& \hat{\alpha}(C) = 0 \\ \text{fall} = 0: & \hat{\alpha}(A) \& !\hat{\alpha}(\neg C) = 0 \\ & \hat{\alpha}(A) = 0 \& (\hat{\alpha}(C) = 0 \text{ oder } \hat{\alpha}(C) = 1) \\ & \hat{\alpha}(C) = 1 \& (\hat{\alpha}(A) = 0 \text{ oder } \hat{\alpha}(A) = 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \alpha_1 &= (1, 1, 1, 0) \\ \alpha_2 &= (0, 0, 0, 0) \\ \alpha_3 &= (0, 0, 0, 1) \\ \alpha_4 &= (0, 0, 1, 0) \\ \alpha_5 &= (0, 0, 1, 1)\end{aligned}$$

Nein - 1P

c,  $F = (\neg A \wedge C \rightarrow C) \rightarrow \neg A \rightarrow B \rightarrow C$



## Aufgabe 2: Der Operator $\oplus$ 2.5/3

Seien  $A, B, C$  Formel

a, Kommutativ  $A \oplus B \leftrightarrow B \oplus A$   
Wahrheitstabelle

A	B	$A \oplus B$	$B \oplus A$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

$\Rightarrow \oplus$  ist kommutativ ✓

b, Assoziativ  $(A \oplus B) \oplus C \stackrel{?}{=} A \oplus (B \oplus C)$

A	B	C	$A \oplus B$	$(A \oplus B) \oplus C$	$B \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1

$\Rightarrow \oplus$  ist assoziativ ✓

c, idempotent  $A \oplus A \oplus A \oplus \dots \oplus A = A$

Laut Interdefiniertbarkeit ist  $A \oplus B = (\neg A \wedge B) \vee (A \wedge \neg B)$

$$\Rightarrow A \oplus A = (\neg A \wedge A) \vee (A \wedge \neg A)$$

Außerdem gilt  $\neg A \wedge A \equiv A \wedge \neg A$  (Äquivalenzregel)  
 $\neg A \wedge A \equiv \perp \Rightarrow A \oplus A = \perp \vee \perp = \perp$

Wir machen rekursiv für n-mal  $A \oplus A \oplus \dots \oplus A$ , da  $A \oplus A \equiv \perp$  ist

$$\Rightarrow \perp \oplus A = (\perp \wedge A)$$


A	A	$(A \oplus A)$	$(A \oplus A) \oplus A$	$A \oplus A \oplus A \oplus A$
0	0	0	0	0
1	1	0	1	0

$\oplus$  ist nicht idempotent, da  $1 \oplus 1 = 0 \neq 1$ .

-0,5P

**Aufgabe 3:** beliebige Formel  $F$ ,  $d(F)$  ist die Tiefe von  $F$   
 $\text{vars}(F)$  die Menge aller Variable

2/3



$$|\text{vars}(F)| \leq 2^{d(F)}$$

**Induktionsanfang:** Für atomare Formel  $F$ , wenn  $F = \perp$  oder  $F = \top$   
 ist  $d(F) = 0$ ,  $\text{vars}(F) = \emptyset$

$$\Rightarrow 2^{d(F)} = 2^0 = 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq 1$$

$$2^4 = 16$$

**Induktionsannahme:** gilt  $|\text{vars}(F)| \leq 2^{d(F)}$

**Induktionsschritt:**

Sei  $F = \neg F_1 \Rightarrow d(F) = d(F_1) + 1$

$$|\text{vars}(F)| \leq 2^{d(F)} < 2^{d(F_1)+1}$$

$\rightarrow$  zu zeigen:  $|\text{vars}(\neg F_1)| \leq 2^{d(\neg F_1)}$



$$d = 3$$

$$5 \leq 2^3 = 8$$

Sei  $F = F_1 \circ F_2$ ,  $\circ \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$

$$|\text{vars}(F)| = |\text{vars}(F_1) \cup \text{vars}(F_2)|$$

laut IA:  $|\text{vars}(F_1)| \leq 2^{d(F_1)}$ ,  $|\text{vars}(F_2)| \leq 2^{d(F_2)}$

$$\Rightarrow |\text{vars}(F)| \leq 2^{d(F_1)} + 2^{d(F_2)} \leq 2^{\max(d(F_1), d(F_2))} \leq 2^{d(F_1 \circ F_2)}$$

$\Rightarrow$  die Formel  $|\text{vars}(F)| \leq 2^{d(F)}$  gilt

$$F = (A \rightarrow B) \vee (A \rightarrow C) \quad \text{,} \quad |\text{vars}(F)| = |\{A, B, C\}| = 3 \leq |\{A, B\}| + |\{A, C\}| = 4$$

$F_1 \quad \vee \quad F_2$

## Aufgabe 4: 3/3

$F$ : Formel nur Variable (Atome) und die Junktoren

$V$  ist positiv wenn:  $V \rightarrow$  Wurzel hat gerade Anzahl von negation  
negativ \_\_\_\_\_ ungerade \_\_\_\_\_

$\text{posVars}(F: \text{Formel}): \text{Set}[\text{Variable}]$

```
switch F
  case (F ist atom) : Set.add(F, "+")
  case Negation(F)  : negVars(F)
  case And(F1, F2)  : posVars(F1) ++ + posVars(F2)
  case Or(F1, F2)   : posVars(F1) ++ + posVars(F2)
  case Imp(F1, F2)  : negVars(F1) ++ + posVars(F2) //  $\neg F_1 \vee F_2$ 
else
  False Ausgabe soll ein Set sein, kein Boolescher Wert.
```

$\text{negVars}(F: \text{Formel}): \text{Set}[\text{Variable}]$

```
switch F
  case (F ist atom) : Set.add(F, "-")
  case Negation(F)  : posVars(F)
  case And(F1, F2)  : negVars(F1) ++ + negVars(F2)
  case Or(F1, F2)   : negVars(F1) ++ + negVars(F2)
  case Imp(F1, F2)  : posVars(F1) ++ + negVars(F2) // De-Morgan
else
  False Set[String]().
```

print(Set)

# Aufgabe 5: 2/4

$$F = A \vee B \wedge \neg A$$

$$G = \neg A \rightarrow C$$


$$H = A \wedge \neg B$$

$$a_1 \quad F[G/A] = (\neg A \rightarrow C) \vee B \wedge \neg (\neg A \rightarrow C)$$

↓  
stärker als  $\vee$


$$= (\neg A \rightarrow C) \vee (B \wedge \neg (\neg A \rightarrow C))$$

↑  
in der Wurzel



$$(F[G/A])[G/A] = (\neg (\neg A \rightarrow C) \rightarrow C) \vee B \wedge \neg (\neg (\neg A \rightarrow C) \rightarrow C)$$


wie oben



$$(F[G/A])[H/B] = (\neg A \rightarrow C) \vee (A \wedge \neg B) \wedge \neg (\neg A \rightarrow C)$$

am schwächsten

Nein,



$$F[G/A, H/B] = (\neg A \rightarrow C) \vee (A \wedge \neg B) \wedge \neg (\neg A \rightarrow C)$$

b, Seien  $F, G, H$  gegeben und  $A \neq B$

$$F([G/A])_{[H/B]} = F[G/A]_{[H/B]} \quad \text{wenn } B \text{ ist nicht in } G$$

&  $A$  ist nicht in  $H$ . -1P