

Aufgabe 1

11,5 / 22

(i.) A ist semipositiv definit wenn $\begin{cases} A \text{ ist symmetrisch} \\ x^T A x \geq 0 \end{cases} (x \in \mathbb{R}^n)$

$\Leftrightarrow AA^T$ ist positiv definit. das gilt $x^T A A^T x > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, x \neq 0$

$$\text{Sei } y = A^T x \Rightarrow x^T A A^T x = y^T \cdot y$$

$$\Leftrightarrow y^T \cdot y = \sum_{k=1}^N y_k^2$$

$$\text{Sei } y_k^2 \geq 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^N y_k^2 \geq 0 \quad \checkmark$$

$\Rightarrow AA^T$ ist positiv definit bzw. positiv semidefinit

(ii.) Matrix A mit $\text{rank}(A) > 1$

- Ein Matrix, in denen Zeilen oder Spalten linear abhängig sind, gibt kein inverse Matrix

$$\text{Sei } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow AA^T = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 0 \\ 3 & 5 & 7 \\ 0 & 7 & 14 \end{pmatrix}$$

$\text{rang}(A) = 3 > 1$ und die Zeilen von AA^T ist linear abhängig

$\Rightarrow AA^T$ gibt kein Inverse.

Das müsste man bei diesem Beispiel schon kurz zeigen
hier kann man A deutlich einfacher wählen bspw. mit
zwei verschiedenen Einheitsvektoren und einer Nullspalte

(iii.) $\text{rank}(A) = m \Rightarrow$ Matrix A hat vollen Rank

Sei S, T invertierbare Matrix $S, T \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$\text{mit } S^{-1} \cdot A \cdot T = E_n \Rightarrow S^{-1} \cdot A = T^{-1} \quad \text{Sei } B = TS^{-1}$$

$$B \cdot A = T \cdot S^{-1} \cdot A = T \cdot T^{-1} = E_n$$

$\Rightarrow A$ ist auch invertierbar

A muss nicht quadratisch sein
es ist z.z. das AA^T invertierbar

ii)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

zwei lin. unabhängig Spalte $\text{rang}(A) = 1$ $AA^T = A$

$$0 = \det(A) = \det(AA^T) \rightarrow AA^T \text{ nicht invertierbar}$$

iii) \approx aus $AA^T x = 0$ folgt $x = 0$ $N(AA^T) = \{0\}$

$$AA^T x = 0 \Rightarrow x^T AA^T x = 0 \Rightarrow \|A^T x\|_2 = 0, \text{ es gilt also}$$

Da $\text{Rang}(A) = m$ und $A \in \mathbb{R}^{m \times n} \Rightarrow$ Zeilen von A lin. unabh. $A^T x = 0$

\Rightarrow Spalten von A^T lin. unabh.
 $\Rightarrow x = 0$

Aufgabe 2:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{N}(A) = \{ p \in \mathbb{R}^4 : Ap = 0 \} \quad \text{Sei } p = (p_1, p_2, p_3, p_4)$$

$$Ap = 0 \Leftrightarrow \begin{array}{l} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\frac{1}{2}\text{II}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-(\text{II}-\text{I})} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{\begin{array}{l} \text{III} + \text{II} \\ -\text{II} \end{array}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow \text{Dann erhalten wir } \begin{cases} p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = 0 \\ p_2 + p_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} p_1 + p_4 = 0 \\ p_2 = -p_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} p_1 = -p_4 \\ p_2 = -p_3 \end{cases} \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ -p_2 \\ -p_1 \end{pmatrix} = p_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + p_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{N}(A) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Spalten Basis

$$\rightarrow \text{Daraus folgt } Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ ist NRM von } \mathcal{N}(A)$$

Z sollte keine Basis sein

$\dim \mathcal{N}(A) = 2 \Rightarrow \dim \mathcal{R}(A^T) = 4 - \dim \mathcal{N}(A) = 2 \rightarrow$ diese Zeilen bilden eine Basis des Bildraums $\rightarrow (\dots)$

$$\rightarrow x^M = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + 2\mu_2 + \mu_3 \\ \lambda_2 - \mu_3 \\ -\lambda_2 - \mu_3 \\ -\lambda_1 + 2\mu_2 + \mu_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sei } \lambda_2 - \mu_3 = 0 \text{ in Zeile 2} \Rightarrow \lambda_2 = \mu_3$$

$$\text{Einsetzen in Z.3} \Rightarrow -\lambda_2 - \mu_3 = 1 \Rightarrow -2\lambda_2 = 1 \Rightarrow \lambda_2 = -\frac{1}{2} \Rightarrow \mu_3 = -\frac{1}{2}$$

$$\text{in Z.1} \Rightarrow \lambda_1 + 2\mu_2 - \frac{1}{2} = 1 \Leftrightarrow \lambda_1 + 2\mu_2 = \frac{3}{2}$$

$$\text{in Z.4} \rightarrow -\lambda_1 + 2\mu_2 - \frac{1}{2} = 0 \Leftrightarrow -\lambda_1 + 2\mu_2 = \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \lambda_1 = \frac{1}{2}, \mu_2 = \frac{1}{2}$$

$$p = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 0 \\ -1/2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix}$$

$$q = \mu_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}$$

$$x^{(2)} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -5 \\ -3 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -5 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 + 2\mu_2 + \mu_3 \\ \lambda_2 - \mu_3 \\ -\lambda_2 - \mu_3 \\ -\lambda_1 + 2\mu_2 + \mu_3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Sei von Z.2, Z.3} \Rightarrow \begin{cases} \lambda_2 - \mu_3 = 5 \\ -\lambda_2 - \mu_3 = -5 \end{cases} \rightarrow \lambda_2 = 5, \mu_3 = 0$$

$$\Rightarrow \text{in Z.1} \rightarrow \lambda_1 + 2\mu_2 + 0 = 3$$

$$\text{Z.4} \rightarrow -\lambda_1 + 2\mu_2 + 0 = -3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 + 2\mu_2 = 3 \\ -\lambda_1 + 2\mu_2 = -3 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = 3, \mu_2 = 0$$

$$p = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$q = \mu_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(...) Auf 2

Die ersten beiden Zeilen von A sind lin. unab

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$R(A^T) = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle$$

$$x^{(1)} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Aufgabe 3:

Sei $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $b = \begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ 2 \end{pmatrix}$

Indizes $\{1, 2, 3\}$

Die Spalten 1, 2, 3 von A sind linear unabhängig

$\Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{II} - \frac{1}{2}\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{III} + 4\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -1/2 & -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 & 4 & 1 \end{array} \right)$

$\xrightarrow{\begin{smallmatrix} 2 \cdot \text{II} \\ 1/3 \cdot \text{III} \end{smallmatrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4/3 & -1/3 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{II} + \text{III} \\ \text{I} - \text{III} \end{smallmatrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 0 & 4/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4/3 & -1/3 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{I} - \text{II}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2/3 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -4/3 & -1/3 \end{array} \right)$

$\Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & -1/3 \\ 1 & -4/3 & -1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 16/3 \\ 10/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 16/3 \\ 10/3 \\ 1/3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\bar{x} = \begin{pmatrix} 8^{-1} b \\ 0 \end{pmatrix}$

Da $\bar{x} \geq 0 \Rightarrow$ es ist eine zulässige Punkt

Indizes $\{2, 4, 5\}$

Die Spalten 2, 4, 5 von A sind linear unabhängig

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{smallmatrix} \text{II} - \text{I} \\ \text{III} + \text{I} \end{smallmatrix}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$\rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} \cdot b = \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 11 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \\ -3 \\ 11 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\textcircled{*} -3 < 0$

\bar{x} ist nicht $\geq 0 \Rightarrow$ ist \bar{x} nicht zulässig



4/4

Auf 4:

$$0 = a^T P a = a^T P^T a = a^T P P a = a^T P^T P a = (P a)^T (P a) = \|P a\|^2$$

$\Rightarrow \exists \lambda$ sodass $a = A^T \lambda \Rightarrow a$ darstellbar als LK der Spalte
von A^T (= Zeile von A) \downarrow Widerspruch $\Rightarrow a^T P a \neq 0$

Sei nun $p \in \mathcal{N}(\hat{A}) \rightarrow \hat{A}p = \begin{pmatrix} A \\ a^T \end{pmatrix} p = \begin{pmatrix} Ap \\ a^T p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow Ap = 0$ und $a^T p = 0$, d.h. $p \in \mathcal{N}(A)$
 $\mathcal{P}_p = p$

Sei $q \in \mathbb{R}$ $(A)^T$ dh $\hat{\lambda}$ mit $A^T \hat{\lambda} = q$ $A^T = A_1^T$

