

11/20

(.)

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in M = \begin{pmatrix} \lambda x_1 + (1-\lambda)y_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n + (1-\lambda)y_n \end{pmatrix}$$

Philipps-Universität Marburg

Fachbereich Mathematik

Dr. M. Hansen, D. Vogel

Wintersemester 2022/2023

Übungen zur LINEAREN OPTIMIERUNG

3. Aufgabenblatt

$$\lambda x_n + (1-\lambda)y_n \geq \sqrt{(\lambda x_1 + (1-\lambda)y_1)^2 + \dots + (\lambda x_n + (1-\lambda)y_n)^2}$$

$$(\lambda x_1)^2 + 2\lambda x_1(1-\lambda)y_1 + (1-\lambda)^2 y_1^2$$

**Aufgabe 1** Beweisen oder widerlegen Sie, dass die folgende Menge konvex ist: (4)

$$M := \{x \in \mathbb{R}^n : x_n \geq \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}\} \subset \mathbb{R}^n.$$

$$x_n^2 \geq 1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 \rightarrow x_n^2 - x_1^2 - \dots - x_{n-1}^2 \geq 0$$

**Aufgabe 2** Bestimmen Sie eine Approximation an den Minimierer  $x^*$  der Funktion (5)

$$f(x) = -3x + e^x.$$

Führen Sie dazu jeweils 3 Schritte des Newton-Verfahrens mit den Startwerten  $x^{(0)} = 0.5$  und  $y^{(0)} = -2$  durch. Analysieren Sie die Approximationen  $x^{(3)}$  und  $y^{(3)}$ : Was fällt Ihnen auf?*Hinweis:* Verwenden Sie bei Ihren Rechnungen 4 Nachkommastellen.**Aufgabe 3** Es wird die zulässige Menge  $M = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax \geq b\}$  mit (6)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix} \quad Ax \geq b$$

betrachtet. Zu den Punkten  $\bar{x}^{(1)} = (10, 8, 19)^T$ ,  $\bar{x}^{(2)} = (-2, -1, 17)^T$ ,  $\bar{x}^{(3)} = (-1, 1, 20)^T$  seien die zulässigen Richtungen  $d^{(1)} = (-4, -5, -7)^T$ ,  $d^{(2)} = (3, 3, 4)^T$ ,  $d^{(3)} = (-5, -4, -2)^T$  gegeben. Bestimmen Sie mittels des Quotiententests jeweils die maximale Schrittlänge  $\bar{\alpha}_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , sodass  $\bar{x}^{(i)} + \bar{\alpha}_i d^{(i)} \in M$  gilt (sofern ein solches  $\bar{\alpha}_i$  existiert) und geben sie an, wie sich die aktiven Mengen ändern.

**Aufgabe 4** Es seien  $b \in \mathbb{R}^n$ ,  $c \in \mathbb{R}$  und  $a \in \mathbb{R}^n$  mit  $a_i > 0$ ,  $i = 1, \dots, n$  gegeben. Zu der (5)  
Diagonalmatrix  $A = \text{diag}(a)$  sei die Funktion

$$f(x) := \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c \quad \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c$$

definiert. Außerdem sei ein Vektor  $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$  fest gewählt. Bestimmen Sie die steilste Abstiegsrichtung  $d$  von  $f$  im Punkt  $\bar{x}$  und zeigen Sie, dass

$$\bar{\alpha} := \arg \min_{\alpha > 0} f(\bar{x} + \alpha d) = \frac{d^T A d}{\|A d\|_2^2}$$

gilt.

*Hinweis:* Es ist  $f'(x) = Ax - b$ .**Abgabe:** Dienstag, 15.11.22, vor der Vorlesung.

$$d = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x & x \\ 0 & x & x \end{pmatrix}$$

$$x_n \geq \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}$$

$$x = (0 \ 0 \ 0 \ 1)^T$$

$$y = (0 \ 0 \ 0 \ 2)^T$$

$$\lambda x + (1-\lambda)y \in M$$

$$\begin{pmatrix} \lambda x_1 + (1-\lambda)y_1 \\ \lambda x_2 + (1-\lambda)y_2 \\ \dots \\ \lambda x_n + (1-\lambda)y_n \end{pmatrix}$$

$$\lambda x_n + (1-\lambda)y_n$$

$$\text{sei } x_n \geq \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2} \\ \Rightarrow \lambda x_n \geq \lambda \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}$$

$$(1-\lambda)y_n \geq (1-\lambda) \sqrt{1 + y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2}$$

$$\Rightarrow \lambda x_n + (1-\lambda)y_n \geq \lambda \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2} + (1-\lambda) \sqrt{1 + y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2} \geq$$

$$2 \geq \sqrt{\lambda^2 + \lambda^2 x_1^2 + \dots + \lambda^2 x_{n-1}^2} + \sqrt{(1-\lambda)^2 + (1-\lambda)^2 y_1^2 + \dots + (1-\lambda)^2 y_{n-1}^2}$$

$$(\lambda x_n + (1-\lambda)y_n)^2 \geq 1 + (\lambda x_1 + (1-\lambda)y_1)^2 + \dots + (\lambda x_{n-1} + (1-\lambda)y_{n-1})^2$$

$$\geq \lambda^2(x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2) + (1-\lambda)^2(y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2) \\ + 2\lambda(1-\lambda)x_1 y_1$$

$$\lambda(1-\lambda) \sqrt{(1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2)(1 + y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2)}$$

$$1 + y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2 + x_1^2 + x_1^2 y_1^2 + \dots + x_1^2 y_{n-1}^2 + \dots + x_{n-1}^2 + x_{n-1}^2 y_1^2 + \dots + x_{n-1}^2 y_{n-1}^2$$

$\geq$

$$\sqrt{1 + (\lambda x_1 + (1-\lambda)y_1)^2 + \dots + (\lambda x_{n-1} + (1-\lambda)y_{n-1})^2}$$

$$\sqrt{1 + \lambda^2 x_1^2 + 2\lambda(1-\lambda)x_1 y_1 + (1-\lambda)^2 y_1^2}$$

$$\sqrt{1 + (x_1 + y_1)^2 + \dots + (x_{n-1} + y_{n-1})^2}$$

$$\sqrt{1 + (x_1^2 + 2x_1 y_1 + y_1^2) + \dots + (x_{n-1}^2 + 2x_{n-1} y_{n-1} + y_{n-1}^2)}$$

$$x_n \geq \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}$$

$$y_n \geq \sqrt{1 + y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2}$$

$$\begin{aligned} \lambda x_n + (1-\lambda) y_n &\geq \sqrt{1 + (\lambda x_1 + (1-\lambda) y_1)^2 + \dots + (\lambda x_{n-1} + (1-\lambda) y_{n-1})^2} \\ &\geq \sqrt{1 + \lambda^2 x_1^2 + 2\lambda(1-\lambda) x_1 y_1 + (1-\lambda)^2 y_1^2 + \dots} \\ &\geq \sqrt{1 + \lambda^2 (x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2) + 2\lambda(1-\lambda) (x_1 y_1 + \dots + x_{n-1} y_{n-1}) + (1-\lambda)^2 (y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2)} \end{aligned}$$

$$\lambda x_n + (1-\lambda) y_n \geq \underbrace{\lambda \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}}_{\geq 1} + (1-\lambda) \underbrace{\sqrt{1 + y_1^2 + \dots + y_{n-1}^2}}_{\geq 1}$$

## Aufgabe 2

### Newton Verfahren

Ableitungen

$$f(x) = -3x + e^x$$

$$\rightarrow f'(x) = -3 + e^x$$

$$\rightarrow f''(x) = e^x$$

1) Für Startwert  $x^0 = 0.5$

2) Test für Optimalität

$$x^1 = x^0 - \frac{f'(x^0)}{f''(x^0)} = 0.5 - \frac{-3 + e^{0.5}}{e^{0.5}} \approx 1.3196$$

$$x^2 = x^1 - \frac{f'(x^1)}{f''(x^1)} = 1.3196 - \frac{-3 + e^{1.3196}}{e^{1.3196}} \approx 1.1213$$

$$x^3 = x^2 - \frac{f'(x^2)}{f''(x^2)} = 1.1213 - \frac{-3 + e^{1.1213}}{e^{1.1213}} \approx 1.0988$$

$$f(1.0988) \approx -0.2958$$

$\Rightarrow$  Nach 3 Schritten des Newton Verfahren ist die Minimum von  $f(x) = -3x + e^x$  mit  $x^0 = 0.5$  liegt bei Punkt  $(1.0988, -0.2958)$

1) Für Startwert  $y^0 = -2$

2) Test für Optimalität

$$y^1 = y^0 - \frac{f'(y^0)}{f''(y^0)} = -2 - \frac{-3 + e^{-2}}{e^{-2}} \approx 19.1617$$

$$y^2 = y^1 - \frac{f'(y^1)}{f''(y^1)} = 19.1617 - \frac{-3 + e^{19.1617}}{e^{19.1617}} \approx 18.1617$$

$$y^3 = y^2 - \frac{f'(y^2)}{f''(y^2)} = 18.1617 - \frac{-3 + e^{18.1617}}{e^{18.1617}} \approx 17.1617$$

$$f(17.1617, 28394277)$$

$\Rightarrow$  Nach 3 Schritten des Newton Verfahren ist die Minimum von  $f(y) = -3y + e^y$  mit  $y^0 = -2$  liegt bei Punkt  $(17.1617, 28394277)$

Mit Startpoint  $y^0 = -2$  kann Minimum nicht approximiert werden.

### Aufgabe 3:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

- für den zulässigen Punkt  $\bar{x}^{(1)} = (10, 8, 19)^T$ , bestimmen  $\mathcal{J}$

$$\begin{aligned} a_1 &= (-1 \ 2 \ 0)^T & a_1^T x &= 6 > -3 \\ a_2 &= (4 \ -4 \ 1)^T & a_2^T x &= 27 > 9 \\ a_3 &= (2 \ -3 \ 1)^T & a_3^T x &= 15 > 3 \\ a_4 &= (2 \ -1 \ 0)^T & a_4^T x &= 12 > -6 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{J} = \{1, 2, 3, 4\}$$

Alle Ungleichung sind unaktiv, ist  $d^{(1)} = (-4, -5, -7)^T$  zulässige Richtung

$$\begin{aligned} a_1^T d^1 &= -6 < 0 \\ a_2^T d^1 &= -3 < 0 \\ a_3^T d^1 &= 0 = 0 \\ a_4^T d^1 &= -3 < 0 \end{aligned}$$

Quotientenkriterium ergibt sich:  $\bar{\alpha} = \min \left\{ \frac{a_j^T \bar{x} - b_j}{-a_j^T d} \mid j \in \{1, 2, 4\} \atop a_j^T d < 0 \right\}$

$$\begin{aligned} &= \min \left\{ \frac{9}{6}, \frac{18}{3}, \frac{18}{3} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{3}{2}, 6 \right\} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

- für den zulässigen Punkt  $\bar{x}^{(2)} = (-2, -1, 14)^T$ , bestimmen  $\mathcal{J}$

$$\begin{aligned} a_1 &= (-1 \ 2 \ 0)^T & a_1^T x &= 0 > -3 \\ a_2 &= (4 \ -4 \ 1)^T & a_2^T x &= 13 > 9 \\ a_3 &= (2 \ -3 \ 1)^T & a_3^T x &= 16 > 3 \\ a_4 &= (2 \ -1 \ 0)^T & a_4^T x &= -3 > -6 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{J} = \{1, 2, 3, 4\}$$

die Ungleichung sind unaktiv, ist  $d^{(2)} = (3, 3, 4)^T$  zulässige Richtung

$$\begin{aligned} a_1^T d^1 &= 3 > 0 \\ a_2^T d^1 &= 4 > 0 \\ a_3^T d^1 &= 4 > 0 \\ a_4^T d^1 &= 3 > 0 \end{aligned}$$

$a_i^T d^i$  für  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$  sind unkritisch für die maximale Schrittweite.

- für den zulässigen Punkt  $\bar{x}^{(s)} = (-1, 1, 20)^T$ , bestimmen  $\mathcal{J}$

$$\begin{array}{lcl} a_1 = (-1 \ 2 \ 0)^T & a_1^T x = 3 > -3 \\ a_2 = (4 \ -4 \ 1)^T & a_2^T x = 12 > 9 \\ a_3 = (2 \ -3 \ 1)^T & a_3^T x = 15 > 3 \\ a_4 = (2 \ -1 \ 0)^T & a_4^T x = -3 > -6 \end{array} \Rightarrow \mathcal{J} = \{1, 2, 3, 4\}$$

Alle Ungleichungen sind unaktiv, ist  $d^{(s)} = (-5, -4, -2)^T$  zulässige Richtung

$$\begin{array}{lcl} a_1^T d^1 & = & 13 > 0 \\ a_2^T d^1 & = & -6 < 0 \\ a_3^T d^1 & = & 0 = 0 \\ a_4^T d^1 & = & -6 < 0 \end{array}$$

Quotientenkriterium ergibt sich:

$$\begin{aligned} \bar{\alpha} &= \min \left\{ \frac{a_j^T \bar{x} - b_j}{-a_j^T d} \mid j \in \{2, 4\} \right. \\ &\quad \left. a_j^T d < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{12-9}{6}, \frac{-3+6}{6} \right\} \\ &= \min \left\{ \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

## Aufgabe 4:

die steilste Abstiegsrichtung  $d$  von  $f$  im Punkt  $\bar{x}$

$$d = -f'(\bar{x}) = -(A\bar{x} - b) = -A\bar{x} + b$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} = \frac{b-d}{A}$$

Wir bestimmen  $\bar{\alpha}$  : sei  $\bar{\alpha} = \underset{\alpha > 0}{\operatorname{argmin}} f(\bar{x} + \alpha d)$

$$\Rightarrow f'(\bar{x} + \bar{\alpha}d) = 0$$

$$f'(\bar{x} + \bar{\alpha}d) = A(\bar{x} + \bar{\alpha}d) - b$$

$$\Rightarrow A\bar{x} + A\bar{\alpha}d - b = 0$$

$$\Rightarrow A \cdot \frac{b-d}{A} - b + \bar{\alpha}Ad = 0$$

$$\Leftrightarrow b - d - b + \bar{\alpha}Ad = 0$$

$$\Leftrightarrow \bar{\alpha} = \frac{d}{Ad}$$

Wir prüfen :  $\frac{d}{Ad} = \frac{\|d\|^2}{d^T A \cdot d}$  gilt

$$\Leftrightarrow \frac{d \cdot d^T \cdot A \cdot d}{A \cdot d} = \|d\|^2$$

$$\Leftrightarrow (d^T \cdot d) A \cdot d = \|d\|^2 \cdot A \cdot d$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{(d_1^2 + \dots + d_n^2)}_{\|d\|^2} \cdot A \cdot d = \|d\|^2 \cdot A \cdot d$$

Die Gleichung stimmen.

Übungen zur LINEAREN OPTIMIERUNG  
3. Aufgabenblatt

**Aufgabe 1** Beweisen oder widerlegen Sie, dass die folgende Menge konvex ist: (4)

$$M := \{x \in \mathbb{R}^n : x_n \geq \sqrt{1 + x_1^2 + \dots + x_{n-1}^2}\} \subset \mathbb{R}^n.$$

**Aufgabe 2** Bestimmen Sie eine Approximation an den Minimierer  $x^*$  der Funktion (5)

$$f(x) = -3x + e^x.$$

Führen Sie dazu jeweils 3 Schritte des Newton-Verfahrens mit den Startwerten  $x^{(0)} = 0.5$  und  $y^{(0)} = -2$  durch. Analysieren Sie die Approximationen  $x^{(3)}$  und  $y^{(3)}$ : Was fällt Ihnen auf?

*Hinweis:* Verwenden Sie bei Ihren Rechnungen 4 Nachkommastellen.

**Aufgabe 3** Es wird die zulässige Menge  $M = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax \geq b\}$  mit (6)

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

betrachtet. Zu den Punkten  $\bar{x}^{(1)} = (10, 8, 19)^\top$ ,  $\bar{x}^{(2)} = (-2, -1, 17)^\top$ ,  $\bar{x}^{(3)} = (-1, 1, 20)^\top$  seien die zulässigen Richtungen  $d^{(1)} = (-4, -5, -7)^\top$ ,  $d^{(2)} = (3, 3, 4)^\top$ ,  $d^{(3)} = (-5, -4, -2)^\top$  gegeben. Bestimmen Sie mittels des Quotiententests jeweils die maximale Schrittlänge  $\bar{\alpha}_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , sodass  $\bar{x}^{(i)} + \bar{\alpha}_i d^{(i)} \in M$  gilt (sofern ein solches  $\bar{\alpha}_i$  existiert) und geben sie an, wie sich die aktiven Mengen ändern.

**Aufgabe 4** Es seien  $b \in \mathbb{R}^n$ ,  $c \in \mathbb{R}$  und  $a \in \mathbb{R}^n$  mit  $a_i > 0$ ,  $i = 1, \dots, n$  gegeben. Zu der (5)  
Diagonalmatrix  $A = \text{diag}(a)$  sei die Funktion

$$f(x) := \frac{1}{2} x^\top A x - b^\top x + c$$

definiert. Außerdem sei ein Vektor  $\bar{x} \in \mathbb{R}^n$  fest gewählt. Bestimmen Sie die steilste Abstiegsrichtung  $d$  von  $f$  im Punkt  $\bar{x}$  und zeigen Sie, dass

$$\bar{\alpha} := \arg \min_{\alpha > 0} f(\bar{x} + \alpha d) = \frac{d^\top A d}{\|A d\|_2^2}$$

gilt.

*Hinweis:* Es ist  $f'(x) = Ax - b$ .

**Abgabe:** Dienstag, 15.11.22, vor der Vorlesung.



## Aufgabe 3

**Aufgabe 3** Es wird die zulässige Menge  $M = \{x \in \mathbb{R}^3 : Ax \geq b\}$  mit

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 4 & -4 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}$$

betrachtet. Zu den Punkten  $\bar{x}^{(1)} = (10, 8, 19)^T$ ,  $\bar{x}^{(2)} = (-2, -1, 17)^T$ ,  $\bar{x}^{(3)} = (-1, 1, 20)^T$  seien die zulässigen Richtungen  $d^{(1)} = (-4, -5, -7)^T$ ,  $d^{(2)} = (3, 3, 4)^T$ ,  $d^{(3)} = (-5, -4, -2)^T$  gegeben. Bestimmen Sie mittels des Quotiententests jeweils die maximale Schrittlänge  $\bar{\alpha}_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = 1, 2, 3$ , sodass  $\bar{x}^{(i)} + \bar{\alpha}_i d^{(i)} \in M$  gilt (sofern ein solches  $\bar{\alpha}_i$  existiert) und geben sie an, wie sich die aktiven Mengen ändern.