



Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Конспект лекций

«Преобразования Лапласа и Фурье»

Лектор
к.ф.-м.н., доцент И. В. Рублёв

Москва, 2019

Содержание

1	Как заполнять документ	3
1.1	doc.tex	3
1.2	bib.tex	5
1.3	set.tex	5
1.4	Заключение	5
1.5	Список приславших	5
2	Преобразование Лапласа-Фурье	7
2.1	Некоторые сведения из ТФКП	7
2.2	Применение вычетов для вычисления интеграла вида $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} R(x)$	9
2.3	Ряды и преобразование Фурье	10
2.4	Примеры	12
3	Свойства преобразования Фурье	13
4	Оценка погрешности	21
4.1	Эффект наложения спектров	21
4.2	Рябь ($\Delta_0 > 0$)	21
4.3	Ошибка ряби	21
5	Теоремы о предельных значениях	24
6	Приложения преобразования Лапласа к исследованию процессов в электрических цепях	24
7	Электромеханические аналогии	28
8	Управляемые и наблюдаемые системы	29
9	Устойчивость	32
9.1	Графический метод исследования на устойчивость	32
9.2	Применение к теории управления	33
9.3	Теорема Найквиста	33

1 Как заполнять документ

Сейчас я расскажу, как максимально быстро собрать лекцию, чтобы никому ничего не сломать. Предлагаю также ориентироваться на этот пример (папка `ch0`). Итак, порядок действий:

1. Скачать себе этот архив.
Он собирается командой `make` или `pdflatex doc`, если вы используете Windows.
2. Создать в корне вашу папку `chНОМЕРГЛАВЫ`.
В примере папка `ch0`.
3. Заполнить в этой папке три документа: `doc.tex`, `bib.tex`, `set.tex`, положить туда все ваши картинки и все, что вам нужно.
4. Проверить, что все собралось правильно.
5. Отослать мне на почту `kireku@gmail.com` с темой “ВКР” или, если вы умеете, сделать `pull request`.

1.1 doc.tex

Это файл с вашим текстом. Туда вы пишете лекцию.


Я добавил уже ряд математических операторов. Если вы хотите добавить свои смотри раздел про `set.tex`.

Код	Результат
<code>\sgn</code>	sgn
<code>\const</code>	const
<code>\T</code>	\mathbb{T}
<code>\SetN</code>	\mathbb{N}
<code>\SetZ</code>	\mathbb{Z}
<code>\SetQ</code>	\mathbb{Q}
<code>\SetR</code>	\mathbb{R}
<code>\SetC</code>	\mathbb{C}
<code>\Prb</code>	\mathbb{P}
<code>\Ind</code>	\mathbb{I}
<code>\Exp</code>	\mathbb{E}
<code>\Var</code>	$\mathbb{V}\operatorname{ar}$
<code>\SetX</code>	\mathcal{X}
<code>\SetP</code>	\mathcal{P}

Также встроены окружения. Они как в книжке Арама, то есть красивые, не используйте другие.

Код	Результат
<pre>\begin{theorem} Это теорема. \end{theorem}</pre>	Теорема 1.1. <i>Это теорема.</i>
<pre>\begin{definition} Это определение \textit{сходимости}. \end{definition}</pre>	Определение 1.1. Это определение <i>сходимости</i> .
<pre>\begin{lemma} Это лемма. \end{lemma}</pre>	Лемма 1.1. <i>Это лемма.</i>
<pre>\begin{assertion} Это утверждение. \end{assertion}</pre>	Утверждение 1.1. <i>Это утверждение.</i>
<pre>\begin{example} Это пример. \end{example}</pre>	Пример 1.1. Это пример.
<pre>\begin{proof} Это доказательство чего-либо. \end{proof}</pre>	До к а з а т е л ь с т в о. Это доказательство чего-либо. ■

Чтобы добавить картинку, положите ее в вашу папку и укажите полный путь:

Код	Результат
<pre>\includegraphics{ch0/example.eps}</pre>	

Используя метки, обязательно ставьте префикс-название папки:

Код	Результат
<pre>\begin{equation} \label{ch0.square} x^2 = 0. \end{equation}</pre>	$x^2 = 0. \quad (1.1)$

1.2 bib.tex

Если вам нужна библиография — сюда можно написать библиографию, она автоматом окажется внизу. Все ссылки, по-прежнему с префиксом.

Содержимое ch0/bib.tex
<pre>\bibitem{ch0.voroncov} К.~В.~Воронцов. \textit{\LaTeX в примерах}.~--- М.: МЦНМО, 2005.</pre>

1.3 set.tex

Если вам жизненно не хватает какой-нибудь суперштуки, которую обычно объявляют в начале файла: новую команду, окружение или что-то в этом духе, то напишите сюда. Но все это пишите с каким-нибудь префиксом.

Например, я очень захотел писать прикольные дроби, типа $\frac{3}{4}$ и новый оператор $\text{Kirill}_{x \in \mathcal{X}}$, тогда я должен туда написать:

Содержимое ch0/bib.tex
<pre>\usepackage{nicefrac} \DeclareMathOperator{\zeroKir}{Kirill}</pre>

Но вообще, если вы не уверены, что все не перестанет компилироваться, то не стоит подключать пакеты. Пакеты будут действовать на весь документ в целом.

1.4 Заключение

Вообще, было бы круто, чтобы все получилось примерно одинаково и красиво. В библиографии есть книжка хорошая по Латеху, если кому нужна.

1.5 Список приславших

1. Абрамова
2. Авалиани
3. Ашабоков
4. Егоров
5. Кожевец

6. Садков

2 Преобразование Лапласа-Фурье

2.1 Некоторые сведения из ТФКП

Перед тем, как приступить непосредственно к преобразованиям Фурье, вспомним, для начала, курс ТФКП.

Вспомним как задается функция комплексной переменной:

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y), \quad z = x + iy$$

Производная в точке z_0 :

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}, \quad \text{где } \Delta z = \Delta x + i\Delta y$$

1. $\Delta z = \Delta x$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x, y_0) + iv(x_0 + \Delta x, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{\Delta x} \Rightarrow \exists u_x, v_x : \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{\dots\} = u'_x + iv'_x$$

2. $\Delta z = i\Delta y$:

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + \Delta y) + iv(x_0, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{i\Delta y} \Rightarrow \exists u_y, v_y : \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \{\dots\} = -iu'_y + v'_y$$

Условия Коши-Римана:

$$\begin{cases} u'_x = v'_y \\ u'_y = -v'_x \end{cases}$$

Напомним, что интеграл от функции комплексного переменного вводится (так же, как и в действительной области) как предел последовательности интегральных сумм; функция при этом определена на некоторой кривой Γ , кривая предполагается гладкой или кусочно-гладкой:

$$\sum_{j=1}^N f(\xi_j) \Delta z_j \longrightarrow \int_{\Gamma} f(z) dz; \quad \Delta z_j = z_j - z_{j-1}, \quad \Gamma : z = z(t), \quad dz = z'(t)dt, \quad t \in [t_0, t_1]$$

Тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{t_0}^{t_1} f(z(t)) z'(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} [(u'_x - v'_y) + i(v'_x + u'_y)] dt = \int_{\Gamma} u dx - v dy + i \int_{\Gamma} v dx + u dy$$

Среди интегралов в комплексном анализе важное место в теории и практике интегрирования и приложениях занимает интеграл вида $\int_{\Gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$, зависящий от ζ .

В частности, полагая $f(z)$ аналитической в замкнутой области γ , получаем, что для любой точки аналитичности функция может быть записана в виде интеграла

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Аналитическая функция имеет производные любого порядка, для которых справедлива формула

$$f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{k+1}} d\zeta.$$

Теперь дадим определение ряда Лорана необходимого для последующего повествования

Определение 2.1. Ряд

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (2.1)$$

называется рядом Лорана функции $f(z)$, если его коэффициенты вычисляются по формуле

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Замечание 2.1. $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - a)^n$ – правильная часть ряда Лорана и $\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z - a)^n$ – главная часть ряда Лорана. При этом, ряд Лорана считается сходящимся тогда и только тогда, когда сходятся его правильная и главная части.

Важное место в изучении и применении теории функций комплексного переменного занимает исследование их поведения в особых точках, где нарушается аналитичность функции. В частности, это точки, где функция не определена.

Одной из таких особых точек является полюс.

Определение 2.2. Говорят, что изолированная точка $z_0 \in \overline{C}$ функции $f(z)$ называется полюсом, если $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$.

Замечание 2.2. Номер старшего члена главной части ряда Лорана функции в ее разложении в окрестности полюса называется порядком полюса. Главная часть ряда Лорана в случае полюса порядка k и записывается следующим образом:

а) в случае $z_0 \in \mathbb{C}$ в виде $\sum_{k=-n}^{-1} c_k (z - z_0)^k$, или $\sum_{k=1}^n \frac{c_{-k}}{(z - z_0)^k}$, подробнее:

$$c_n \cdot z^n + c_{n-1} \cdot z^{n-1} + \dots + c_1 \cdot z, \quad c_n \neq 0.$$

б) в случае $z_0 = \infty$ в виде:

$$c_n \cdot z^n + c_{n-1} \cdot z^{n-1} + \dots + c_1 \cdot z, \quad c_n \neq 0.$$

Определение 2.3. Вычетом функции $f(z)$ в изолированной особой точке z_0 ($z_0 \in \overline{C}$) называется интеграл $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} f(z) dz$, где γ – контур, принадлежащий окрестности точки z_0 и охватывающий ее.

Теорема 2.1 (Основная теорема о вычетах). Если функция $f(z)$ – аналитическая в \overline{D} за исключением конечного числа особых точек $z_k \in D$, то справедливо равенство (где C – граница области D):

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z_k} f(z), \quad z_k \in D. \quad (2.2)$$

Утверждение 2.1. Вычет функции в изолированной особой точке равен коэффициенту c_{-1} при первой отрицательной степени в разложении функции в ряд Лорана в окрестности этой точки, т.е. при $\frac{1}{z - z_0}$ для $z_0 \in \mathbb{C}$, и этому коэффициенту, взятому с противоположным знаком, для $z_0 = \infty$:

$$\operatorname{res}_{z_0} f(z) = c_{-1}, \quad z_0 \in \mathbb{C},$$

$$\operatorname{res}_{\infty} f(z) = -c_{-1}, \quad z_0 = \infty.$$

Утверждение 2.2. Если z_0 полюс порядка n функции $f(z)$, $z_0 \in \mathbb{C}$, то

$$\operatorname{res}_{z_0} f(z) = \frac{1}{(n-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [f(z) \cdot (z - z_0)^n], \quad z_0 \in \Pi(n);$$

$$\operatorname{res}_{z_0} f(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z) \cdot (z - z_0)], \quad z_0 \in \Pi(1).$$

2.2 Применение вычетов для вычисления интеграла вида $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda x} R(x)$

Большой интерес представляет возможность применения вычетов для вычисления несобственных интегралов вида $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, где интеграл понимается в смысле главного значения, т.е. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$ (здесь отрезок $[a, b] = [-R, R]$).

Будем рассматривать функцию $f(x)$, непрерывную на $(-\infty, +\infty)$. Возможность использования вычетов при решении такой задачи основана на том, что отрезок $[-R, R]$ действительной оси рассматривается как часть замкнутого контура C , состоящего из этого отрезка и дуги окружности, а интеграл по контуру записывается в виде суммы:

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz, \text{ где } C_R - \text{дуга окружности } |z| = R, \operatorname{Im} z \geq 0.$$

Несобственный интеграл $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ определяется как предел:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \oint_C f(z) dz - \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz.$$

Интерес, с точки зрения применения вычетов, представляют интегралы $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, где функция $f(x)$ такова, что $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$. Классы таких функций выделяются, и для

всех функций рассматриваемого класса устанавливается формула $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \oint_C f(z) dz$.

Мы же, далее, рассмотрим $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, где $f(x) = R(x)e^{i\lambda x}$ и $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, $m - n \geq 1$ и $Q_m(x) \neq 0$, $x \in \mathbb{R}$, а $R(x)$ принимает действительные значения. Такой интеграл сходится, так как он может быть записан в виде суммы двух сходящихся интегралов:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{i\lambda x} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos \lambda x dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin \lambda x dx.$$

Доказательство возможности применения вычетов к вычислению интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{i\lambda x} dx$ основано на следующем утверждении.

Утверждение 2.3 (Лемма Жордана). Пусть функция $f(z)$ непрерывна в области $D : |z| \geq R_0$, $\operatorname{Im} z \geq -a$ и $\lim_{R \rightarrow \infty} \max_{C_R} |f(z)| = 0$, где C_R – дуга окружности $|z| = R$, $\operatorname{Im} z \geq -a$. Тогда для любого $\lambda > 0$ справедливо равенство

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{i\lambda z} f(z) dz = 0.$$

Для рассматриваемых в данном пункте интегралов $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{i\lambda x} dx$ функция $f(z) = R(z)$ удовлетворяет лемме Жордана. Подводя итог приведенным рассуждениям, запишем следующее утверждение.

Утверждение 2.4. Пусть $R(x)$ – рациональная функция, не имеющая особых точек на действительной оси (т.е. $Q(x) \neq 0$ для $x \in \mathbb{R}$), для которой точка $z = \infty$ – нуль порядка не ниже первого (т.е. $m - n \geq 1$). Тогда справедливы формулы:

1. при $\lambda > 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{i\lambda x} dx = 2i\pi \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} [R(z)e^{i\lambda z}], \quad \operatorname{Im} z_k > 0;$$

2. при $\lambda < 0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} R(x)e^{i\lambda x} dx = -2i\pi \sum_{k=1}^n \operatorname{res}_{z=z_k} [R(z)e^{i\lambda z}], \quad \operatorname{Im} z_k < 0;$$

2.3 Ряды и преобразование Фурье

Пусть $f(t)$ – периодическая с периодом $T = 2\pi$, $t \in [-\pi, \pi]$.

$$f(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos kt + b_k \sin kt],$$

где

$$a_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(kt) dt, \quad k = 0, 1, \dots,$$

$$b_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(kt) dt, \quad k = 1, 2, \dots$$

Запишем ряд в наших обозначениях

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{ikt}, \quad c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt, \quad c_0 = a_0, \quad c_k = a_k + ib_k,$$

$$c_k e^{ikt} + c_{-k} e^{-ikt} = [a_k - ib_k][\cos kt + i \sin kt] + [a_k + ib_k][\cos kt - i \sin kt] = 2a_k \cos kt + 2b_k \sin kt.$$

Далее, сделаем небольшую замену

$$f(t) \longrightarrow f(s), \quad s \in [-T/2, T/2], \quad t = \frac{2\pi s}{T} \Rightarrow f\left(\frac{Tt}{2\pi}\right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ikt}.$$

Тогда

$$f(s) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{\frac{2\pi i s}{T}}, \quad c_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(s) e^{-\frac{2\pi i s k}{T}} ds.$$

Пусть теперь

$$f_T(t) = f(t), \text{ но продолженное по периоду } t \in [-T/2, T/2], \quad f(t) \in (\infty, +\infty).$$

$$f_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_{k,T} e^{\frac{2\pi i k t}{T}}, \quad c_{k,T} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-\frac{2\pi i k t}{T}} ds.$$

Пусть $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $\Delta \lambda > 0$ и $k : \lambda \leq \frac{2\pi k}{T} < \lambda + \Delta \lambda \Rightarrow \frac{T\lambda}{2\pi} \leq k < \frac{T\lambda}{2\pi} + \frac{T\Delta\lambda}{2\pi}$, значит

$$k \approx \frac{T\Delta\lambda}{2\pi}, \quad c_{k,T} \approx c_{\lambda,T} = \frac{1}{T} \underbrace{\int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i\lambda t} dt}_{=F_T(\lambda)}$$

В итоге получим

$$f_T(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{F_T(\lambda)}{T} e^{\frac{2\pi i k t}{T}} \approx \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{F_T(\lambda)}{T} e^{-\lambda t} \frac{T}{2\pi} \Delta \lambda \xrightarrow{\Delta \lambda \rightarrow 0} \xrightarrow{\Delta \lambda \rightarrow 0} \boxed{\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda = f(t)} - \text{обратное преобразование Фурье}$$

$$\boxed{F_T(\lambda) \xrightarrow{T \rightarrow \infty} F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt} - \text{прямое преобразование Фурье}$$

Другие формы преобразования Фурье, встречающиеся в литературе

$$F(\lambda) = \frac{1}{g} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega \lambda t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{h} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda) e^{i\omega \lambda t} d\lambda, \quad gh = \frac{2\pi}{|\omega|}$$

1. $\omega = \pm 1; \quad g = 1, \quad h = 2\pi.$
2. $\omega = \pm 2\pi; \quad g = h = 1.$
3. $\omega = \pm 1; \quad g = h = \sqrt{2\pi}.$

2.4 Примеры

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\lambda t} dt \text{— прямое преобразование}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda)e^{i\lambda t} dt \text{— обратное преобразование}$$

Рассмотрим примеры.

Пример 2.1. Пусть $f(t) = e^{-\beta t^2}, \beta > 0, \beta \neq 0, \frac{i\lambda t}{\beta} = \frac{2i\lambda t}{2i\beta} = 2(\frac{i\lambda}{2\beta})t$, тогда

$$\begin{aligned} F(\lambda) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta t^2} e^{-i\lambda t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta(t+\frac{i\lambda}{2\beta})^2 - \frac{\lambda^2}{4\beta}} dt = \left\{ s = t + \frac{i\lambda}{2\beta} \right\} = \int_{\frac{i\lambda}{2\beta}-\infty}^{\frac{i\lambda}{2\beta}+\infty} e^{-\beta s^2} ds \cdot e^{-\frac{\lambda^2}{4\beta}} = \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} \cdot e^{-\frac{\lambda^2}{4\beta}} \left(\int_{-R+\frac{i\lambda}{2\beta}}^{-R} (...) ds + \int_{-R}^R (...) ds + \int_R^{R+\frac{i\lambda}{2\beta}} (...) ds \right) = \\ &= \left\{ \left| \int_R^{R+\frac{i\lambda}{2\beta}} e^{-\beta s^2} ds \right| = \left| \int_0^{\frac{\lambda}{2\beta}} e^{-\beta(R^2 - y^2 + 2iyR)} i dy \right| \leq \int_0^{\frac{\lambda}{2\beta}} e^{-\beta(R^2 - y^2)} dy \leq \frac{\lambda}{2\beta} e^{\beta(\frac{\lambda}{4\beta} - R^2)} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \right\} = \\ &= \lim_{R \rightarrow +\infty} e^{-\frac{\lambda^2}{4\beta}} \int_{-R}^R e^{-\beta s^2} ds = e^{-\frac{\lambda^2}{4\beta}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta s^2} ds = e^{-\frac{\lambda^2}{4\beta}} \sqrt{\frac{\pi}{\beta}} \end{aligned}$$

Пример 2.2. Пусть $f(t) = e^{-\beta|t|}, \beta > 0$, тогда

$$\begin{aligned} F(\lambda) &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta|t|} e^{-i\lambda t} dt = \int_{-\infty}^0 e^{t(\beta-i\lambda)} dt + \int_0^{+\infty} e^{t(-\beta-i\lambda)} dt = \\ &= \frac{e^{t(\beta-i\lambda)}}{(\beta-i\lambda)} \Big|_{-\infty}^0 + \frac{e^{t(-\beta-i\lambda)}}{-\beta-i\lambda} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\beta-i\lambda} - 0 + 0 + \frac{1}{\beta-i\lambda} = \frac{2\beta}{\beta^2+\lambda^2} e^{-\beta|t|} \leftrightarrow \frac{2\beta}{\beta^2+\lambda^2} \end{aligned}$$

Таким образом, получили, что $e^{-\beta|t|} \leftrightarrow \frac{2\beta}{\beta^2+\lambda^2}$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\lambda e^{i\lambda t}}{1+\lambda^2} = \pi e^{-|t|} \implies$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{1+\lambda^2} e^{i\lambda t} d\lambda = e^{-|t|} \quad \text{— обратное преобразование Фурье}$$

3 Свойства преобразования Фурье

В этом разделе мы опишем основные свойства преобразования Фурье и докажем наиболее интересные из них. Прежде всего, напомним внешний вид преобразования:

$$F[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-i\lambda t} dt,$$

где $f \in L_1(-\infty, +\infty)$, то есть функция f интегрируема по Риману (Лебегу) на всей числовой прямой и выполнено условие

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty.$$

Замечание 3.1. Принадлежность функции f классу L_1 гарантирует существование ее преобразования Фурье $F[f]$.

Для начала выпишем свойства, которые напрямую следуют из определения: линейность, масштабируемость и сдвиг. Мы не будем долго на них останавливаться.

1. Линейность.

$$F[\alpha f_1 + \beta f_2] = \alpha F[f_1] + \beta F[f_2], \quad \forall f_1, f_2 \in L_1, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. Сдвиг.

$$\begin{aligned} F[f(t - t_0)] &= e^{-i\lambda t_0} \cdot F[f], \\ F[e^{i\lambda_0 t} \cdot f(t)] &= F[f] \cdot (\lambda - \lambda_0). \end{aligned}$$

3. Масштабируемость.

$$F[f(\alpha t)](\lambda) = \frac{1}{|\alpha|} F[f(t)]\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right), \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0.$$

4. **О четности.** Если функция f является четной, то ее образ $F[f]$ будет действительной функцией.

5. **О нечетности.** Если же f — нечетная, то образ $F[f]$ будет чисто мнимой функцией.

Теперь перейдем к более интересным свойствам. Далее каждая теорема, следствие или замечание будут являться свойствами преобразования Фурье. Большая часть из них будет доказана. Для удобства навигации наиболее важные формулы пронумерованы.

Теорема 3.1. Рассмотрим последовательность функций из класса L_1 , стремящуюся по норме L_1 к некоторой функции f из того же класса, то есть

$$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}, f_n \in L_1(-\infty, +\infty) \quad : \quad f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L_1} f \in L_1.$$

Тогда

$$F[f_n] \Rightarrow F[f].$$

Д о к а з а т е л ь с т в о. Приведем несложные выкладки:

$$\begin{aligned} \sup_{\lambda} |F[f_m](\lambda) - F[f_n](\lambda)| &= \\ &= \sup_{\lambda} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} (f_m(t) - f_n(t)) e^{-i\lambda t} dt \right| \leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f_m(t) - f_n(t)| dt < \varepsilon. \end{aligned}$$

■

Теорема 3.2. Преобразование Фурье $F[f]$ есть непрерывная ограниченная функция.

Д о к а з а т е л ь с т в о. На самом деле ограниченность мы нечаянно вывели в предыдущей теореме. Действительно,

$$|F[f](\lambda)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt = \text{const}.$$

С непрерывностью дела обстоят куда сложнее. Здесь нам придется записать наше преобразование в виде

$$F[f](\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(\lambda t) dt - i \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(\lambda t) dt$$

и сослаться на книгу А. М. Тер-Крикорова, М. И. Шабунина «Курс математического анализа,» где на 645 странице доказана непрерывность каждого из кусочков. ■

Замечание 3.2. Из последней теоремы следует, например, что

$$F[f](\lambda) \xrightarrow{|\lambda| \rightarrow \infty} 0.$$

Теперь рассмотрим специальный вид функций, который часто встречается на практике: непрерывные и дифференцируемые функции.

Теорема 3.3. Пусть функция f непрерывно дифференцируема, абсолютно интегрируема, и ее производная так же абсолютно интегрируема, то есть¹

$$f \in C^1(-\infty, +\infty) \cap L_1(-\infty, +\infty), f' \in L_1(-\infty, +\infty)$$

Тогда

$$F[f'](\lambda) = i\lambda \cdot F[f](\lambda).$$

¹Теорема ходит в интернете в нескольких вариантах условий: совершенно не понятно, f или f' должна быть непрерывной или интегрируемой. Причем доказательства везде примерно одинаковые. Здесь приведен вариант к.ф.-м.н. доцента И. В. Рублева.

Д о к а з а т е л ь с т в о. Представим функцию в виде

$$f(t) = f(0) + \int_0^t f'(t) dt.$$

Из сходимости интеграла $\int_0^{+\infty} f'(t) dt$ следует существование пределов $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$ и $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t)$. Они не могут быть отличными от нуля в силу сходимости интеграла $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt$. С помощью интегрирования по частям получаем

$$\begin{aligned} F[f'](\lambda) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f'(t) e^{-i\lambda t} dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} f(t) e^{-i\lambda t} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \frac{i\lambda}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt = i\lambda \cdot F[f](\lambda). \end{aligned}$$

■

Замечание 3.3. Как следствие, получаем более занятную формулу:

Пусть $f \in C^{k-1}(-\infty, +\infty)$, $\exists f^{(k)} : f^{(k)} \in L_1(-\infty, +\infty)$, тогда

$$F[f^{(k)}](\lambda) = (i\lambda)^k \cdot F[f]. \quad (3.1)$$

Теорема 3.4. Пусть функция f непрерывно дифференцируема, абсолютно интегрируема, и ее производная так же абсолютно интегрируема, то есть

$$f \in C^1(-\infty, +\infty) \cap L_1(-\infty, +\infty), \quad f' \in L_1(-\infty, +\infty)$$

Тогда

$$|F[f](\lambda)| \leq \frac{C}{|\lambda|}.$$

Д о к а з а т е л ь с т в о.

$$\left| \int_{-T}^{+T} f(t) e^{-i\lambda t} dt \right| = \frac{f(t) e^{-i\lambda t}}{-i\lambda} \Big|_{-T}^{+T} + \frac{1}{\lambda} \int_{-T}^{+T} f(t) e^{-i\lambda t} dt.$$

■

Замечание 3.4. Как следствие, получаем более занятную формулу:

Пусть $f \in C^{k-1}(-\infty, +\infty)$, $\exists f^{(k)} : f^{(k)} \in L_1(-\infty, +\infty)$, тогда

$$F[f](\lambda) \leq \frac{C_m}{|\lambda|^m}, \quad \text{где } C_m = \int_{-\infty}^{+\infty} |f^{(m)}(t)| dt. \quad (3.2)$$

Теорема 3.5. Пусть задана функция f такая, что $\int_{-\infty}^t f(s) ds \in L_1(-\infty, +\infty)$, тогда

$$F \left[\int_{-\infty}^t f(s) ds \right] (\lambda) = \frac{1}{i\lambda} F[f](\lambda).$$

Теорема 3.6. Пусть задана функция f такая, что $t \cdot f(t) \in L_1(-\infty, +\infty)$, тогда

$$F[f]'(\lambda) = F[-it \cdot f(t)](\lambda).$$

Д о к а з а т е л ь с т в о.

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt \right)'_{\lambda} = \int_{-\infty}^{+\infty} (-it) f(t) e^{-i\lambda t} dt.$$

■

Замечание 3.5. Как следствие:

Пусть $f : t^p f(t) \in L_1(-\infty, +\infty)$, $p = \overline{1, k}$, тогда

$$F[f]^{(k)}(\lambda) = F[(-it)^k \cdot f(t)]. \quad (3.3)$$

Теорема 3.7. Пусть $t^p f(t) \in L_1(-\infty, +\infty) \forall p$, тогда

$$F \left[-\frac{1}{it} f(t) \right] (\lambda) = \int_{-\infty}^{\lambda} F[f](\xi) d\xi. \quad (3.4)$$

Теперь поговорим о свойствах преобразования Фурье, связанных с операцией свертки. Напомним, как выглядит эта операция:

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(s) f_2(t-s) ds.$$

Эта операция является билинейной, коммутативной и ассоциативной.

Теорема 3.8. Пусть $f_1, f_2 \in L_1$, тогда

$$F[f_1 * f_2](\lambda) = F[f_1](\lambda) \cdot F[f_2](\lambda). \quad (3.5)$$

Д о к а з а т е л ь с т в о.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(s) f_2(t-s) e^{-i\lambda t} ds dt &= \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(s) e^{-i\lambda s} \left(f_2(t-s) e^{-i\lambda(t-s)} \right) ds dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(s) e^{-i\lambda s} ds \cdot F[f_2](\lambda) = F[f_1](\lambda) \cdot F[f_2](\lambda). \end{aligned}$$

■

Замечание 3.6. Аналогично доказывается и такой факт:

$$\begin{aligned} \text{Если } F[f_1], F[f_2] \in L_1(-\infty, +\infty), \text{ то} \\ F[f_1 \cdot f_2](\lambda) = 2\pi \cdot (F[f_1] * F[f_2])(\lambda). \end{aligned} \quad (3.6)$$

$$\begin{aligned}
d_{\Delta t}(t) &\leftrightarrow \frac{2\pi}{\Delta t} d_{\frac{2\pi}{\Delta t}}(\lambda) \\
f(t) &\leftrightarrow F(\lambda) \\
f_{\Delta t}(t) = f(t) \cdot d_{\Delta t}(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k\Delta t) \delta(t - k\Delta t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} (F * \frac{2\pi}{\Delta t} d_{\frac{2\pi}{\Delta t}})(\lambda) = \\
&= \frac{1}{\Delta t} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} F(\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t}) = \frac{1}{\Delta t} F_{\frac{2\pi}{\Delta t}}^0(\lambda) \cdot \Delta t H_{\frac{\Delta}{2}}(\lambda)
\end{aligned}$$


Пусть $\exists \Lambda > 0 : F(\lambda) \equiv 0, |\lambda| > \frac{\Lambda}{2}$ — ограниченный спектр, $\Rightarrow \frac{\pi}{\Delta t} \geq \frac{\Lambda}{2}$ не происходит наложение спектра. $\Delta t = \frac{2\pi}{\Lambda}$ — частота Найквиста.

$F(\lambda) = F_{\frac{2\pi}{\Delta t}}^0(\lambda) \cdot H_{\frac{\Delta}{2}}(\lambda)$, где $H_{\frac{\Delta}{2}}(\lambda)$ — оконная функция:

$$\begin{aligned}
H_{\frac{\Delta}{2}}(\lambda) &= \begin{cases} 1, & |\lambda| \leq \frac{\Lambda}{2} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\
g(t) &= \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{\Delta}{2} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \\
&\leftrightarrow 2 \frac{\sin(\lambda \Delta)}{\lambda} = G(\lambda) \\
h_{\frac{\Delta}{2}}(t) &= \frac{1}{\pi} \frac{\sin(\frac{\Lambda}{2} t)}{t} \leftrightarrow H_{\frac{\Delta}{2}}(\lambda) \\
\Delta t(f_{\Delta t} + h_{\frac{\Delta}{2}}) &\leftrightarrow f(\lambda)
\end{aligned}$$

Интерполяционная формула Котельникова:


$$\Delta t \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k\Delta t) \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - s - k\Delta t) \cdot h_{\frac{\Delta}{2}}(s) ds = \frac{\Delta t}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k\Delta t) \frac{\frac{\Lambda}{2} \sin(t - k\Delta t)}{t - k\Delta t}$$



$$h_{\frac{T}{2}}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{T}{2} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$H_{\frac{T}{2}}(\lambda) = \frac{2}{\lambda} \sin\left(\frac{T\lambda}{2}\right)$$

Пример Ряби:



Введем функцию:

$$\begin{aligned} \tilde{F} &= F * d_{\frac{2\pi}{\Delta t}}; \quad \frac{T}{2\pi} (\tilde{F} * \text{sync}(\frac{T}{2} \cdot))(\lambda) = \frac{T}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \tilde{F}(t-s) \frac{\sin(\frac{T}{2}s)}{\frac{T}{2}s} ds = \\ &= \frac{T}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} F(t-s-k\Delta t) \frac{\sin(\frac{T}{2}s)}{\frac{T}{2}s} ds \quad (3.7) \end{aligned}$$


Если T достаточно большое:

$$W_T(s) = \frac{T}{2\pi} \frac{\sin(\frac{T}{2}\lambda)}{\frac{T}{2}\lambda} \xrightarrow[T \rightarrow \infty]{\text{с.л.}} \delta(\lambda)$$

Теперь введем функцию $\tilde{\tilde{F}}$:

$$\tilde{\tilde{F}}(\lambda) = \frac{T}{2\pi} (\tilde{F} + \text{sync}(\frac{T}{2} \cdot))(\lambda)$$

Дискретизация $\tilde{\tilde{F}}$



$$\left(f(\cdot) d_{\Delta t}(\cdot) h_{\frac{T}{2}}(\cdot) * d_{\Delta_0} \right)(t) \quad \frac{2\pi}{\Delta t \Delta_0} \tilde{\tilde{F}}(\lambda) \cdot d_{\frac{2\pi}{\Delta_0}}(\lambda)$$

$$\tilde{f}_{\Delta t}(t) = \tilde{f}(t) d_{\Delta t}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k\Delta t) \delta(t - k\Delta t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \tilde{F} * \frac{2\pi}{\Delta t} d_{\frac{2\pi}{\Delta t}} = \frac{1}{\Delta t} \tilde{F} * d_{\frac{2\pi}{\Delta t}}$$

$$\widetilde{h_{\Delta_0}}(t) = \begin{cases} 1, t \in [-\frac{\Delta_0}{2}, \Delta_0 - \frac{\Delta_0}{2}] \\ 0, \text{иначе} \end{cases}$$

$$h_{\Delta_0}(t) = \begin{cases} 1, |t| \leq \frac{\Delta_0}{2} \\ 0, \text{иначе} \end{cases}$$

$$\widetilde{h_{\Delta_0}}(t) = h_{\Delta_0}(t - \frac{\Delta_0 + \Delta t}{2})$$

$$h_{\Delta_0}(t) \leftrightarrow \frac{2}{\lambda} \sin(\frac{\Delta_0 \lambda}{2})$$

$$\widetilde{H_{\Delta_0}}(\lambda) = e^{-\frac{i(\Delta_0 + \Delta t)\lambda}{2}}$$

$$\begin{aligned} \widetilde{f_{\Delta t}}(t) \widetilde{h_{\Delta_0}}(t) &\leftrightarrow \frac{1}{\Delta t} \widetilde{F_{\frac{2\pi}{\Delta t}}} * \frac{1}{2\pi \lambda} \sin(\frac{\Delta_0 \lambda}{2}) \cdot e^{-\frac{i(\Delta_0 + \Delta t)\lambda}{2}} = \\ &= \frac{1}{\Delta t} \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \tilde{F}(\lambda - \mu - \frac{2\pi l}{\Delta t}) e^{-\frac{i(\Delta_0 + \Delta t)\mu}{2}} \frac{1}{2\pi \mu} \sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2}) d\mu \end{aligned}$$

$$\tilde{f}_{\Delta t}(t) \tilde{h}_{\Delta_0}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{f}(k\Delta t) \delta(t - k\Delta t)$$

$$\tilde{\tilde{f}}(t) = ((\tilde{f}_{\Delta t} \cdot \tilde{h}_{\Delta_0}) * d_{\Delta_0})(t) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \tilde{f}(k\Delta t) \delta(t - k\Delta t - m\Delta_0)$$

$$\frac{1}{\Delta t} \frac{2\pi}{\Delta_0} \tilde{\tilde{F}} d_{\frac{2\pi}{\Delta_0}}(\lambda) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \delta(\lambda - \frac{2\pi}{\Delta_0} n)$$

$$\tilde{f}(t_k) : \tilde{f}_0, \dots, \tilde{f}_{N-1} \rightarrow \alpha_0, \dots, \alpha_{N-1} \dots ?$$

Найдем формулу:

$$\tilde{\tilde{f}}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n \delta(\lambda - \frac{2\pi n}{\Delta_0}) \right) e^{i\lambda t} d\lambda = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \alpha_n e^{\frac{2\pi i n t}{\Delta_0}}$$

$$\frac{1}{2\pi}\alpha_n = \frac{1}{\Delta_0} \int_{-\frac{\Delta t}{2}}^{\Delta_0 - \frac{\Delta t}{2}} \tilde{f}(t) e^{-i\lambda t} dt$$

$$\alpha_n = \frac{2\pi}{\Delta_0} \int_{-\frac{\Delta t}{2}}^{\Delta_0 - \frac{\Delta t}{2}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{f}(k\Delta t) \delta(t - k\Delta t - m\Delta_0) e^{-\frac{2\pi i n t}{\Delta_0}} dt$$

Ненулевое только при $m = 0$

$$m \geq 1; \quad t - k\Delta t - m\Delta_0 \leq \Delta_0 - \frac{\Delta t}{2} - \Delta_0 < 0$$

$$m \leq -1; \quad t - k\Delta t - m\Delta_0 \geq -\frac{\Delta t}{2} - N\Delta t + \Delta t + \Delta_0 \geq \frac{\Delta t}{2} > 0 \Rightarrow$$

При $m \neq 0$ нулевые слагаемые.

$$\alpha_n = \frac{2\pi}{\Delta_0} \int_{-\frac{\Delta t}{2}}^{\Delta_0 - \frac{\Delta t}{2}} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{f}(k\Delta t) \delta(t - k\Delta t - m\Delta_0) e^{-i\lambda t} dt = \frac{2\pi}{\Delta_0} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{f}(k\Delta t) e^{-\frac{2\pi i n k}{N}}$$

$$\left\{ \frac{\Delta t}{\Delta_0} = \frac{1}{N} \right\}$$

$$\alpha_n \approx \frac{2\pi}{\Delta_0 \Delta t} \tilde{F}(\lambda_n); \quad \lambda_n = \frac{2\pi n}{\Delta_0}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

$$\tilde{F}(\lambda_n) = \tilde{F}_n \approx \Delta t \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{f}_k e^{\frac{2\pi i n k}{N}}$$

ПДПФ:

$$F_n = \sum_{k=0}^{N-1} f_k e^{-\frac{2\pi i n k}{N}}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

ОДПФ:

$$f_k = \sum_{n=0}^{N-1} F_n e^{\frac{2\pi i n k}{N}}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$\tilde{F}(\lambda_n) = \tilde{F}_n, \quad n = 0, \dots, \left[\frac{N}{2}\right]; \quad \tilde{F}\left(-\frac{2\pi}{\Delta_0}\right) = \tilde{F}_{N-1}; \quad \tilde{F}\left(\frac{2\pi n}{\Delta_0}\right) \approx \tilde{F}_n \pmod{N}$$

$$F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt \approx \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k\Delta t) e^{-i\lambda k\Delta t} \Delta t$$

$$\lambda = \frac{2\pi n}{\Delta_0}; \quad F\left(\frac{2\pi n}{\Delta_0}\right) \approx \Delta t \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f(k\Delta t) e^{-\frac{2\pi i n k \Delta t}{\Delta_0}} = \Delta t \sum_{k=0}^{N-1} f(k\Delta t) e^{-\frac{2\pi i n k}{N}}$$

4 Оценка погрешности

4.1 Эффект наложения спектров

Пусть:

$$f \in C^2(-\infty, +\infty)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < \infty; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |f'(t)| dt < \infty; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |f''(t)| dt \leq c < \infty \quad (4.1)$$

$$f''(t) \leftrightarrow (i\lambda)^2 F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f''(t) e^{-i\lambda t} dt; \quad \lambda^2 |F(\lambda)| \leq c; \quad \lambda \neq 0; \quad |F(\lambda)| \leq \frac{c}{\lambda^2}$$

$$f_{\Delta t}(t) \leftrightarrow \frac{1}{\Delta t} \sum_{l=-\infty}^{+\infty} F(\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t}) = \frac{1}{\Delta t} (F(\lambda) + \sum_{l \neq 0} F(\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t}))$$

$$\sum_{l \neq 0} F(\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t}) \quad \text{-- ошибка наложения спектра.}$$

$$|\sum_{l \neq 0} F(\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t})| \leq \sum_{l \neq 0} \frac{c}{(\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t})^2} \leq \{(*)\} \leq \frac{2c(\Delta t)^2}{\pi^2} \sum_{l=1}^{+\infty} \frac{1}{(2l-1)^2} < \varepsilon$$

$$(*) \quad l > 0; \quad |\lambda - \frac{2\pi l}{\Delta t}| \geq \frac{2\pi l}{\Delta t} - |\lambda| \geq \frac{2\pi l}{\Delta t} - \frac{\Lambda}{2} > \{\frac{\Lambda}{2} < \frac{\pi}{\Delta t}\} > \frac{\pi}{\Delta t} (2l-1)$$

4.2 Рябь ($\Delta_0 > 0$)

$$h_{\Delta_0}(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq \frac{\Delta_0}{2} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(t) \cdot h_{\Delta_0}(t) &\leftrightarrow \frac{1}{2\pi} F * H_{\Delta_0}(\lambda) = \{H_{\Delta_0}(\lambda) = \frac{2}{\lambda} \sin(\frac{\Delta_0 \lambda}{2})\} = (F * \frac{1}{\pi \lambda} \sin(\frac{\Delta_0 \lambda}{2}))(\lambda) = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} F(\lambda - \mu) \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu \end{aligned}$$

$$F(\lambda) = F(\lambda) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu$$

$$h_{\Delta_0}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2}{\mu} \sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2}) e^{-i\mu t} d\mu$$

4.3 Ошибка ряби

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} [F(\lambda - \mu) - F(\lambda)] \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu$$

1. F непрерывна при $\lambda = \lambda_0$

2. Пусть $F(\lambda_0 \pm 0)$; $F(\lambda_0 - 0) \neq F(\lambda_0 + 0)$

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} [F(\lambda - \mu) - F(\lambda)] \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu$$

а). F непрерывна по λ ; $\Lambda > 0$; $|\lambda| \leq \frac{\Lambda}{2}$

$$f(\cdot) : \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt \leq c_0 < +\infty \\ \int_{-\infty}^{+\infty} |tf(t)| dt \leq c_1 < \infty \\ \int_{-\infty}^{+\infty} |tf'(t)| dt \leq \tilde{c}_1 < \infty \end{cases}$$

$\varepsilon > 0$ Задача: найти ограничение на Δ_0 :

$$|I| \leq \varepsilon; \delta = \frac{\varepsilon \pi}{6c_1} > 0$$

$$I = \int_{-\delta}^{\delta} [F(\lambda - \mu) - F(\lambda)] \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu + \int_{|\mu| \geq \delta} F(\lambda - \mu) \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu - \\ - \int_{|\mu| \geq \delta} F(\lambda) \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi \mu} d\mu \quad (4.2)$$

$$1). |I_1| \leq \int_{-\delta}^{\delta} |F(\lambda - \mu) - F(\lambda)| \frac{|\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})|}{|\pi \mu|} d\mu \leq \frac{c_1}{\pi} \int_{-\delta}^{\delta} |\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})| d\mu \leq \frac{2\delta c_1}{\pi} = \frac{\varepsilon}{3}$$

$$\{F(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\lambda t} dt; F'(\lambda) = \int_{-\infty}^{+\infty} (-it) f(t) e^{-i\lambda t} dt\}$$

$$\Rightarrow F'(\lambda) \leq c_1 \Rightarrow |F(\lambda - \mu) - F(\lambda)| \leq c_1 |\mu|$$

$$|\mu| \geq \delta; \left| \frac{F(\lambda - \mu)}{\pi \mu} \right| \leq \frac{c_0}{\pi \delta} = \alpha_0$$

$$(-it)f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F'(\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda \cdot \frac{d}{dt}$$

$$-i(f(t) + tf'(t)) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F'(\lambda) (i\lambda) e^{i\lambda t} d\lambda$$

$$(i\lambda)F'(\lambda) = i \int_{-\infty}^{+\infty} [f(t) + tf'(t)] e^{-i\lambda t} dt$$

$$|\lambda| |F'(\lambda)| \leq c_0 + \tilde{c}_1; \left| \frac{F(\lambda - \mu)}{\mu \pi} \right| \leq \alpha_0$$

$$\left| \frac{F'(\lambda - \mu)}{\mu \pi} \right| \leq \frac{c_0 + \tilde{c}_1}{\pi |\mu| |\lambda - \mu|} = \frac{c_0 + \tilde{c}_1}{\pi |\mu| (|\mu| - |\lambda|)} \leq (**) \leq \frac{c_0 + \tilde{c}_1}{\pi (\mu^2 - |\mu| \frac{\Lambda}{2})} \leq \frac{2(c_0 + \tilde{c}_1)}{\pi \mu^2}$$

$$(**) \quad |\mu| - \frac{\Lambda}{2} \leq |\mu| - |\lambda| \leq (\mu - \lambda);$$

$$|\mu| \geq \max(\delta, \Lambda); \frac{\mu^2}{2} \leq \mu^2 - |\mu| \frac{\Lambda}{2} \Leftrightarrow \frac{\mu^2}{2} - |\mu| \frac{\Lambda}{2} = |\mu| (|\mu| - \Lambda) > 0$$

$$\begin{aligned}
& \left| \frac{d}{d\mu} \left[\frac{F(\lambda - \mu)}{\pi\mu} \right] \right| = \frac{1}{\pi} \left| - \frac{F'(\lambda - \mu)\mu - F(\lambda - \mu)}{\mu^2} \right| = \frac{1}{\pi} \left[\frac{F'(\lambda - \mu)}{\mu} + \frac{F(\lambda - \mu)}{\mu^2} \right] \leq \\
& \leq \frac{2(c_0 + \tilde{c}_1)}{\pi\mu^2} + \frac{c_0}{\pi\mu^2} = \frac{3c_0 + 2\tilde{c}_1}{\pi} \frac{1}{\mu^2} = \frac{\tilde{\alpha}_1}{\mu^2} \cdot 2). R > 0; R > \Lambda > 0 \\
& I_2^R = \int_{R \geq |\mu| \geq \delta} F(\lambda - \mu) \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\pi\mu} d\mu = -\frac{2}{\Delta_0} \int_{R \geq |\mu| \geq \delta} \frac{F(\lambda - \mu)}{\pi\mu} d(\cos(\frac{\Delta_0 \mu}{2})) = \\
& = \frac{2}{\Delta_0} \left(- \left[\frac{F(\lambda - \mu)}{\pi\mu} \cos(\frac{\Delta_0 \mu}{2}) \right]_{\mu=-R}^{-\delta} + - \left[- \right]_{\mu=\delta}^R + \int_{R \geq |\mu| \geq \delta} \frac{d}{d\mu} \left[\frac{F(\lambda - \mu)}{\pi\mu} \right] \cos(\frac{\Delta_0 \mu}{2}) d\mu \right) \\
& |I_2^R| \leq \frac{2}{\Delta_0} [4\alpha_0 + \left| \int_{R \geq |\mu| \geq \Lambda} \frac{d}{d\mu} [\dots] \cos(\dots) d\mu \right| + \left| \int_{\Lambda \geq |\mu| \geq \delta} \frac{d}{d\mu} [\dots] \cos(\dots) d\mu \right|] \leq \\
& \leq \frac{2}{\Delta_0} [4\alpha_0 + \tilde{\alpha}_1 \int_{R \geq |\mu| \geq \Lambda} \frac{d\mu}{\mu^2} + \left| \int_{\Lambda \geq |\mu| \geq \delta} \dots \right|] \\
& \int_{-R}^{-\Lambda} \frac{d\mu}{\mu^2} = \frac{1}{\Lambda} - \frac{1}{R} \leq \frac{1}{\Lambda}; \quad \int_{\Lambda}^R \frac{d\mu}{\mu^2} = \frac{1}{\Lambda} - \frac{1}{R} \leq \frac{1}{\Lambda} \\
& \Rightarrow |I_2^R| \leq \frac{2}{\Delta_0} [4\alpha_0 + \frac{2\tilde{\alpha}_1}{\Lambda} + \left| \int_{\Lambda \geq |\mu| \geq \delta} \dots d\mu \right|]
\end{aligned}$$

При $\Lambda \geq |\mu| \geq \delta$:

$$\begin{aligned}
& \left| \frac{d}{d\mu} \left[\frac{F(\lambda - \mu)}{\pi\mu} \right] \right| = \frac{1}{\pi} \left| \frac{F'(\lambda - \mu)}{\mu} + \frac{F(\lambda - \mu)}{\mu^2} \right| \leq \frac{1}{\pi} \left[\frac{c_1}{\delta} + \frac{c_0}{\delta^2} \right] = \alpha_1 \\
& \Rightarrow \left| \int_{\Lambda \geq |\mu| \geq \delta} \frac{d}{d\mu} (\dots) \cos(\dots) d\mu \right| \leq 2\Lambda\alpha_1 \Rightarrow |I_2^R| \leq \frac{2}{\Delta_0} [4\alpha_0 + \frac{2\tilde{\alpha}_1}{\Lambda} + 2\Lambda\alpha_1] \\
& R \rightarrow \infty \quad |I_2| \leq \frac{1}{\Delta_0} [8\alpha_0 + \frac{4\tilde{\alpha}_1}{\Lambda} + 4\Lambda\alpha_1] \leq \frac{\varepsilon}{3} \\
& 3). |I_3| \leq \frac{|F(\lambda)|}{\pi} \left| \int_{\mu \geq \delta} \frac{\sin(\frac{\Delta_0 \mu}{2})}{\mu} d\mu \right| \leq \{\mu = \frac{2\psi}{\Delta_0}; d\mu = \frac{2}{\Delta_0} d\psi\} \leq \frac{2c_0}{\pi} \left| \int_{\frac{\Delta_0 \delta}{2}}^{+\infty} \frac{\sin(\psi)}{\psi} d\psi \right|
\end{aligned}$$

Пусть $\frac{\Delta_0 \delta}{2} = 2\pi k_0$, $k_0 \in \mathbb{N}$; $\Delta_0 = \frac{4\pi k_0}{\delta}$

$$\begin{aligned}
& \int_{2\pi k_0}^{+\infty} \frac{\sin(\psi)}{\psi} d\psi = \sum_{l=k_0}^{+\infty} \left[\int_{2\pi l}^{\pi+2\pi l} \frac{\sin(\psi)}{\psi} d\psi - \int_{\pi+2\pi l}^{2\pi+2\pi l} \frac{\sin(\psi)}{\psi} d\psi \right] = \\
& = \sum_{k=2k_0}^{+\infty} (-1)^k \sigma_k - \text{ряд Лейбница.}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 0 < \sigma_{k+1} \leq \sigma_k \leq \frac{1}{k}; \quad R_n = \sum_{k=n}^{+\infty} (-1)^k \sigma_k; \quad \sigma_{2k_0} \geq \sigma_{2k_0+1} \geq \sigma_{2k_0+2} \\
& 0 > R_{2k_0-1} = -\sigma_{2k_0-1} + R_{2k_0} \Rightarrow 0 \leq R_{2k_0} \leq \sigma_{2k_0-1} \leq \frac{1}{2k_0-1} \Rightarrow \frac{1}{2k_0-1} \leq \frac{\varepsilon\pi}{6c_0} \\
& 2k_0-1 \geq \frac{6c_0}{\varepsilon\pi} \Leftarrow k_0 \geq \left[\frac{3c_0}{\varepsilon\pi} + 1 \right] \\
& |I_3| \leq \frac{2c_0}{\pi} \int_{2\pi k_0}^{+\infty} \frac{\sin(\psi)}{\psi} d\psi \leq \frac{\varepsilon\pi 2c_0}{6c_0\pi} = \frac{\varepsilon}{3}
\end{aligned}$$

Теорема 4.1. Если $\Delta_0 \geq \max\left\{\frac{4\pi}{\delta} \left[\frac{3c_0}{\varepsilon\pi} + 1 \right], \frac{3}{\varepsilon} [8\alpha_0 + 4\Lambda\alpha_1 + \frac{4\tilde{\alpha}_1}{\Lambda}] \right\}$, то $|I| \leq \varepsilon$.

5 Теоремы о предельных значениях

Теорема 5.1. Пусть f – непрерывно дифференцируема; $f(t) \supset F(p)$. Если существует предел $f(+\infty)$, тогда

$$f(+\infty) = \lim_{p \rightarrow 0} pF(p).$$

Доказательство.

$$f'(t) \supset pF(p) - f(+0)$$

$$\int_0^{+\infty} f'(t)e^{-pt} dt = pF(p) - f(+0)$$

что при p стремящемся к нулю стремится к $f(+\infty) - f(+0)$. ■

Контрпримеры:

$$\cos t \supset \frac{p}{p^2 + 1} \Rightarrow pF(p) = \frac{p^2}{p^2 + 1} \xrightarrow{p \rightarrow 0} 0$$

$$\sin t \supset \frac{1}{p^2 + 1} \Rightarrow pF(p) = \frac{p}{p^2 + 1} \xrightarrow{p \rightarrow 0} 0$$

Однако, мы знаем, что у синуса и косинуса пределов на бесконечности не существует.

Теорема 5.2. Пусть f – непрерывно дифференцируема; $f(t) \supset F(p)$. Если существует предел $f(+0)$, то

$$f(+0) = \lim_{p \rightarrow \infty} pF(p).$$

Доказательство.

$$\int_0^{+\infty} f'(t)e^{-pt} dt = pF(p) - f(+0),$$

здесь левая часть равенства при p стремящемся к бесконечности сходится к нулю. ■

Обратимся к предыдущему примеру:

$$\frac{p^2}{p^2 + 1} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 1 = \cos(0),$$

$$\frac{p}{p^2 + 1} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0 = \sin(0).$$

6 Приложения преобразования Лапласа к исследованию процессов в электрических цепях

Рассмотрим электрическую цепь, включающую в себя индуктивную катушку, сопротивление и конденсатор, рис. 6.1. Обозначим I – ток, E – и $i \supset I, e \supset E$. Переходя к комплексному току $i(t)$, и полагая $i(0) = 0$, можно описать систему следующим образом:

$$U_L = L \frac{di}{dt}, U_R = Ri(t), U_C = \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri(t) + \frac{1}{C} \int_0^t i(t) dt = e(t)$$

$$pLI + RI + \frac{I}{Cp} = E$$

$$(pL + R + \frac{1}{Cp})I = ZI = E$$

Здесь Z – *импеданс* (операторное сопротивление), а $Y = \frac{1}{Z}$ – *адмитанс*.




Рис. 6.1: Электрическая цепь, включающая в себя индуктивную катушку, конденсатор и резистор

Теперь рассмотрим цепь с параллельным соединением, рис. 6.2а. Для цепей с параллельным соединением при импедансах Z_1, Z_2, \dots, Z_k верно:

$$Y_1 = \frac{1}{Z_1}, Y_2 = \frac{1}{Z_2}, \dots, \frac{1}{Z_k}, \quad Y = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_k.$$


$$\begin{aligned} Z &= Z_1 + Z_2 \\ \frac{1}{R} + \frac{1}{\frac{1}{Cp}} &= \frac{1}{Z_2} = Cp + \frac{1}{R} = \frac{CRp + 1}{R} \\ Z_2 &= \frac{R}{CRp + 1}, Z = pL + \frac{R}{CRp + 1} \end{aligned}$$

Можно эту же цепь рассмотреть как двухконтурную, рис. 6.2б, и, опираясь на законы Кирхгофа, получить

$$\begin{cases} pLI_1 + R(I_1 - I_2) = E \\ R(I_2 - I_1) + \frac{1}{Cp}I_2 = 0 \end{cases}$$

$$I_2(R + \frac{1}{Cp}) - RI_1 = 0$$

$$I_2 = \frac{R}{R + \frac{1}{Cp}} I_1$$



(a) Рассматриваем как цепь с параллельным соединением

(b) Рассматриваем как двухконтурную цепь

Рис. 6.2: Цепь с параллельным соединением

$$I_1 - I_2 = \left(1 - \frac{R}{R + \frac{1}{Cp}}\right) I_1 = \frac{1}{CRp + 1} I_1$$

$$I_1 \left(pL + \frac{R}{CRp + 1}\right) = E = I_1 Z$$

В задачах часто рассматривают случаи

- Постоянного тока

$$e = e_0, E = \frac{e_0}{p}$$

- Переменного тока

$$e = e_0 \sin(wt), E = \frac{e_0 w}{p^2 + w^2}$$

Решим конкретную задачу, рис. 6.3:

$$\left(Lp + R + \frac{1}{Cp}\right) I = \frac{e_0}{p}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{e_0}{p} \left(\frac{1}{Lp + R + 1/Cp} \right) = \frac{e_0 C}{CLp^2 + RCp + 1} = \frac{e_0}{L(p + \frac{R}{2L})^2 - \frac{R^2}{4L} + \frac{1}{C}} = \\ &= \left\{ \text{пусть } D = C^2 r^2 - 4CL < 0, \text{ тогда корни будут комплексными} \right\} = \\ &= \frac{e_0/L}{(p + \frac{R}{2L})^2 + (\frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2})} \subset e^{-\frac{R}{2L}t} \frac{e_0}{L} \frac{\sin\left(\sqrt{\left(\frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2}\right)t}\right)}{\sqrt{\frac{1}{CL} - \frac{R^2}{4L^2}}} \end{aligned}$$

Рассмотрим цепь с нагрузкой, рис. 6.4а

$$RI + pL(I - I') + RI + \frac{1}{Cp}I = E$$





Рис. 6.3: Конкретный пример



(a) Цепь с нагрузкой

(b) Можно рассматривать и так

Рис. 6.4: Пример 2

$$pL(I' - I) = -E'$$

$$RI + \frac{1}{Cp}I = E - E'$$

$$\begin{cases} E' = E - RI + \frac{1}{Cp}I \\ I' = I - \frac{E - (R + \frac{1}{Cp})I}{pL} \end{cases}$$

$$\begin{cases} E' = A(p)E + B(p)I \\ I' = C(p)E + D(p)I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E = \tilde{A}(p)E' + \tilde{B}(p)I' \\ I' = \tilde{C}(p)E' + \tilde{D}(p)I' \end{cases}$$

Положим

$$\begin{bmatrix} \tilde{A}(p) & \tilde{B}(p) \\ \tilde{C}(p) & \tilde{D}(p) \end{bmatrix} = \tilde{U}.$$

$$\begin{bmatrix} E \\ I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_0 \\ I_0 \end{bmatrix} = \tilde{U}_1 \begin{bmatrix} E_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \{E_2 = 0\} = \tilde{U}_2 \begin{bmatrix} 0 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

7 Электромеханические аналогии

Рассмотрим Гамильтонову систему, с переменными $q = (q_1, q_2, \dots, q_n)^T$, на которую действуют внешние силы Q . Внешние силы могут быть следующих типов:

1. *Диссипативные*

$$Q = n - B\dot{q}, \quad B = B^T > 0$$

$$\langle \dot{q}, Q \rangle = -\langle \dot{q}, B\dot{q} \rangle < 0$$

К ним относится сила трения. Можно также ввести *функцию Релея* $R = \frac{1}{2} \langle \dot{q}, B\dot{q} \rangle$ и тогда $Q = -\frac{\partial R}{\partial \dot{q}}$.

2. *Гирокопические*

$$Q = \Gamma \dot{q}, \quad \Gamma^T = -\Gamma$$

$$\langle \dot{q}, Q \rangle = \langle \dot{q}, \Gamma \dot{q} \rangle = \langle \Gamma^T \dot{q}, \dot{q} \rangle = \langle \dot{q}, \Gamma \dot{q} \rangle = -\langle \dot{q}, \Gamma \dot{q} \rangle = 0$$

Далее обозначим K – кинетическую энергию системы, Π – потенциальную энергию, $E = K + \Pi$ – полную энергию системы,

$$\dot{q} = K - \Pi, \quad K = \frac{1}{2} \langle \dot{q}, M\dot{q} \rangle, \quad \Pi = \Pi(q),$$

$$\frac{dE}{dt} = \sum_j \langle \dot{q}_j, Q_j \rangle$$

Положим $M = M^T$ и $\frac{\partial K}{\partial \dot{q}} = M\dot{q}$. Запишем уравнение Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = \sum_j Q_j$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial K}{\partial q} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q} + \sum_j Q_j$$

Воспользуемся соотношением $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}} \right) = M\ddot{q}$, и пусть Π имеет вид $\Pi = \Pi(q) = Cq$. Следовательно, получим $M\ddot{q} + B\dot{q} + Cq = Q_{\text{внешние}}$ или в одномерном случае

$$m\ddot{q} + b\dot{q} + cq = Q_{\text{внешние}}. \quad (7.1)$$

Проведем аналогию с уравнением

$$L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau = e.$$

Если мы вспомним, что $i = \frac{dq}{dt}$, то получим представление аналогичное (7.1):

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + R \frac{dq}{dt} + \frac{1}{C} q = e.$$

q	b	m	c	Q	$K = 1/2m\dot{q}^2$	$R = 1/2b\dot{q}^2$	$\Pi = 1/2c\dot{q}^2$
q	L	R	$1/L$	l	$L/2\dot{q}^2$	$R/2\dot{q}^2$	$1/2Ct\dot{q}^2$
U	C	$1/R$	$1/L$	di/dt	–	–	–

Таблица 1: Электромеханические аналогии

Кратко выводы можно описать таблицей 1.

Для цепи, иллюстрирующей сложение токов, изображенной на рисунке 7.1, можно выписать следующие соотношения

$$U = L \frac{di}{dt}, U = Ri, i = \frac{U}{R}, C \frac{dU}{dt} = i, i = \frac{1}{L} \int_0^{t_0} U(\tau) d\tau.$$




Рис. 7.1: Сложение токов

8 Управляемые и наблюдаемые системы

Рассматривается система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + D_1v \\ y = Cx + D_2v. \end{cases} \quad (8.1)$$

Здесь x – *фазовая переменная*, которую мы наблюдаем, u – *управление*, v – *помеха*, причиной появления которой зачастую являются неточность линеаризации или внешние условия. Второе уравнение в данной системе называется *уравнением наблюдения*, и соответственно y – *наблюдением*. Применим преобразование Лапласа, обозначив $x(0) = x^0$, $x \supset X, y \supset Y, v \supset V, u \supset U$.

$$pX - x^0 = AX + BU + D_1V$$

$$(pI - A)X = x^0 + BU + D_1V$$

$$\begin{aligned}
X &= (pI - A)^{-1}x^0 + (pI - A)^{-1}BU + (pI - A)^{-1}D_1V \\
Y &= CX + D_2V = C(pI - A)^{-1}x^0 + C(pI - A)^{-1}BU + (C(pI - A)^{-1}D_1 + D_2)V = \\
&= C(pI - A)^{-1}x^0 + H_{yu}U + H_{yv}V
\end{aligned}$$

$H_{yu} = C(pI - A)^{-1}B$ принято называть *передаточной функцией* (transfer function).

Пусть наблюдение одномерно $y \in \mathbb{R}$, $C \in \mathbb{R}^{1 \times n}$, и удовлетворяет системе

$$\frac{d^n y}{dt^n} + c_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + c_{n-2} \frac{d^{n-2} y}{dt^{n-2}} + \dots + c_1 \frac{dy}{dt} + c_0 y = u. \quad (8.2)$$

Сведем ее к системе (8.1):

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \frac{dy}{dt} \\ \dots \\ x_n = \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} \end{cases} = \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, & (y = x_1) \\ \dot{x}_2 = x_3 \\ \dots \\ \dot{x}_n = -c_{n-1}x_n - c_{n-2}x_{n-1} - \dots - c_0x_1 + u. \end{cases} \quad (8.3)$$

Возвращаясь к многомерной системе, для y справедливо:

$$\begin{cases} y = C^T x, & (C = C^T) \\ \frac{dy}{dt} = C^T A x + C^T B u \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = C^T A^2 x + C^T A B u + C^T B \frac{du}{dt} \\ \dots \\ \frac{d^n y}{dt^n} = C^T A^n x + C^T A^{n-1} B u + \dots + C^T B \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}}. \end{cases} \quad (8.4)$$

По теореме Гамильтона-Кэли A^n имеет разложение $A^n = c_0 I + c_1 A + \dots + c_{n-1} A^{n-1}$. С тем, чтобы избавиться от подчеркнутых слагаемых домножим первое из уравнений системы (8.4) на $-c_0$, второе на $-c_1$, третье на $-c_2$, далее на аналогичные коэффициенты вплоть до предпоследнего уравнения, а затем сложим их все. Тогда мы сможем продолжить равенство из уравнения (8.2):

$$u = \beta_0 u + \beta_1 \frac{du}{dt} + \dots + \beta_{n-1} \frac{d^{n-1} u}{dt^{n-1}}.$$

Положив $x^0 = 0$ и исключив помеху, получим $Y = H_{yu}U$. Различные схемы управления можно увидеть на рисунках 8.1a, 8.1b.

Для передаточной функции $H = H_{yu} = C(pI - A)^{-1}$ вводят понятие *частотной характеристики*, определяемой как $H(i\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}$. $|H(i\omega)|$ называют *коэффициентом усиления*.

Рассмотрим управление вида

$$u(t) = ae^{i\omega t}, \quad a \in \mathbb{R}^{n \times 1}, \omega \in \mathbb{R},$$

и будем считать A устойчивой матрицей (это верно, например, если все собственные ее значения имеют отрицательную вещественную часть). Справедлива теорема

Теорема 8.1. Пусть A устойчивая матрица, $\bar{y}(t) = H(i\omega)ae^{i\omega t}$. Тогда

$$\|y(t) - \bar{y}(t)\| \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0,$$

где $y(t)$ – выход при $u(t) = ae^{i\omega t}$ (устойчивый режим).




Рис. 8.1: Различные управляемые системы

Доказательство.

$$\begin{aligned}
 y(t) &= C e^{At} x^0 + C \int_0^t e^{A(t-\tau)} B a e^{i\omega\tau} d\tau \Rightarrow \\
 &\Rightarrow \{t \rightarrow \infty, C e^{At} x^0 \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0\} \Rightarrow \\
 &\Rightarrow C e^{At} \int_0^t e^{-A\tau} B e^{i\omega\tau} a d\tau = C e^{At} \int_0^t e^{(i\omega I - A)\tau} d\tau B a = \\
 &= C [e^{i\omega I} - e^{-At}] [i\omega I - A]^{-1} B a \xrightarrow{t \rightarrow \infty} C [i\omega I - A]^{-1} B a e^{i\omega t} = H(i\omega) a e^{i\omega t}
 \end{aligned}$$

Здесь мы воспользовались следующим преобразованием:

$$\int_0^t e^{(i\omega I - A)\tau} d\tau = \left\{ \frac{e^{(i\omega I - A)\tau}}{(i\omega I - A)} \right\}_{\tau=0}^{\tau=t} = [e^{(i\omega I - A)t} - I] (i\omega I - A)^{-1},$$

справедливость этой формулы доказывается прямым дифференцированием. ■

9 Устойчивость

Исследуем на устойчивость систему $\dot{x} = Ax$, где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и $\Re \lambda_j \neq 0$. Введем функцию $\chi(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + C_{n-1} + \dots + C_1 \lambda + C_0 = (\lambda - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_n)$. Проблема в том, что все собственные значения сложно искать

Определение 9.1. Матрица A - устойчива $\Leftrightarrow \forall j \Re \lambda_j < 0$. Матрица A - неустойчива $\Leftrightarrow \exists j \Re \lambda_j > 0$.

$\chi(\lambda) = 0$ — критерий асимптотической устойчивости.
 A — устойчива $\Rightarrow \chi(0) = C_0 > 0$. Заметим, что $\chi(0) = \prod_{j=1}^n (-\lambda_j)$. В случае действительного λ_j получаем $-\lambda_j > 0$, а в комплексном случае получим $(-\lambda_j)(-\overline{\lambda_j}) = |\lambda_j|^2 = (\alpha^2 + \beta^2) > 0$

9.1 Графический метод исследования на устойчивость

Рассмотрим $\lambda = i\omega$. Заметим, что тогда $\overline{\chi(i\omega)} = \chi(i\omega)$ Тогда получим:

$$\chi(i\omega) = (i\omega - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (i\omega - \lambda_n)$$

Тогда возможны два случая:

$$\begin{array}{cc} \Re \lambda_j < 0 & \Re \lambda_j > 0 \\ \text{Arg } i\omega - \lambda_i \Big|_{w=-\infty}^{+\infty} = \pi & \text{Arg } i\omega - \lambda_i \Big|_{w=-\infty}^{+\infty} = -\pi \end{array}$$

Тогда получим критерий асимптотической устойчивости Михайлова:

$$\text{Arg } \chi(i\omega) \Big|_{\omega=0}^{+\infty} = \frac{\pi}{2}n \Leftrightarrow \forall j \Re \lambda_j < 0.$$

Иначе критерий Михайлова можно воспринимать как количество четвертей пройденных графиком $\chi(i\omega)$ или годографом по $\omega \in \mathbb{R}^+$





Рис. 9.1: Пример годографа с $\chi(\lambda) = \lambda^4 + \lambda^3 + 4\lambda^2 + \lambda + 3$

9.2 Применение к теории управления

9.3 Теорема Найквиста

Пусть H имеет q неустойчивых полюсов и $n - q$ устойчивых (не имеет чисто мнимых). Тогда замкнутая система устойчива тогда и только тогда когда $H(i\omega)$ не проходит через -1 и делает при $\omega = (0; +\infty)$ $\frac{q}{2}$ полных оборотов против часовой стрелки.



Список литературы

- [1] К. В. Воронцов. *L^AT_EX в примерах*. — М.: МЦНМО, 2005.