

$y = \boxed{0.8}X + \boxed{20}$

$(a=0.8 \quad b=20)$

$0.8 \times 50 + 20 \rightarrow$

(50) $4 + 20 = 24$

$y = ax + b$

(در ML ممکن است به بهترین جواب ممکن نرسیده باشیم)

(تعداد تکرار کم بوده است)

train

فاز آموزش

(فاز تست)

داده های واقعی
(ورودی / خروجی)
X
y
Tehran House Price
Price
Area
① ② ③ ④ ⑤
10
5
0
input
X
target
y
متراژ
قیمت
model
فرض (a=0 b=0) ①
(a=0.5 b=5) ②
(a=0.5 b=10) ③
(a=0.6 b=15) ④
(a=0.8 b=20) ⑤
Solver
(پارامتر جدید)
optimizer
حداکثر
تعداد تکرار
max_iter
metric
(معیار سنجش خطا / دقت)
Cost function
تابع هزینه
خطا
Loss
(0,0)
(0.5,5)
(0.5,10)
(0.6,15)
(0.8,20)
1
2
3
4
تعداد تکرار
بهترین
بین
حالتهای
انجام شده
با تفاوت
پیش بینی y
رگرسیون
mse
mae
rmse
370
داده جدید
متراژ جدید
370
قیمت جدید
46
y
46.2
~~44.8~~
پیش بینی
y'
200
(test)