

Substituição de Tabelas

# PFISTER

As Pirâmides Coloridas de Pfister



A.E. de Villemor-Amaral  
Lucila M. Cardoso

Este documento contém as versões atualizadas das **Tabelas 14.3, 14.9 e 14.24** do **Manual do Pfister**. As tabelas originalmente publicadas no manual estão desatualizadas e devem ser desconsideradas. Para fins de aplicação, consulta e referência, **utilize exclusivamente as tabelas presentes nesta cartilha.**

**Tabela 14.3.**

Comparação das síndromes cromáticas

Idade	Síndrome	Administração	n	M	DP	t	df	p	d
6	Normalidade	Informatizada	10	33,78	14,43	-2,143	18	0,046	-0,96
		Tradicional	10	48,44	16,12				
	Estímulo	Informatizada	10	36,44	8,96	-0,632	18	0,535	-0,28
		Tradicional	10	39,56	12,73				
	Fria	Informatizada	10	30,45	9,89	-2,349	18	0,030	-1,05
		Tradicional	10	42,00	12,01				
7	Incolor	Informatizada	10	24,00	10,15	2,923	18	0,009	1,31
		Tradicional	10	12,89	6,44				
	Normalidade	Informatizada	15	30,07	15,60	-4,594	31	0,000	-1,57
		Tradicional	18	50,62	9,90				
	Estímulo	Informatizada	15	31,41	6,92	-2,473	31	0,019	-0,88
		Tradicional	18	39,51	10,98				
8	Fria	Informatizada	15	34,67	13,46	-2,304	31	0,028	-0,80
		Tradicional	18	44,81	11,84				
	Incolor	Informatizada	15	25,33	14,25	3,218	31	0,003	1,10
		Tradicional	18	12,22	8,96				
	Normalidade	Informatizada	20	30,00	11,99	-4,574	39	0,000	-1,43
		Tradicional	21	47,41	12,36				
9	Estímulo	Informatizada	20	38,22	17,55	-0,355	39	0,724	-0,11
		Tradicional	21	40,11	16,46				
	Fria	Informatizada	20	35,11	13,97	-1,710	39	0,095	-0,53
		Tradicional	21	42,43	13,44				
	Incolor	Informatizada	20	20,22	11,67	2,029	39	0,049	0,63
		Tradicional	21	13,02	11,07				
10	Normalidade	Informatizada	35	35,43	15,30	-3,153	55	0,003	-0,85
		Tradicional	22	48,89	16,30				
	Estímulo	Informatizada	35	31,62	9,02	-1,213	25,9	0,236	-0,35
		Tradicional	22	37,37	21,08				
	Fria	Informatizada	35	41,27	14,96	-1,449	55	0,153	-0,39
		Tradicional	22	47,38	16,29				
10	Incolor	Informatizada	35	22,03	13,98	2,941	55	0,005	0,84
		Tradicional	22	12,12	9,25				
	Normalidade	Informatizada	25	31,91	10,89	-5,448	41	0,000	-1,73
		Tradicional	18	48,27	7,77				
	Estímulo	Informatizada	25	28,98	10,35	-1,430	41	0,160	-0,44
		Tradicional	18	33,95	12,40				
	Fria	Informatizada	25	36,53	10,12	-3,923	41	0,000	-1,22
		Tradicional	18	48,64	9,79				
	Incolor	Informatizada	25	29,69	16,62	4,210	37,202	0,000	1,24
		Tradicional	18	13,46	8,30				

# Substituição de tabelas do PFISTER

Idade	Síndrome	Administração	n	M	DP	t	df	p	d
11	Normalidade	Informatizada	5	39,11	11,40	-1,671	20	0,110	-0,84
		Tradicional	17	48,37	10,76				
	Estímulo	Informatizada	5	30,22	7,30	-2,015	20	0,058	-1,15
		Tradicional	17	41,44	11,68				
	Fria	Informatizada	5	36,00	12,31	-1,446	20	0,164	-0,69
		Tradicional	17	43,79	10,12				
	Incolor	Informatizada	5	28,00	12,92	2,625	4,599	0,051	1,54
		Tradicional	17	12,29	6,44				

**Tabela 14.9.**

Análise descritiva das síndromes cromáticas por idade, da administração tradicional

Idade		Síndrome de normalidade	Síndrome de estímulo	Síndrome fria	Síndrome incolor
6	Média	48,8	39,8	41,2	14,4
	Desvio padrão	13,4	10,1	11,2	7,3
	Mínimo	26,7	26,7	15,6	2,2
	Máximo	84,4	73,3	60,0	35,6
	Percentil 25	40,0	35,0	35,0	10,6
	Mediana	44,5	37,8	43,3	13,3
	Percentil 75	54,4	42,8	46,7	17,8
7	Média	50,3	36,9	44,8	13,8
	Desvio padrão	9,0	10,4	9,5	7,9
	Mínimo	20,0	11,1	13,3	0,0
	Máximo	68,9	66,7	66,7	37,8
	Percentil 25	46,7	31,1	40,0	8,9
	Mediana	51,1	35,6	46,7	13,3
	Percentil 75	53,3	42,2	51,1	17,8
8	Média	49,9	35,1	44,0	16,0
	Desvio padrão	10,4	11,4	12,0	12,0
	Mínimo	20,0	6,7	6,7	0,0
	Máximo	82,2	80,0	71,1	64,4
	Percentil 25	43,3	28,9	40,0	8,9
	Mediana	48,9	35,6	44,5	13,3
	Percentil 75	55,6	40,0	51,1	17,8
9	Média	49,8	35,9	45,9	14,1
	Desvio padrão	12,3	13,9	11,3	8,4
	Mínimo	0,0	4,4	0,0	0,0
	Máximo	75,6	100,0	77,8	44,4
	Percentil 25	46,7	31,1	40,0	11,1
	Mediana	48,9	35,6	46,7	13,3
	Percentil 75	55,6	40,0	51,1	17,8

Idade		Síndrome de normalidade	Síndrome de estímulo	Síndrome fria	Síndrome incolor
10	Média	49,1	32,6	47,1	16,1
	Desvio padrão	12,2	11,6	12,3	8,8
	Mínimo	0,0	0,0	0,0	0,0
	Máximo	100,0	66,7	80,0	44,4
	Percentil 25	42,8	24,4	40,0	11,1
	Mediana	48,9	32,2	46,7	15,6
	Percentil 75	55,6	39,5	53,3	19,5
11	Média	50,4	35,6	44,6	15,8
	Desvio padrão	8,4	9,4	9,9	8,8
	Mínimo	22,2	0,0	17,8	0,0
	Máximo	93,3	64,4	93,3	48,9
	Percentil 25	46,7	31,1	40,0	11,1
	Mediana	48,9	35,6	44,5	15,6
	Percentil 75	53,3	40,0	51,1	17,8
12	Média	51,8	34,3	44,3	17,2
	Desvio padrão	8,4	6,4	8,4	8,0
	Mínimo	22,2	13,3	22,2	0,0
	Máximo	68,9	48,9	64,5	42,2
	Percentil 25	46,7	31,1	37,8	13,3
	Mediana	52,2	33,3	46,7	15,6
	Percentil 75	57,8	38,3	48,9	20,0

**Tabela 14.24.**

Análise descritiva das síndromes cromáticas por idade, da administração tradicional

Idade		Síndrome de normalidade	Síndrome de estímulo	Síndrome fria	Síndrome incolor
13	Média	47,7	33,2	42,9	19,6
	Desvio padrão	8,2	11,3	10,7	12,2
	Mínimo	31,1	2,2	11,1	2,2
	Máximo	64,4	64,5	68,9	57,8
	Percentil 25	43,3	27,8	38,9	12,2
	Mediana	48,9	33,3	44,4	13,3
	Percentil 75	53,3	40,0	48,9	25,6
14	Média	49,8	29,9	46,1	20,1
	Desvio padrão	10,8	8,8	7,9	10,0
	Mínimo	26,7	13,3	20,0	2,2
	Máximo	80,0	51,1	62,2	46,7
	Percentil 25	44,4	24,4	42,2	13,3
	Mediana	48,9	31,1	46,7	17,8
	Percentil 75	53,3	35,0	48,9	23,9