

1 Разрешимость

Всюду $d \in \mathbb{N}$, $d \geq 2$. Для $p, x \in \mathbb{R}^d$ через $p \circ x := (p^1 x^1, \dots, p^d x^d)$ обозначим покоординатное произведение, через $\mathbf{e} := (1, \dots, 1) \in \mathbb{R}^d$ — единичный вектор, через $\mathbf{1}_S \in \mathbb{R}^T$ — индикатор множества $S \subset [T]$. Неравенства между векторами покоординатные.

Определение 1.1 (Неоклассические Функции). Будем называть функцию $f : \mathbb{R}_+^d \rightarrow \mathbb{R}_+$ *неоклассической*, если она *непрерывна, вогнута* и однородна степени 1. Будем обозначать класс неоклассических функций d переменных как Φ_d .

Определение 1.2 (Неоклассическая разрешимость). Пусть $\{\hat{p}_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — некоторый конечный набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ *неоклассически разрешим* при этих ценах, если существует такая неоклассическая функция $h \in \Phi_d$ и такие окрестности $\{U_t \ni \hat{p}_t\}_{t \in [T]}$, $U_t \subset \mathbb{R}_{++}^d$, что для каждого набора $\{p_t \in U_t\}_{t \in [T]}$ существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, что $\forall t \in [T] \Rightarrow \mu(A_t) = y_t$, где $A_t = \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

2 Спектр

Определение 2.1 (Спектр). Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Для $S \subset [T]$ назовём *камерой* множество

$$R_S := \left\{ x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1 \text{ при } t \in S, h(p_s \circ x) > 1 \text{ при } s \notin S \right\}.$$

Спектром пары (h, P) назовём семейство $\text{Sp}(h, P) := \{S \subset [T] \mid R_S \neq \emptyset\}$. Камеры открыты по непрерывности h и попарно не пересекаются. Точка $x \in \mathbb{R}_{++}^d$ вне кривых $h(p_t \circ x) = 1$ лежит в камере $R_{S(x)}$, $S(x) := \{t \mid h(p_t \circ x) < 1\}$, поэтому $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$ отличается от $\bigsqcup_{S \ni t} R_S$ лишь точками кривых.

Лемма 2.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $p \in \mathbb{R}_{++}^d$. Тогда кривая $\Gamma := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = 1\}$ имеет меру нуль.

Доказательство. По однородности при $c > 0$ множество $\{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p \circ x) = c\}$ равно $c\Gamma$ и имеет меру $c^d |\Gamma|$. Эти множества при разных c попарно не пересекаются, поэтому положительную меру могут иметь лишь счётное их число. Значит, $|\Gamma| = 0$. $\square$

Лемма 2.3. Рассмотрим неоклассическую функцию $h \in \Phi_d$ и набор цен $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ принадлежит конусу $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, если и только если существует абсолютно непрерывная мера μ на $\mathbb{R}_+^d$, для которой при всех $t \in [T]$ выполнено интегральное условие $\mu(A_t) = y_t$, где $A_t := \{x \in \mathbb{R}_{++}^d \mid h(p_t \circ x) < 1\}$.

Доказательство. По лемме 2.2 кривые имеют меру нуль, поэтому $\mu(A_t) = \sum_{S \ni t} \mu(R_S)$, и условия $\mu(A_t) = y_t$ означают $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$, где $\mu(R_S) = 0$ при $S \notin \text{Sp}(h, P)$. Обратно, при $S \in \text{Sp}(h, P)$ камера R_S — непустое открытое множество, и равномерная вероятностная мера на шаре в R_S реализует вектор $\mathbf{1}_S$, а суммы и неотрицательные кратные мер реализуют суммы и кратные векторов. $\square$

Лемма 2.4. Пусть $h \in \Phi_d$, $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P)$ для каждого набора цен $Q \in V$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$ и $x \in R_S$. Строгие неравенства $h(p_t \circ x) \geq 1$ сохраняются при малом изменении цен по непрерывности h , поэтому x лежит в камере со спектром S и для Q , то есть $S \in \text{Sp}(h, Q)$. Множеств S конечное число. $\square$

3 Достижимые спектры

Определение 3.1 (Достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *достижимый спектр* при ценах P , если для каждого $t \in S$ существует ненулевой вектор $\xi \in \mathbb{R}_+^d$, для которого $\langle \xi, p_s - p_t \rangle > 0$ при всех $s \notin S$. Такой вектор назовём *свидетелем* индекса t . Будем обозначать как $\text{Sp}(P)$ семейство таких спектров.

Лемма 3.2. Пусть $h \in \Phi_d$ и $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Пусть $S \in \text{Sp}(h, P)$, $x \in R_S$ и $t \in S$. Если $S = [T]$, свидетелем служит любой ненулевой $\xi \in \mathbb{R}_+^d$. Иначе множество $C := \text{conv} \{p_s \circ x\}_{s \notin S} + \mathbb{R}_+^d$ выпукло и замкнуто как сумма компакта и замкнутого конуса. На C выполнено $h \geq 1$: при $r \notin S$ имеем $h(p_r \circ x) \geq 1$, и по монотонности h и неравенству Йенсена

$$h\left(\sum_{r \notin S} w_r p_r \circ x + v\right) \geq h\left(\sum_{r \notin S} w_r p_r \circ x\right) \geq \sum_{r \notin S} w_r h(p_r \circ x) \geq 1$$

при $w_r \geq 0$, $\sum_r w_r = 1$, $v \geq 0$. Так как $h(p_t \circ x) < 1$, точка $p_t \circ x$ не лежит в C . По теореме об отделимости найдутся линейная функция f и число u , что $f(p_t \circ x) < u < f(c)$ при всех $c \in C$. Функция f неотрицательна на $\mathbb{R}_+^d$: иначе при $f(v) < 0$, $v \geq 0$, точка $c + \lambda v \in C$ с подходящим $\lambda \geq 0$ дала бы $f(c + \lambda v) = u$. Положим $\xi^i := f(e_i)x^i \geq 0$. Тогда $\langle \xi, p \rangle = f(p \circ x)$, и при $s \notin S$ $\langle \xi, p_s - p_t \rangle = f(p_s \circ x) - f(p_t \circ x) > 0$, откуда также $\xi \neq 0$. $\square$

4 Критерий разрешимости

Лемма 4.1 (отделимость). Пусть $S \in \text{Sp}(P)$ и $t \in S$. Тогда существует вектор $\xi \in \mathbb{R}_{++}^d$, для которого $\langle \xi, p_t \rangle < 1 < \langle \xi, p_s \rangle$ при всех $s \notin S$.

Доказательство. Пусть ξ_0 — свидетель индекса t . При достаточно малом $\delta > 0$ вектор $\xi_1 := \xi_0 + \delta \mathbf{e} \in \mathbb{R}_{++}^d$ всё ещё удовлетворяет $\langle \xi_1, p_s - p_t \rangle > 0$ при всех $s \notin S$, так как таких s конечное число. Положим $a := \langle \xi_1, p_t \rangle > 0$ и выберем c с $a < c < \min_{s \notin S} \langle \xi_1, p_s \rangle$, а при $S = [T]$ положим $c := a + 1$. Тогда $\xi := \xi_1/c$ искомый. $\square$

Лемма 4.2 (склейка). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$.

Доказательство. Для каждой пары (S, t) с $t \in S \in \text{Sp}(P)$ возьмём по лемме 4.1 вектор $\eta_{S,t} \in \mathbb{R}_{++}^d$ с $\langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$ и $\langle \eta_{S,t}, p_s \rangle > 1$ при $s \notin S$, и добавим к ним вектор $\eta_0 := \mathbf{e}$. Каждому $S \in \text{Sp}(P)$ дадим свой показатель $E_S \in \mathbb{N}$, $E_S \geq 1$, а вектору η_0 — показатель 0. Выберем $M \geq 1$ так, чтобы $M \min(\eta^1 p^1, \eta^2 p^2) > 1$ для всех выбранных векторов η и всех $s \in [T]$, и для $z \in \mathbb{Z}$ положим $x_z := (M^z, M^{-z}, 1, \dots, 1)$. Тогда при $z \neq 0$

$$\langle \eta, p \circ x_z \rangle \geq \eta^1 p^1 M^z + \eta^2 p^2 M^{-z} \geq M \min(\eta^1 p^1, \eta^2 p^2) > 1,$$

поскольку одно из чисел M^z, M^{-z} не меньше M , а оба слагаемых положительны. Положим $\tilde{\eta}_{S,t} := \eta_{S,t} \circ x_{-E_S}$, $\tilde{\eta}_0 := \eta_0$ и

$$h(x) := \min(\langle \tilde{\eta}_0, x \rangle, \min_{t \in S \in \text{Sp}(P)} \langle \tilde{\eta}_{S,t}, x \rangle) \in \Phi_d.$$

Так как $\langle \eta \circ x_{-a}, p \circ x_b \rangle = \langle \eta, p \circ x_{b-a} \rangle$, в точке x_{E_S} векторы с показателем E_S дают значения $\langle \eta_{S,t}, p \rangle$, а все остальные — значения $\langle \eta, p \circ x_z \rangle$ с $z \neq 0$, большие единицы. Поэтому для $t \in S$ имеем $h(p_t \circ x_{E_S}) \leq \langle \eta_{S,t}, p_t \rangle < 1$, а для $s \notin S$ — $h(p_s \circ x_{E_S}) > 1$. Значит, $x_{E_S} \in R_S$ и $S \in \text{Sp}(h, P)$. $\square$

Теорема 4.3. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда существует $h \in \Phi_d$, для которой $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$.

Доказательство. Включение $\text{Sp}(P) \subseteq \text{Sp}(h, P)$ даёт лемма 4.2, обратное — лемма 3.2. $\square$

Теорема 4.4. Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_{++}^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Тогда вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ неоклассически разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$.

Доказательство. Пусть y разрешим с функцией $h \in \Phi_d$. Взяв в определении 1.2 сами цены P , по лемме 2.3 получаем $y \in \text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(h, P)\}$, а $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ по лемме 3.2. Обратно, возьмём h из теоремы 4.3. По лемме 2.4 $\text{Sp}(h, Q) \supseteq \text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ для всех Q из некоторой окрестности P , и по лемме 2.3 при каждом таком Q существует абсолютно непрерывная мера μ с $\mu(A_t) = y_t$. $\square$

Замечание. Функция h из теоремы 4.3 не зависит от y . Тем самым каждый разрешимый вектор выпусков реализуется одной и той же функцией h , и от y зависит только мера. Никаких условий общего положения на набор цен не требуется: совпадающие координаты и даже совпадающие цены допустимы.

Алгоритм. Теорема 4.4 даёт конечную процедуру проверки неоклассической разрешимости y при ценах P .

1. *Построение $\text{Sp}(P)$.* Перебираем $S \subset [T]$ и для каждого $t \in S$ ищем свидетеля, то есть решаем задачу линейного программирования из замечания после определения 3.1. Оставляем те S , у которых свидетели есть у всех $t \in S$. Это 2^T кандидатов и не более T задач линейного программирования на каждый.
2. *Проверка принадлежности конусу.* Решаем задачу линейного программирования: найти $m_S \geq 0$, $S \in \text{Sp}(P)$, с $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$. Если она разрешима, базисное решение даёт разложение y не более чем по T спектрам; вместе с леммами 4.1 и 4.2 это явная функция h и мера, реализующие y . Если нет, двойственная задача даёт $\lambda \in \mathbb{R}^T$ с $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$ при всех $S \in \text{Sp}(P)$ и $\langle \lambda, y \rangle < 0$ (лемма Фаркаша); это опровержение: для любой реализующей пары (h, μ) из $y = \sum_S \mu(R_S) \mathbf{1}_S$ и $\text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(P)$ следовало бы $\langle \lambda, y \rangle \geq 0$. Неравенство $\sum_{\lambda_t < 0} |\lambda_t| y_t \leq \sum_{\lambda_t > 0} \lambda_t y_t$ выполнено для всех разрешимых y и нарушено для данного.

Пример 4.5 (проверка неразрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (4, 1)$, $\hat{p}_2 = (3, 3)$, $\hat{p}_3 = (1, 4)$ и $y = (1, 5, 3)$. Шаг 1: единственное покрытие — индекс 2 покрывает пару 1, 3, так как $(2, 5, 2, 5) \leq \hat{p}_2$; поэтому $\text{Sp}(P) = 2^{[3]} \setminus \{\{2\}\}$. Шаг 2: задача $\sum_S m_S \mathbf{1}_S = y$, $m_S \geq 0$, неразрешима, и двойственная задача даёт $\lambda = (1, -1, 1)$: на каждом $S \in \text{Sp}(P)$ сумма $\sum_{t \in S} \lambda_t$ неотрицательна (множество $\{2\}$ исключено), а $\langle \lambda, y \rangle = -1 < 0$. Опровержение читается как неравенство $y_2 \leq y_1 + y_3$, верное для всех разрешимых векторов и нарушенное здесь: $5 > 4$.

Пример 4.6. Опровержения не сводятся к неравенствам $y_t \leq y_s + y_r$, отвечающим покрытиям. При $p_1 = (107, 179)$, $p_2 = (59, 125)$, $p_3 = (26, 148)$, $p_4 = (66, 101)$ покрытия таковы: p_1 доминирует p_2, p_3, p_4 , а 2 покрывает пару 3, 4. Вектор $y = (1, 2, 1, 1)$ удовлетворяет всем неравенствам покрытий ($y_1 \leq y_2, y_3, y_4$ и $y_2 \leq y_3 + y_4$), но шаг 2 даёт $\lambda = (-1, -1, 1, 1)$: всякое $S \in \text{Sp}(P)$, содержащее 1, содержит 3 и 4, а содержащее 2 — хотя бы одно из них, так что $\sum_{t \in S} \lambda_t \geq 0$, тогда как $\langle \lambda, y \rangle = -1$. Это неравенство $y_1 + y_2 \leq y_3 + y_4$.

Пример 4.7 (проверка разрешимости). Пусть $\hat{p}_1 = (1, 9)$, $\hat{p}_2 = (4, 4)$, $\hat{p}_3 = (9, 1)$, $\hat{p}_4 = (10, 100000)$, $\hat{p}_5 = (20000, 20000)$, $\hat{p}_6 = (100000, 10)$ и $y = (5, 9, 6, 3, 1, 4)$. Шаг 1: цены $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$ попарно несравнимы и не покрывают пар, то же верно для $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$, а каждая из $\hat{p}_4, \hat{p}_5, \hat{p}_6$ доминирует каждую из $\hat{p}_1, \hat{p}_2, \hat{p}_3$; других покрытий нет. Поэтому $S \in \text{Sp}(P)$ тогда и только

тогда, когда из $S \cap \{4, 5, 6\} \neq \emptyset$ следует $\{1, 2, 3\} \subset S$: всего 15 достижимых спектров, восемь подмножеств $\{1, 2, 3\}$ и семь множеств $\{1, 2, 3\} \cup U$ с непустым $U \subset \{4, 5, 6\}$. Шаг 2: задача разрешима,

$$y = 4 \cdot \mathbf{1}_{\{2\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{3\}} + 1 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,5\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,6\}} + 2 \cdot \mathbf{1}_{\{1,2,3,4,6\}},$$

так что y неоклассически разрешим, и по лемме 4.2 все пять спектров этого разложения реализуются одной функцией $h \in \Phi_d$.

Пример 4.8. Опровержение может не иметь коэффициентов из $\{-1, 0, 1\}$. Пусть $p_1 = (29, 799)$, $p_2 = (68, 763)$, $p_3 = (116, 484)$, $p_4 = (543, 388)$, $p_5 = (781, 787)$, $p_6 = (820, 172)$; покрытия: 2 покрывает пару 1, 3; 4 — пару 3, 6; 5 — пару 1, 6 и доминирует p_2, p_3, p_4 . Вектор $y = (3, 6, 3, 5, 2, 3)$ не разрешим, и $\lambda = (1, -1, 2, -1, -1, 1)$ — опровержение: $y_2 + y_4 + y_5 \leq y_1 + 2y_3 + y_6$ для всех разрешимых y , а здесь $13 > 12$. Перебор всех 3^6 векторов $\lambda \in \{-1, 0, 1\}^6$ показывает, что опровержения с такими коэффициентами для этого y не существует: неравенство выше задаёт грань конуса $\text{cone}\{\mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(P)\}$, и y нарушает только её.

Пример 4.9. Общее положение цен не требуется. При ценах $p_1 = (1, 3)$, $p_2 = (2, 2)$, $p_3 = (3, 1)$, $p_4 = (2, 3)$ у p_2 и p_4 совпадают первые координаты, у p_1 и p_4 — вторые. Покрытия: p_4 доминирует p_1 и p_2 , а 2 покрывает пару 1, 3. Вектор $y = (2, 1, 1, 1) = \mathbf{1}_{\{1\}} + \mathbf{1}_{\{3\}} + \mathbf{1}_{\{1,2,4\}}$ неоклассически разрешим, а $y = (1, 1, 1, 2)$ нет: $\lambda = (1, 0, 0, -1)$ даёт опровержение $y_4 \leq y_1$.

5 Слабая разрешимость

Лемма 5.1. Пусть $P \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ набора P , что $\text{Sp}(Q) \supseteq \text{Sp}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V$.

Доказательство. По теореме 4.3 возьмём $h \in \Phi_d$ с $\text{Sp}(h, P) = \text{Sp}(P)$ и окрестность V из леммы 2.4. При $Q \in V$ по лемме 3.2 $\text{Sp}(P) = \text{Sp}(h, P) \subseteq \text{Sp}(h, Q) \subseteq \text{Sp}(Q)$. $\square$

Замечание. В частности, из теоремы 4.4 следует, что если y разрешим при ценах P , то y разрешим при всех наборах цен из V .

Определение 5.2 (Слабая разрешимость). Пусть $P \in \mathbb{R}_+^{d \times T}$ — набор цен. Будем говорить, что вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ *слабо разрешим* при ценах P , если в любой окрестности $U \ni P$, $U \subset \mathbb{R}_+^{d \times T}$, найдётся набор цен $Q \in U \cap \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$, при котором y разрешим.

Замечание. Разрешимость определена только при положительных ценах. Слабая разрешимость распространяет её на замыкание $\mathbb{R}_+^{d \times T}$: при $P \in \mathbb{R}_+^{d \times T}$ разрешимый вектор слабо разрешим, а при ценах с нулевыми координатами говорить можно только о слабой разрешимости.

Определение 5.3 (Слабо достижимые спектры). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_+^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен. Будем говорить, что $S \subset [T]$ — *слабо достижимый спектр* при ценах P , если для каждого $t \in S$ существует ненулевой вектор $\xi \in \mathbb{R}_+^d$, для которого $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$ при всех $s \notin S$. Такой вектор назовём *слабым свидетелем* индекса t . Будем обозначать как $\widehat{\text{Sp}}(P)$ семейство таких спектров. Отметим, что $\text{Sp}(P) \subseteq \widehat{\text{Sp}}(P)$.

Лемма 5.4. Пусть $P \in \mathbb{R}_+^{d \times T}$. Тогда существует такая окрестность $V \subset \mathbb{R}_+^{d \times T}$ набора P , что $\text{Sp}(Q) \subseteq \widehat{\text{Sp}}(P)$ для каждого набора цен $Q \in V \cap \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$.

Доказательство. Иначе, поскольку спектров конечное число, нашлись бы $S \notin \widehat{\text{Sp}}(P)$, $t \in S$ и наборы $Q_n \rightarrow P$ с $S \in \text{Sp}(Q_n)$. Свидетелей ξ_n индекса t при ценах Q_n нормируем условием $\langle \xi_n, \mathbf{e} \rangle = 1$. Симплекс компактен, и предел ξ подпоследовательности ненулевой, неотрицательный и удовлетворяет $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$ при $s \notin S$, то есть является слабым свидетелем. Это противоречит выбору S и t . $\square$

Лемма 5.5 (перепаривание). Пусть $C \subset [T]$ — набор индексов с одинаковыми ценами, $u \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, $u \cap C \neq \emptyset$, $C \setminus u \neq \emptyset$ и $L \subset C$. Тогда $(u \setminus C) \cup L \in \widehat{\text{Sp}}(P)$.

Доказательство. Пусть $S' := (u \setminus C) \cup L$. Для $t \in u \setminus C$ подходит его слабый свидетель для u : индекс $s \notin S'$ вне C лежит вне u , а индекс $s \in C \setminus L$ имеет ту же цену, что некоторый $s_1 \in C \setminus u$. Для $t \in L$ подходит слабый свидетель любого $t_1 \in u \cap C$ для u : цены p_t и p_{t_1} равны, индексы $s \notin S'$ вне C лежат вне u , а для $s \in C$ разность $p_s - p_t$ равна нулю. $\square$

Для $S \subset [T]$ обозначим через $c(S)$ число пар $(a, b) \in S \times S$ с $p_a = p_b$.

Лемма 5.6 (распутывание). Пусть $u, u' \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, $t \in u \setminus u'$, $s \in u' \setminus u$ и $p_s = p_t$. Тогда найдутся $A, B \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, для которых $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_u + \mathbf{1}_{u'}$ и $c(A) + c(B) > c(u) + c(u')$.

Доказательство. Пусть $C := \{r \in [T] \mid p_r = p_t\}$. Положим

$$A := (u \setminus C) \cup ((u \cup u') \cap C), \quad B := (u' \setminus C) \cup (u \cap u' \cap C).$$

Множество u пересекает C по t и не содержит $s \in C$, а u' пересекает C по s и не содержит t . Поэтому $A, B \in \widehat{\text{Sp}}(P)$ по лемме 5.5. Вне C множество A совпадает с u , а B с u' . На C они дают объединение и пересечение $u \cap C$ и $u' \cap C$, откуда $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_u + \mathbf{1}_{u'}$. Пара (a, b) с $p_a = p_b$ лежит целиком в C или целиком вне C . Вне C ничего не меняется. Пара из C , лежащая в u или в u' , лежит в A , а лежащая в обоих — ещё и в B . Поэтому ни одна пара не теряется. Пара (t, s) лежит в A , но не лежит ни в u , ни в u' . $\square$

Лемма 5.7 (монотонное представление). Пусть $y \in \text{cone} \{ \mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(P) \}$. Тогда $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ при некоторых $m_S \geq 0$, $S \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, причём для всякого S с $m_S > 0$ из $t \in S$, $s \notin S$ и $p_s = p_t$ следует $y_s < y_t$.

Доказательство. Пусть $y = \sum_S m_S^0 \mathbf{1}_S$ — какое-нибудь представление и $N := \sum_S m_S^0$. Представления $y = \sum_S m_S \mathbf{1}_S$ с $m_S \geq 0$, $m_S = 0$ при $S \notin \widehat{\text{Sp}}(P)$ и $\sum_S m_S \leq N$ образуют непустой компакт. Возьмём на нём представление, на котором $\sum_S m_S c(S)$ максимальна. Пусть $m_u, m_{u'} > 0$ и нашлись $t \in u \setminus u'$, $s \in u' \setminus u$ с $p_s = p_t$. Перенесём вес $\varepsilon := \min(m_u, m_{u'})$ с u и u' на множества A и B из леммы 5.6. Представление и полный вес сохраняются, а $\sum_S m_S c(S)$ вырастает на $\varepsilon(c(A) + c(B) - c(u) - c(u')) > 0$. Это противоречит выбору. Значит, если $m_S > 0$, $t \in S$, $s \notin S$ и $p_s = p_t$, то всякое W с $m_W > 0$, содержащее s , содержит и t . Поэтому все слагаемые в $y_t - y_s = \sum_W m_W (\mathbf{1}_W(t) - \mathbf{1}_W(s))$ неотрицательны, а слагаемое с $W = S$ равно $m_S > 0$. $\square$

Замечание. Исправлять представление необходимо. При $p_1 = p_2 = (1, 1)$, $p_3 = (1, \frac{1}{2})$, $p_4 = (\frac{1}{2}, 1)$, $p_5 = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $p_6 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ спектры $\{1, 4, 5\}$, $\{1, 3, 6\}$, $\{2, 3, 4\}$ слабо достижимы, но ни при каких ценах, близких к P , не достижимы одновременно.

Лемма 5.8 (наклон). Пусть $P := \{p_t \in \mathbb{R}_+^d\}_{t \in [T]}$ — набор цен, $y \in \mathbb{R}_+^T$, и при $\delta > 0$ положим

$$Q_\delta := \{q_t\}_{t \in [T]}, \quad q_t := p_t + \delta \left(\sum_{i \in [d]} e^{-p_t^i} - \delta y_t \right) \mathbf{e}.$$

Тогда $Q_\delta \rightarrow P$ при $\delta \rightarrow 0$, и при всех достаточно малых $\delta > 0$ выполнено $Q_\delta \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$ и $S \in \text{Sp}(Q_\delta)$ для каждого $S \in \widehat{\text{Sp}}(P)$, у которого $y_s < y_t$ при всех $t \in S$, $s \notin S$ с $p_s = p_t$.

Доказательство. Пусть $F_r := \sum_i e^{-p_r^i} > 0$. Тогда $q_t - p_t = \delta(F_t - \delta y_t) \mathbf{e} \rightarrow 0$, а $q_t^i \geq \delta(F_t - \delta y_t) > 0$ при малых δ . Пусть $t \in S$, ξ — слабый свидетель индекса t с $\langle \xi, \mathbf{e} \rangle = 1$, $g := (e^{-p_t^1}, \dots, e^{-p_t^d})$ и $\xi_\delta := \xi + \delta g$. Тогда $q_s - q_t = (p_s - p_t) + (\delta(F_s - F_t) - \delta^2(y_s - y_t)) \mathbf{e}$. Покажем, что $\langle \xi_\delta, q_s - q_t \rangle > 0$ при $s \notin S$ и малых δ . Если $p_s = p_t$, то $\langle \xi_\delta, q_s - q_t \rangle = \delta^2(y_t - y_s)(1 + \delta \langle g, \mathbf{e} \rangle) > 0$. Если $p_s \neq p_t$, то $\langle \xi_\delta, q_s - q_t \rangle = \langle \xi, p_s - p_t \rangle + \delta K + O(\delta^2)$ с $K := F_s - F_t + \langle g, p_s - p_t \rangle =$

$\sum_i e^{-p_t^i} (e^{-x_i} - 1 + x_i)$, $x_i := p_s^i - p_t^i$. Здесь $\langle \xi, p_s - p_t \rangle \geq 0$, а $K > 0$, так как $e^{-x} \geq 1 - x$ с равенством только при $x = 0$. Пар (t, s) конечное число, и $\xi_\delta \geq \delta g$ ненулевой, так что ξ_δ — свидетель индекса t при ценах Q_δ . Множеств S конечное число, поэтому малость δ можно выбрать общей для всех. $\square$

Теорема 5.9 (критерий слабой разрешимости). Пусть $P \in \mathbb{R}_+^{d \times T}$ — набор цен. Вектор выпусков $y \in \mathbb{R}_+^T$ слабо разрешим при ценах P тогда и только тогда, когда $y \in \text{cone} \left\{ \mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(P) \right\}$.

Доказательство. Пусть y слабо разрешим. По лемме 5.4 в некоторой окрестности P выполнено $\text{Sp}(Q) \subseteq \widehat{\text{Sp}}(P)$, и в ней есть Q , при котором y разрешим. По теореме 4.4 $y \in \text{cone} \left\{ \mathbf{1}_S \mid S \in \text{Sp}(Q) \right\} \subseteq \text{cone} \left\{ \mathbf{1}_S \mid S \in \widehat{\text{Sp}}(P) \right\}$. Обратно, возьмём представление из леммы 5.7. По лемме 5.8 при малых $\delta > 0$ все его спектры лежат в $\text{Sp}(Q_\delta)$ и $Q_\delta \in \mathbb{R}_{++}^{d \times T}$. Тогда y разрешим при ценах Q_δ по теореме 4.4, а так как $Q_\delta \rightarrow P$, наборы Q_δ попадают в любую окрестность P . $\square$