

Московский физико-технический институт
(государственный университет)

Лабораторная работа по электричеству

Измерение магнитного поля Земли [3.1.3]

Талашкевич Даниил Александрович
Группа Б01-009

Долгопрудный
2021

Содержание

1	Теоретическое введение	1
2	Экспериментальное оборудование и методика измерений	2
2.1	Определение магнитного момента магнитных шариков . . .	2
2.1.1	Метод 1	2
2.1.2	Метод 2	2
2.2	Измерение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли	3
2.3	Измерение вертикальной составляющей индукции магнитного поля Земли. Магнитное наклонение	4
3	Ход работы	5
3.1	Определение магнитного момента, намагниченности и остаточной магнитной индукции вещества магнитных шариков	5
3.2	Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли	6
3.3	Определение вертикальной составляющей магнитного поля Земли	6
4	Обработка результатов	6
5	Графики и таблицы	6
6	Вывод	6
7	Литература	7

Цель работы: исследовать свойства постоянных неодимовых магнитов; измерить с их помощью горизонтальную и вертикальную составляющие индукции магнитного поля Земли и магнитное наклонение.

Используемое оборудование: неодимовые магниты; тонкая нить для изготовления крутильного маятника; медная проволока; электронные весы; секундомер; измеритель магнитной индукции; штангенциркуль; брусок, линейка и штатив из немагнитных материалов; набор гирь и разновесов.

1 Теоретическое введение

Магнитное поле точечного диполя с магнитным моментом $\mathbf{m} = \mathbf{S}I$ определяется по формуле, аналогичной формуле для поля элементарного электрического диполя:

$$\mathbf{B}_{\text{дип}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\mathbf{m} \cdot \mathbf{r})\mathbf{r}}{r^5} - \frac{\mathbf{m}}{r^3} \right) \quad (1)$$

При этом сила, действующая на диполь, равна

$$\mathbf{F} = (\mathbf{m} \cdot \nabla)\mathbf{B} \quad (2)$$

А момент силы равен

$$\mathbf{M} = [\mathbf{m} \times \mathbf{B}] \quad (3)$$

В частном случае, когда моменты двух небольших магнитов направлены вдоль соединяющей их прямой, сила их взаимодействия равна

$$F = -\frac{6m_1m_2}{r^4} \quad (4)$$

Если магнитные моменты направлены перпендикулярно соединяющей их прямой, то

$$F = \frac{3m_1m_2}{r^4} \quad (5)$$

2 Экспериментальное оборудование и методика измерений

2.1 Определение магнитного момента магнитных шариков

2.1.1 Метод 1

Величину магнитного момента m двух одинаковых шариков можно рассчитать, зная их массу M и определив максимальное расстояние r_{\max} , на котором они ещё удерживают друг друга в поле тяжести (см. рис.). Из формулы для взаимодействия диполей имеем

$$m = \sqrt{\frac{Mgr_{\max}^4}{6}} \quad (6)$$

Таким образом с помощью измеренного магнитного момента шарика можно измерить индукцию магнитного поля




Рис. 1: Измерение магнитных моментов шариков

2.1.2 Метод 2

Величину магнитного момента шариков можно определить также по силе их сцепления. Она определяется как сила, необходимая для разрыва двух сцепившихся магнитных шариков. Сила сцепления максимальна, если шары соединяются своими противоположными полюсами (магнитные моменты сонаправлены).

Максимальную силу сцепления можно определить по весу магнитной цепочки, которую способен удержать самый верхний магнитный шарик. При этом для расчёта прочности цепочки достаточно учитывать силу взаимодействия верхнего шара с 3–4 ближайшими соседями.

$$F = \frac{3m^2}{8R^4} \left(1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \dots \right) = 1,08 \cdot \frac{3m^2}{8R^4} \quad (7)$$

2.2 Измерение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли

Магнитное поле Земли можно измерить по периоду крутильных колебаний «магнитной стрелки» вокруг вертикальной оси.

«Магнитная стрелка» образована сцепленными друг с другом n намагниченными шариками. Для крепления нити в работе используется штатив, изготовленный из немагнитного материала. Магнитные моменты всех шариков направлены в одну сторону вдоль оси «стрелки». При отклонении стрелки на угол θ от равновесного положения в горизонтальной плоскости возникают крутильные колебания вокруг вертикальной оси, проходящей через середину стрелки.




Рис. 2: Крутильный маятник во внешнем магнитном поле

$$M = -m_n B_{||} \sin \theta \Rightarrow J_n \ddot{\theta} + m_n B_{||} \theta = 0 \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{J_n}{m_n B_{||}}} \quad (8)$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{J_n}{m_n B_{\parallel}}} = 2\pi\sqrt{\frac{n^3 MR^2}{12m_n B_{\parallel}}} \Rightarrow T = 2\pi\sqrt{\frac{MR^2}{3m B_{\parallel}}} n \quad (9)$$

2.3 Измерение вертикальной составляющей индукции магнитного поля Земли. Магнитное наклонение

Для измерения вертикальной составляющей вектора индукции поля Земли используется та же установка, что и для измерения горизонтальной составляющей с тем лишь отличием, что подвешенная магнитная «стрелка» закрепляется на нити в одной точке. В этом случае стрелка, составленная из чётного числа одинаковых шариков и подвешенная за середину, расположится не горизонтально, а под некоторым углом к горизонту.

Это связано с тем, что вектор \mathbf{B} индукции магнитного поля Земли не горизонтален, а образует с горизонтом некоторый угол β , зависящий от географической широты ϕ места, где проводится опыт. Величина угла β называется магнитным наклонением.




Рис. 3: Измерение вертикальной составляющей поля и магнитного наклонения

$$M_n = m B_{\perp} n \quad (10)$$

3 Ход работы

3.1 Определение магнитного момента, намагниченности и остаточной магнитной индукции вещества магнитных шариков

Измерив диаметр и массу шарика, получаем следующие результаты

$$d = 6,4 \pm 0,01 \text{ мм},$$

$$m = 0,841 \pm 0,001 \text{ гр.}$$

С помощью магнетометра измерим индукцию поля B_p на полюсах шарика

$$B_p = 236,1 \pm 11,8 \text{ мТс.}$$

Проложим между двумя магнитными шариками брусок из немагнитного материала. Увеличивая расстояние между бруском и верхним магнитиком, определим на каком максимальном расстоянии r_{\max} шарики удерживают друг друга в поле тяжести Земли

$$r_{\max} = 19 \pm 1 \text{ мм.}$$

Теперь рассчитаем величину магнитного момента магнитика m и оценим погрешность измерений:

$$m = \sqrt{\frac{mgr_{\max}^4}{6}},$$

получаем $m = 42,31 \pm \dots$.

Используя дополнительные шарики, составим цепочку из 20-30 шариков, и с помощью неодимовых магнитов в форме параллелепипедов, подсоединим цепочку к гире и разновесам так, чтобы общая масса системы составила ~ 250 г. Добавляя или удаляя шарики, подбираем минимальный вес системы цепочки с гирей, при котором она отрывается от верхнего шарика. Получаем

$$n = 21 \text{ шарик},$$

$$m = 271,5 \pm 0.021.$$

Рассчитаем силу сцепления двух шаров и по ней определите магнитный момент шарика m , а так же оцените погрешность результата.

$$F_0 = \frac{6\mathfrak{m}^2}{(2R)^4} = \frac{3\mathfrak{m}^2}{8R^4} \quad (\text{ед. СГС})$$

Тогда минимальный вес цепочки, при которой она оторвётся от верхнего шарика, равен

$$F = F_0 \left(1 + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{4^4} + \dots \right) \approx 1,08F_0$$

Получаем $F = 266070$ дин $\Rightarrow \mathfrak{m} = 71,50 \pm \dots$

Оценим полученные значения. Опираемся будем на значения, полученные с помощью магнетометра

$$B_p = \frac{2}{3}B_r = \frac{2}{3}4\pi M = \frac{2}{3}4\pi \frac{\mathfrak{m}}{V}$$

$$\text{получаем } \mathfrak{m} = \frac{3}{8\pi}B_p V = 38,68 \pm \dots$$

по полученному результату видно, что более точный результат значения магнитных моментов дает метод А. (X про погрешности X)

3.2 Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли

3.3 Определение вертикальной составляющей магнитного поля Земли

4 Обработка результатов

NOTHING

5 Графики и таблицы

NOTHING

6 Вывод

XX

7 Литература

1. **Лабораторный практикум по общей физике:** Учебное пособие. В трех томах. Т. 2. Электричество и магнетизм /Гладун А.Д., Александров Д.А., Берулёва Н.С. и др.; Под ред. А.Д. Гладуна - М.: МФТИ, 2007. - 280 с.