

Тема : Числовые множества

1⁰. Натуральные, целые и рациональные числа. Алфавит математики. 2⁰. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 3⁰. Отношение равенства на множестве десятичных дробей и его свойства. 4⁰. Равенство и неравенство десятичных дробей. Следствия этих отношений. 5⁰. Линейный порядок на множестве десятичных дробей. 6⁰. Числовая прямая. Интервалы, отрезки и промежутки. Плотность конечных десятичных дробей на любом интервале. 7⁰. Десятичные приближения и их свойства.

1⁰. Одно из основных понятий как алгебры так и математического анализа — это понятие числа. Как известно из школьного курса математики, все числа принято разбивать на классы, т.е. выделять специальные числовые подмножества.

Простейший из классов такого рода образуют *натуральные числа*. Совокупность всех

натуральных чисел принято обозначать символом \mathbb{N} . Для того чтобы описать множество \mathbb{N} , используются десять цифр

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.

По определению

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots, 9, 10, 11, \dots\}.$$

Следующий класс чисел — это множество \mathbb{Z}

целых чисел:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Натуральные числа образуют в \mathbb{Z} подмножество. Этот факт принято записывать с помощью символа вложения: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

Более широкий чем \mathbb{Z} класс чисел образуют всевозможные дроби и нуль. Их совокуп-

ность обозначается как \mathbb{Q} и называется множеством рациональных чисел:

$$\mathbb{Q} = \{\dots, -\frac{p}{q}, 0, \frac{p}{q} \dots \mid p, q \in \mathbb{N}\}.$$

Справедливо вложение $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$. Как известно из школьного курса математики, рациональные числа можно складывать и умножать, а также сравнивать друг с другом.

Следующий класс в расширяющейся цепочке числовых множеств образуют *вещественные числа*. Вся их совокупность обозначается через \mathbb{R} :

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

Для того чтобы описать множество вещественных чисел \mathbb{R} метода последовательного перебора его элементов, используемого в элементарной математике для описания

множеств \mathbb{N} , \mathbb{Z} и \mathbb{Q} , уже недостаточно. Требуется специальный математический аппарат, а именно: *формула общего вида вещественного числа*.

Для записи такого рода формулы используются различные *позиционные системы счисления*, из которых наиболее распространена десятичная система. Перейдем к описанию соответствующего аппарата.

2⁰. Рассмотрим совокупность всевозможных слов, составленных из десятичных цифр и имеющих вид

$$+ \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots, \quad (\text{DF})$$

$$- \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots \quad (\text{DF}')$$

Здесь α_0 — неотрицательное целое число, т.е. $\alpha_0 \in \mathbb{Z}$ и $\alpha_0 \geq 0$. Следующие за α_0 символы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ — это десятичные цифры.

Определение. Слова вида (DF) и (DF') называют бесконечными десятичными дробями (или, короче, *десятичными дробями*).

Десятичная дробь (DF) называется положительной, если найдется такой номер j , что $\alpha_j \neq 0$. Дробь (DF') при этом называется отрицательной. Дробь (DF) и (DF') , у которых совпадают все цифры α_j , называются противоположными (взаимно противоположными).

Если число α_0 и все цифры α_j в формуле (DF) равны нулю, то соответствующая десятичная дробь — это нуль.

Определение. Если для некоторого натурального n все цифры α_j с индексами $j \geq n + 1$, в записи

$$\pm \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$$

равны нулю, то соответствующая десятичная дробь называется **конечной**.

Таким образом, общий вид конечной десятичной дроби задается записью (DF) или (DF'), в которой все цифры начиная с некоторого номера равны нулю:

$$\pm \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n 0 0 0 \dots$$

Каждой конечной десятичной дроби соответствует рациональное число x , определяемое по формуле

$$x = \pm \left(\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{10^n} \right).$$

Конечные десятичные дроби складывают, вычитают, умножают и делят друг на друга по обычным правилам арифметики для рациональных чисел. Кроме того конечные десятичные дроби сравнивают друг с другом по правилам сравнения рациональных чисел. Указанные арифметические операции, а также операцию сравнения, распространим на случай бесконечных десятичных дробей.

Определение. Бесконечные десятичные дроби вида

$$\alpha_0, \underbrace{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}_{\text{цифра}}, \underbrace{\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n}_{\text{цифра}} \dots,$$

или же вида

$$\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \underbrace{\alpha_{k+1} \dots \alpha_{k+n}}_{\text{цифра}}, \underbrace{\alpha_{k+1} \dots \alpha_{k+n}}_{\text{цифра}} \dots,$$

где одна или несколько цифр повторяются в неизменном порядке, называются **периодическими**. Совокупность повторяющихся цифр называется **периодом** такой дроби.

Теорема. *Всякое рациональное число можно представить в виде конечной или периодической дроби и обратно — всякая конечная десятичная дробь или дробь периодическая изображает рациональное число.*

Следовательно, периодические дроби складываются, вычитаются, умножаются и делятся друг на друга как рациональные числа. Кроме того периодические дроби можно

сравнивать друг с другом по тем же правилам, что и рациональные числа.

Расширим указанные арифметические операции, а также операцию сравнения, на случай, когда в качестве аргументов выступают бесконечные десятичные дроби, которые не являются периодическими.

3⁰. Введем на множестве бесконечных десятичных дробей понятия равенства, а также

отношение порядка, т.е. понятия “меньше” и “больше” (сравнение). Используем при этом понятие *одинаковых десятичных дробей*.

Определение. *Две неотрицательные бесконечные десятичные дроби*

$$\alpha = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots \quad \text{и} \quad \beta = \beta_0, \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \dots$$

назовем одинаковыми, если соответствующие им слова из цифр тождественно сов-

падают, т.е. если

$$\forall j = 0, 1, 2, \dots \quad \Rightarrow \quad \alpha_j = \beta_j.$$

Конечный начальный отрезок $\pm\alpha_0, \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n$ бесконечной десятичной дроби (DF)–(DF') обозначим через $(\alpha)_n$ и назовем его n -отрезком исходной бесконечной дроби.

Определение. Две бесконечные непериодические десятичные дроби

$$\alpha = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots \quad \text{и} \quad \beta = \beta_0, \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \dots$$

равны друг другу, если

$$\forall n = 0, 1, 2, \dots \quad \Rightarrow \quad |(\alpha)_n - (\beta)_n| \leq 10^{-n}.$$

Введенное понятие равенства бесконечных непериодических десятичных дробей обла-

дает свойством рефлексивности ($\alpha = \alpha$) и симметричности (если $\alpha = \beta$, то $\beta = \alpha$).

Если две десятичные дроби одинаковы, то они равны. Однако класс равных дробей шире чем класс одинаковых.

Например, простая (обыкновенная) положительная дробь $\frac{p}{q}$ равна бесконечной десятичной дроби $\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$, если для всех

$n = 0, 1, 2, \dots$ справедливы неравенства

$$\left| \frac{p}{q} - \left(\alpha_0 + \frac{\alpha_1}{10} + \frac{\alpha_2}{10^2} + \dots + \frac{\alpha_n}{10^n} \right) \right| \leq \frac{1}{10^n}.$$

В частности, $1 = 0,9999\dots$

Упражнение. Любая периодическая десятичная дробь с периодом 9 вида

$$\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n 999\dots, \quad \alpha_n \neq 9,$$

равна конечной десятичной дроби

$$\alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_{n-1} (\alpha_n + 1).$$

Оказывается, в предыдущем упражнении указан единственно возможный случай, когда разные десятичные дроби могут быть равными в определенном выше смысле.

Лемма 1. Пусть десятичные дроби

$$\alpha = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots \quad \text{и} \quad \beta = \beta_0, \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \dots$$

равны в смысле данного выше определения и $\alpha_0 > \beta_0$. Тогда

$$\alpha_0 = \beta_0 + 1 \quad \text{и} \quad \forall n \geq 1 \quad \alpha_n = 0, \beta_n = 9.$$

Доказательство. По условию леммы десятичные дроби α и β равны. Следовательно,

$$|(\alpha)_0 - (\beta)_0| \leq 10^0 = 1,$$

или, что то же самое $|\alpha_0 - \beta_0| \leq 1$. Но по условию α_0 и β_0 — это неотрицательные целые числа, причем $\alpha_0 > \beta_0$. Это возможно лишь при $\alpha_0 = \beta_0 + 1$.

Проверим, что при $n \geq 1$ справедливы равенства $\alpha_n = 0$ и $\beta_n = 9$. Используем *принцип математической индукции*.

База индукции, $n = 1$. Имеем

$$(\alpha)_1 = \beta_0 + 1, \alpha_1 = \beta_0 + 1 + \frac{\alpha_1}{10},$$

$$(\beta)_1 = \beta_0, \beta_1 = \beta_0 + \frac{\beta_1}{10}.$$

Вычитая из первого равенства второе, получаем

$$|(\alpha)_1 - (\beta)_1| = 1 + \frac{\alpha_1 - \beta_1}{10}.$$

По условию десятичные дроби α и β равны и, следовательно, должна выполняться оценка

$$1 + \frac{\alpha_1 - \beta_1}{10} \leq \frac{1}{10}.$$

Это возможно лишь при $\beta_1 - \alpha_1 \geq 9$. Но α_1 и β_1 — это цифры и последнее неравенство

возможно лишь при $\alpha_1 = 0$ и $\beta_1 = 9$. Это означает, что заключение леммы верно при $n = 1$.

Предположение индукции, $n = k$. Пусть имеют место равенства

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0, \quad \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 9.$$

В этом предположении имеем

$$(\alpha)_k = \beta_0 + 1, 0 \dots 0, \quad (\beta)_k = \beta_0, 9 \dots 9.$$

После запятой в этих равенствах взяты ровно k цифр. Вычитая из первого равенства второе, получаем

$$|(\alpha)_k - (\beta)_k| = 0,0 \dots 0 1 = \frac{1}{10^k}.$$

Шаг индукции, $n = k + 1$. Имеем

$$(\alpha)_{k+1} = (\alpha)_k + 0,0 \dots 0 \alpha_{k+1} = (\alpha)_k + \frac{\alpha_{k+1}}{10^{k+1}},$$

$$(\beta)_{k+1} = (\beta)_k + 0,0 \dots 0 \beta_{k+1} = (\beta)_k + \frac{\beta_{k+1}}{10^{k+1}}.$$

Вычитая второе равенство из первого, получаем

$$(\alpha)_{k+1} - (\beta)_{k+1} = (\alpha)_k - (\beta)_k + \frac{\alpha_{k+1} - \beta_{k+1}}{10^{k+1}},$$

или, в соответствии с предположением индукции,

$$(\alpha)_{k+1} - (\beta)_{k+1} = \frac{1}{10^k} + \frac{\alpha_{k+1} - \beta_{k+1}}{10^{k+1}}.$$

По условию десятичные дроби α и β равны и, следовательно, должна выполняться оценка

$$(\alpha)_{k+1} - (\beta)_{k+1} = |(\alpha)_{k+1} - (\beta)_{k+1}| \leq \frac{1}{10^{k+1}},$$

или

$$\frac{1}{10^k} + \frac{\alpha_{k+1} - \beta_{k+1}}{10^{k+1}} \leq \frac{1}{10^{k+1}}.$$

Домножая обе части полученного неравенства на 10^k , получаем

$$1 + \frac{\alpha_{k+1} - \beta_{k+1}}{10} \leq \frac{1}{10}.$$

Это возможно лишь при $\beta_{k+1} - \alpha_{k+1} \geq 9$.

Но α_{k+1} и β_{k+1} — это цифры и последнее неравенство возможно лишь при $\alpha_{k+1} = 0$ и $\beta_{k+1} = 9$. Это означает, что заключение верно при $n = k + 1$.

В соответствии с принципом математической индукции лемма справедлива. □

Следствие. Десятичная дробь

$$\alpha = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$$

равна нулю тогда и только тогда когда в соответствующем дроби слове все цифры равны нулю:

$$\alpha = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha_j = 0 \quad \forall j = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство. Обозначим через β десятичную дробь, в записи которой все цифры ну-

левые. Пусть десятичная дробь α равна β по условию. Предположим, что при этом α и β не одинаковы. Тогда по определению равенства десятичных дробей имеем

$$(\alpha)_0 = \alpha_0, \quad (\beta)_0 = 0, \quad |(\alpha)_0 - (\beta)_0| \leq 10^0 = 1,$$

или $|\alpha_0| \leq 1$. Это возможно лишь в случае если $\alpha_0 = 0$ или $\alpha_0 = 1$. Но вариант $\alpha_0 = 1$ невозможен: в этом случае в соответствии с доказанной леммой должны выполняться равенства $\beta_n = 9, n = 1, 2, \dots$, что противоречит

определению β . Таким образом, $\alpha_0 = 0$ и десятичная дробь α имеет вид

$$\alpha = 0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$$

По определению равенства десятичных дробей имеем

$$(\alpha)_1 = 0, \alpha_1, \quad (\beta)_1 = 0, 0 \quad |(\alpha)_1 - (\beta)_1| \leq \frac{1}{10},$$

или $|\alpha_1| \leq 1$. Это возможно лишь в случае если $\alpha_1 = 0$ или же $\alpha_1 = 1$. Но вариант $\alpha_1 = 1$

снова невозможен: в этом случае в соответствии с доказанной леммой должны выполняться равенства $\beta_n = 9$, $n = 2, 3, \dots$, что противоречит определению β . Таким образом, $\alpha_1 = 0$ и десятичная дробь α имеет вид

$$\alpha = 0,0 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots$$

Равенства $\alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = \dots = \alpha_n = 0$ доказываются аналогично. □

4⁰. Продолжим рассмотрение множества бесконечных десятичных дробей, т.е. всевозможных слов, составленных из цифр и имеющих вид

$$\pm \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots, \quad (\text{DF})$$

где α_0 — целое неотрицательное число, т.е. $\alpha_0 \in \mathbb{Z}$ и $\alpha_0 \geq 0$. Следующие за α_0 символы $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \dots$ — это бесконечная цифровая последовательность.

Следствие. Если две разные (не одинаковые) десятичные дроби

$$\alpha = \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \dots \quad \text{и} \quad \beta = \beta_0, \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n \dots$$

равны, то одна из них конечная, а другая периодическая с периодом 9. Если при этом

$$\alpha = \pm \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n 9 9 \dots \quad \text{и} \quad \alpha_n \neq 9,$$

$$\text{то } \beta = \pm \alpha_0, \alpha_1 \alpha_2 \dots (\alpha_n + 1).$$

Докажите следствие в качестве упражнения.

Следствие (транзитивность равенства).

Пусть есть три десятичные дроби α , β , γ ,
причем $\alpha = \beta$ и $\beta = \gamma$. Тогда $\alpha = \gamma$.

Доказательство. Пусть α и β — одинаковые слова. Тогда $\alpha = \gamma$ по определению равенства десятичных дробей.

Пусть теперь α и β — разные слова, причем α — бесконечная десятичная дробь. Тогда по предыдущему следствию имеем

$$\alpha = \pm\alpha_0, \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n 99\dots \quad \text{и} \quad \alpha_n \neq 9,$$

и $\beta = \pm\alpha_0, \alpha_1\alpha_2 \dots (\alpha_n + 1)$. Далее, если β и γ — одинаковые слова, то $\alpha = \gamma$ по определению равенства десятичных дробей. Если же β и γ — разные слова, то по доказанной лемме $\gamma = \pm\alpha_0, \alpha_1\alpha_2 \dots \alpha_n 99\dots$, т.е. снова $\alpha = \gamma$. \square

Пусть есть две десятичные дроби α и β , не равные друг другу, $\alpha \neq \beta$.

В этом случае согласно определению равенства десятичных дробей существует такой номер $n = p$, для которого оценка

$$|(\alpha)_n - (\beta)_n| \leq 10^{-n}$$

неверна. Это означает, что для номера $n = p$ должна выполняться противоположная оцен-

ка, т.е.

$$|(\alpha)_p - (\beta)_p| > 10^{-p}.$$

Заметим, что $10^p \cdot (\alpha)_p$ и $10^p \cdot (\beta)_p$ — это целые числа и в соответствии с выбором номера p модуль расстояния между ними строго больше единицы:

$$|10^p \cdot (\alpha)_p - 10^p \cdot (\beta)_p| > 1.$$

Это возможно лишь в случае, если расстояние между рассматриваемыми целыми числами не меньше двух:

$$|10^p \cdot (\alpha)_p - 10^p \cdot (\beta)_p| \geq 2.$$

Следовательно, для номера p справедлива следующая оценка

$$|(\alpha)_p - (\beta)_p| \geq 2 \cdot 10^{-p}. \quad (1)$$

Лемма 2. Пусть десятичные дроби α и β таковы, что для некоторого номера p справедливо неравенство

$$(\beta)_p - (\alpha)_p > 10^{-p}.$$

Тогда для всех номеров $n > p$ справедлива оценка

$$(\beta)_n - (\alpha)_n > 10^{-p}.$$

Доказательство. Пусть α имеет знак минус, а β имеет знак плюс. Тогда при $n > p$ имеем

$$(\beta)_n - (\alpha)_n \geq (\beta)_p - (\alpha)_p > 10^{-p}.$$

Пусть как α так и β имеют знак плюс. Тогда при $n > p$ имеем

$$\begin{aligned} (\beta)_n - (\alpha)_n &= (\beta)_p - (\alpha)_p \pm \\ &\pm (0, \beta_{p+1} \dots \beta_n - 0, \alpha_{p+1} \dots \alpha_n) \cdot 10^{-p}. \end{aligned}$$

Воспользовавшись оценкой (1), получаем далее

$$(\beta)_n - (\alpha)_n \geq 2 \cdot 10^{-p} - 0,\underbrace{99\dots9}_{(n-p)} \cdot 10^{-p}.$$

Цифра **9**, охваченная в записи выше фигурной скобкой снизу, повторяется $(n - p)$ раз. Вынося сомножитель 10^{-p} , получаем следующую оценку снизу:

$$\begin{aligned} (\beta)_n - (\alpha)_n &\geq (2 - 0,\underbrace{99\dots9}_{(n-p)}) \cdot 10^{-p} = \\ &= 1,00\dots01 \cdot 10^{-p} > 10^{-p}. \end{aligned}$$

Эта оценка справедлива для всех $n \geq p$. □

5⁰. Введем на множестве десятичных дробей отношение порядка, т.е. введем правила их сравнения по величине.

Определение. Десятичная дробь α меньше десятичной дроби β , если существует такой номер n , что

$$(\beta)_n - (\alpha)_n > 10^{-n}.$$

Отметим, что в левой части последнего неравенства берется разность двух рациональных чисел, т.е. величина вполне определенная.

Условие, что α меньше β записывается как $\alpha < \beta$, или же в виде $\beta > \alpha$ (β больше α).

В соответствии с данным определением десятичная дробь $\beta > 0$ тогда и только тогда,

когда β положительна, и дробь $\beta < 0$ тогда и только тогда, когда β отрицательна.

Бинарное отношение $<$ на множестве десятичных дробей обладает следующим свойством.

(P₁). Если $\alpha < \beta$, то $-\alpha > -\beta$.

Доказательство. Пусть $\alpha < \beta$, тогда существует такой номер n , что

$$(\beta)_n - (\alpha)_n > 10^{-n}.$$

Числа $(\beta)_n$ и $(\alpha)_n$ рациональны и, как известно, $(-\beta)_n = -(\beta)_n$ и $(-\alpha)_n = -(\alpha)_n$. Учитывая это и домножая предыдущую оценку на -1 , получаем

$$(-\beta)_n - (-\alpha)_n < -10^{-n}.$$

Домножая это неравенство на -1 , получаем ему противоположное:

$$(-\alpha)_n - (-\beta)_n > 10^{-n}.$$

Это и означает, что $-\alpha > -\beta$.



Определенные отношения $<$ и $>$ обладают свойством *транзитивности*.

Лемма 3 (транзитивность $<$). Пусть есть три десятичные дроби α , β , γ , причем $\alpha < \beta$ и $\beta < \gamma$. Тогда $\alpha < \gamma$.

Доказательство. Пусть $\alpha < \beta$ и $\beta < \gamma$. Тогда по определению существуют два таких номера p и q , что

$$(\beta)_p - (\alpha)_p > 10^{-p}, \quad (\gamma)_q - (\beta)_q > 10^{-q}.$$

Возьмем $n = \max(p, q)$. Тогда по лемме 2 справедливы следующие две оценки

$$(\beta)_n - (\alpha)_n > 10^{-p}, \quad (\gamma)_n - (\beta)_n > 10^{-q}.$$

Все числа в последней строке — это рациональные числа. Их можно складывать и вычитать, пользуясь при этом известными свойствами арифметических операций на множестве \mathbb{Q} . Имеем

$$(\gamma)_n - (\alpha)_n = (\gamma)_n - (\beta)_n + (\beta)_n - (\alpha)_n >$$

$$> 10^{-q} + 10^{-p} > 10^{-n}.$$

Последнее неравенство справедливо в силу выбора n . Итоговая оценка $(\gamma)_n - (\alpha)_n > 10^{-n}$ означает по определению, что $\alpha < \gamma$. □

Исключив из рассмотрения периодические десятичные дроби с периодом 9, получаем следующие три утверждения.

1). Десятичные дроби α и β равны тогда и только тогда когда для любого неотрицательного номера n справедливо равенство $(\alpha)_n = (\beta)_n$.

2). $\alpha < \beta$ тогда и только тогда когда существует такое неотрицательное n что справедливо неравенство $(\alpha)_n < (\beta)_n$.

3). Будем писать $\alpha \leq \beta$, если выполнено одно из двух условий: $\alpha < \beta$ или же $\alpha = \beta$. Отношение $\alpha \leq \beta$ выполняется тогда и только тогда когда для любого неотрицательного n справедливо неравенство $(\alpha)_n \leq (\beta)_n$.

Подчеркнем, что при каждом заданном n десятичные дроби $(\alpha)_n$ и $(\beta)_n$ — это рациональные числа.

Таким образом, в определяющих частях утверждений 1)–3) речь идет об уже заданных на множестве рациональных чисел порядковых отношениях.

Из утверждений 1)–2) заключаем, что для любых двух десятичных дробей α и β выполняется одно и только одно из трех отношений порядка:

$$\alpha < \beta, \quad \alpha = \beta \quad \text{или} \quad \alpha > \beta.$$

Из неравенств $\alpha < \beta$ и $\beta < \gamma$ следует, что $\alpha < \gamma$.
Это означает, что определенное на множестве десятичных дробей отношение $<$ транзитивно.

Множество десятичных дробей с введенными на нем арифметическими операциями и линейным отношением порядка (сравнением любых двух его элементов по величине) называется *множеством вещественных чисел*.

6⁰. Некоторые возникшие на практике вещественные числа имеют свои, исторически установившиеся обозначения, например: $\sqrt{2}$, π , e , Эти особые обозначения сохраняются за соответствующими числами при проведении самых разных операций, например, арифметических. По этой причине удобно предполагать, что множество вещественных чисел \mathbb{R} не совпадает с множеством всех десятичных дробей, а лишь на-

ХОДИТСЯ С НИМ ВО ВЗАИМНО ОДНОЗНАЧНОМ СООТВЕТСТВИИ.

Точнее, удобно предполагать, что каждое вещественное число лишь *изображается* некоторой десятичной дробью, а каждая десятичная дробь *представляет* собой некоторое вещественное число.

Линейная упорядоченность множества десятичных дробей, а значит и множества представляемых ими вещественных чисел, позволяет отождествить эти объекты с точками горизонтальной прямой, на которой выбрано начало отсчета (нуль) и задано положительное направление (вправо от нуля).

Предполагается, что все точки прямой, лежащие правее начала, изображают положительные десятичные дроби, в то время как

все точки, лежащие левее начала, соответствуют отрицательным десятичным дробям.

Оснащенную таким образом прямую называют при этом *числовой прямой*, или *числовой осью*. За ней сохраняется то же самое обозначение \mathbb{R} , что и за множеством вещественных чисел.