

1

Z lineární algebry víme, že lineární zobrazení je jednoznačně určeno obrazy bázových prvků. Bází prostoru S^n je například $\frac{n(n+1)}{2}$ symetrických matic, které mají právě na 2 místech (symetricky) hodnotu 1, pokud jsou tyto místa mimo diagonálu, nebo matice s jednou jedničkou na diagonále. Každou symetrickou matici dokážeme vyjádřit jako lineární kombinaci těchto matic. Bází prostoru S^2 by například byly tyto matice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Položme $k := \frac{n(n+1)}{2}$. Pro $i = 1, \dots, k$: B_i budou prvky báze popsané výše. Pro libovolné $X \in S^n$ tedy existují $i = 1, \dots, k$: $a_i \in \mathbb{R}$: $X = \sum_{i=1}^k a_i B_i$. f je lineární, takže $f(X) = f(\sum_{i=1}^k a_i B_i) = \sum_{i=1}^k a_i f(B_i)$. Označme $i = 1, \dots, k$: $b_i = f(B_i) \in \mathbb{R}$. Z toho, jak je zvolena báze, je zřejmé, že každý prvek a_i je roven nějakému prvku $X_{i,j} = X_{j,i}$. Víme, že platí $\forall C, X \in S^n$: $Tr(CX) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C_{i,j} X_{i,j}$. Protože C, X jsou symetrické, tak sčítance mimo diagonálu ($i \neq j$) $C_{i,j} X_{i,j}$ a $C_{j,i} X_{j,i}$ jsou identické. Důsledkem je, že tuto sumu dokážeme napsat jako sumu $k = n + \frac{n^2-n}{2}$ prvků následovně:

$$Tr(CX) = \sum_{i=1}^n (C_{i,i} X_{i,i}) + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} C_{i,j} X_{i,j}$$

Hledáme tedy matici $C \in S^n$. Porovnáme sčítance v sumách $f(X) = \sum_{i=1}^k a_i b_i$ a $Tr(CX)$ (mají obě k sčítanců). Uvažujme například první sčítanec $C_{1,1} X_{1,1}$ a hledáme jeho odpovídající sčítanec $a_i b_i$. Jak bylo řečeno výše, tak víme, že $\exists i$: $a_i = X_{1,1}$ (jde jen o to jak si a_i zaindexujeme). Musí platit $a_i b_i = X_{1,1} C_{1,1} \implies b_i = C_{1,1}$. Obdobně pro všechny diagonální prvky. Stručně řečeno, na diagonále C jsou obrazy bázových prvků, které jsou diagonální matice. Pro zbylé prvky mimo diagonálu na indexech $i \neq j$ musí platit $\exists k$: $a_k b_k = 2C_{i,j} X_{i,j}$, kde $a_k = X_{i,j} = X_{j,i}$. Z toho plyne, že $C_{i,j} = C_{j,i} = \frac{1}{2} b_i$. Výsledkem je, že na diagonále C jsou obrazy bázových prvků, které jsou diagonální matice, a pro zbylé prvky je to polovina obrazu příslušného bázového prvku, který není diagonální.

$$C = \begin{pmatrix} f(B_{i_1}) & \frac{1}{2}f(B_{i_2}) & \dots \\ \frac{1}{2}f(B_{i_2}) & f(B_{i_3}) & \dots \\ \vdots & \ddots & \ddots \end{pmatrix} \text{ pro příslušné } i_1, i_2, \dots \text{ (záleží na indexování bázových prvků)}$$

2

Definujme kužel $K := \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)^T \in \mathbb{R}^6 : \|(x_1, x_2)^T\| \leq x_3, \|(x_4, x_5)\| \leq x_6\}$. Matice F a vektory g, c budou vypadat:

$$F = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, g = - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Stačí nyní jen nahlédnout, že to odpovídá danému problému. Uvažujme vektor proměnných $y = (y_1, y_2, y_3)$. Podmínka $Fy + g \preceq_K 0$ odpovídá z definice tomu, že vektor

$$v = \begin{pmatrix} y_1 \\ 2y_2 + 2 \\ y_3 \\ 1 \\ y_2 \\ y_1 + 1 \end{pmatrix}$$

je prvkem K . Což nastane právě tehdy, když $\|(y_1, 2y_2 + 2)^T\| \leq y_3 \wedge \|(1, y_2)^T\| \leq y_1 + 1$. Což kopíruje podmínky zadání ($y_1 = x_1, y_2 = x_2, y_3 = t$). Minimalizujeme poslední složku vektoru y , tedy y_3 neboli t .

3

Označíme si daných 14 předmětů čísla od 1 do 14 (1. je mapa a 14. je motorová pila). Proměnná u_i bude značit „efektivitu“ i . předmětu v dz, w_i jeho váhu v kg a $b_i \in [0, 1]$ bude značit kolik daného předmětu si vybereme (1 odpovídá celému předmětu). Chceme maximalizovat $\sum_{i=1}^{14} b_i u_i = b^T u$ (celkovou efektivitu vybraných předmětů). Pokud problém vyjádříme jako LP problém tak to bude vypadat takto:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} \quad -b^T u \\ &\text{s. t.} \quad b \preceq 1 \\ &\quad \quad -b \preceq 0 \\ &\quad \quad b^T w \leq 10 \end{aligned}$$

První 2 podmínky zaručují, aby hodnoty b_i byly v intervalu $[0, 1]$. Poslední podmínka zaručuje, aby součet vah vybraných předmětů nepřekročil 10 kg.

Optimální řešení nám dává efektivitu ≈ 25.88 . Ručně jsem našel řešení (spočítáním poměru „váha výkon“ u každého předmětu a vybíráním od nejlepšího) 1x mapa, 1x baterie, 1x kytara, 1x katana a 1x Jarník. Toto řešení má efektivitu 23. Samozřejmě optimální řešení nerelaxed problému by vyžadovalo vyzkoušení všech kombinací.