

1

2

Máme $a \in \mathbb{R}^n$. Zvolme $x \in \mathbb{R}^n$ a dokážeme, že $x^T(aa^T)x \geq 0$ neboli $aa^T \in S_+^n$. Platí:

$$x^T(aa^T)x = (a^T x)^T(a^T x) = \|a^T x\|^2$$

Máme tedy euklidovskou normu vektoru pro kterou platí, že je vždy nezáporná, takže $\forall x, a \in \mathbb{R}^n : x^T(aa^T)x \geq 0 \iff \|a^T x\|^2 \geq 0$.

3

- a) Množina je jednotková kružnice. Tato množina není konvexní, jelikož například bod $0,5 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0,5 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ je konvexní kombinací bodů z této množiny, ale není na jednotkové kružnici.
- b) Z podmínky lze vyvodit, že každý bod v této množině musí mít kladné obě souřadnice neboli je to množina \mathbb{R}_{++}^2 . Tato množina je konvexní, jelikož to je vlastně 1. kvadrant bez os. Množina není konvexní kužel, jelikož neobsahuje počátek.
- c) Tato množina popisuje poloprostor, který obsahuje počátek. Je to opět konvexní množina. Obsahuje ale například bod $\begin{pmatrix} \frac{2}{10} & \frac{-1}{10} & \frac{7}{10} \end{pmatrix}^T$, což je $\frac{1}{10}$ násobek bodu ze

zadání. Tudíž leží na stejné přímce, která prochází počátkem, ale daný poloprostor jí neobsahuje celou. Takže to není kužel.

- d) Množina není konvexní. Matice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ jsou prvky dané množiny, ale jejich konvexní kombinace

$$0,5 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 0,5 \cdot \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Má zřejmě nulový determinant.

4

1. Necht' $x, y \in \sqrt{2}A \implies \exists a_1, a_2 \in A : x = \sqrt{2}a_1, y = \sqrt{2}a_2$. Zvolme $\lambda \in [0, 1]$ a dokážeme, že $\lambda x + (1 - \lambda)y \in \sqrt{2}A \iff \exists c \in A : \lambda x + (1 - \lambda)y = \sqrt{2}c$.

$$\lambda x + (1 - \lambda)y = \lambda\sqrt{2}a_1 + (1 - \lambda)\sqrt{2}a_2 = \sqrt{2}(\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2)$$

$a_1, a_2 \in A$, kde A je konvexní, takže položíme $c := \lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2 \in A$.

2. Necht' $x, y \in A + B \implies \exists a_1, a_2 \in A, b_1, b_2 : x = a_1 + b_1, y = a_2 + b_2$. Zvolme $\lambda \in [0, 1]$ a dokážeme, že $\lambda x + (1 - \lambda)y \in A + B \iff \exists c_1 \in A, c_2 \in B : \lambda x + (1 - \lambda)y = c_1 + c_2$.

$$\lambda x + (1 - \lambda)y = \lambda(a_1 + b_1) + (1 - \lambda)(a_2 + b_2) = (\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2) + (\lambda b_1 + (1 - \lambda)b_2)$$

A, B jsou konvexní množiny, takže $\lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2 \in A, \lambda b_1 + (1 - \lambda)b_2 \in B$. Položíme $c_1 := \lambda a_1 + (1 - \lambda)a_2, c_2 := \lambda b_1 + (1 - \lambda)b_2$.

5

Ze zadání plyne, že se nám nikdy nevyplatí kupovat C za 80kč, když si jí můžeme vyrobit za 30kč ($3B = 1C$). Označme x_1 počet kg suroviny A , které nakoupíme, x_2 počet kg suroviny B , které nakoupíme a x_3 počet kg suroviny D , které nám zbydou po reakcích. Definujme funkci $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1 + 10x_2 + x_3$, která nám počítá celkovou cenu výroby. Chceme minimalizovat f .