

DEVOIR À LA MAISON N°21

- Le devoir devra être rédigé sur des copies *doubles*.
- Les copies ne devront comporter ni rature, ni renvoi, ni trace d'effaceur.
- Toute copie ne satisfaisant pas à ces exigences devra être intégralement réécrite.

Problème 1 – E3A 2000 PC – Mathématiques 3

L'épreuve est constituée de trois parties, et propose l'étude de quelques propriétés de la fonction J_0 de Bessel (utilisée notamment en physique).

I Etude de la fonction $J = J_0$ de Bessel. Développement en série entière

1 Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $J(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin(\theta)) \, d\theta$.

1.a Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$J(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(x \sin(\theta)) \, d\theta = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos(x \sin(\theta)) \, d\theta$$

1.b Montrer que la fonction $J : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ainsi définie est continue, paire et de classe \mathcal{C}^2 sur \mathbb{R} .

1.c Justifier que J est bornée sur \mathbb{R} .

1.d Justifier l'encadrement :

$$\forall \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad \frac{2\theta}{\pi} \leq \sin(\theta) \leq \theta$$

En déduire un encadrement de $J(x)$ pour $x \in]0, 2]$.

1.e Préciser les valeurs de $J(0)$ et $J'(0)$. Montrer que J est strictement décroissante sur $[0, \pi]$.

2 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose : $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{2n}(\theta) \, d\theta$.

2.a Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N} : (2n+1)I_n = 2(n+1)I_{n+1}$.

2.b En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N} : I_n = \frac{(2n)! \pi}{(n!)^2 2^{2n+1}}$.

3 **3.a** Rappeler le développement en série entière de la fonction \cos et son rayon de convergence. En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ fixé, l'application $x \mapsto \cos(x \sin(\theta))$ est développable en série entière sur \mathbb{R} , et préciser ce développement.

3.b En déduire que J est développable en série entière sur \mathbb{R} , avec :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad J(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{4^n (n!)^2} x^{2n}$$

(on précisera le théorème du cours utilisé pour l'intégration terme à terme).

Les deux parties suivantes sont indépendantes.

II Etude d'une équation différentielle

4 Vérifier que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, x(J(x) + J''(x)) + J'(x) = 0$$

5 Montrer que l'ensemble des applications de \mathbb{R} vers \mathbb{R} , développables en série entière sur \mathbb{R} et solutions sur \mathbb{R} de l'équation différentielle : $xy'' + y' + xy = 0$, est un espace vectoriel réel de dimension 1, engendré par J .

6 Soit $K \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$, solution sur \mathbb{R}_+^* de l'équation différentielle : $xy'' + y' + xy = 0$.
Pour tout $x > 0$ on pose : $W(x) = J'(x)K(x) - J(x)K'(x)$.

Montrer que $W \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$, et est telle que pour tout $x > 0$, on ait : $W'(x) = -\frac{1}{x}W(x)$.

En déduire la forme de W .

7 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

7.a Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{H_{n+1}}{H_n} = 1$.

7.b Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose : $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1} H_n}{4^n (n!)^2} x^{2n}$.

Vérifier que le rayon de convergence de cette série entière est bien égal à $+\infty$.

Pour tout réel x , expliciter (sous forme d'une série entière simple) la valeur de l'expression $x\varphi''(x) + \varphi'(x) + x\varphi(x)$ et la comparer avec $-2J'(x)$.

7.c Pour tout $x > 0$, on pose : $K(x) = \ln(x)J(x) + \varphi(x)$.

Vérifier que K est solution sur \mathbb{R}_+^* de l'équation différentielle : $xy'' + y' + xy = 0$, et expliciter la fonction W associée définie au 6.

Que peut-on en déduire ?

III Usage de la transformation de Laplace

8 8.a Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, et tout $y > 0$:

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-xy} dx = \frac{n!}{y^{n+1}}$$

8.b Montrer que pour tout $y > 0$, on a :

$$\int_0^{+\infty} e^{-xy} J(\sqrt{x}) dx = \frac{1}{y} e^{-1/4y}$$

(on pourra commencer par justifier l'existence de cette intégrale en utilisant par exemple le 1.c, puis le développement en série entière de J vu en 3.b en précisant le théorème du cours utilisé pour l'intégration terme à terme).

9 9.a Justifier pour $y > 0$ l'existence de $L(y) = \int_0^{+\infty} e^{-xy} J(x) dx$.

9.b Montrer que la fonction L ainsi définie est une application continue sur $]0, +\infty[$ vérifiant $\lim_{y \rightarrow +\infty} L(y) = 0$.

10 10.a Déterminer et justifier le développement en série entière sur $] -1, 1[$ de la fonction $h : u \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+u^2}}$.

10.b Utiliser le développement en série entière de J vu au 3.b afin de montrer que, pour tout $y \in]1, +\infty[$,
$$L(y) = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}.$$

11 Soit $y > 0$ fixé.

11.a Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose : $L_n(y) = \int_0^n e^{-xy} J(x) dx$. Montrer que :

$$|L_n(y) - L(y)| \leq \frac{e^{-ny}}{y}$$

11.b En remarquant que $\frac{\pi}{2} L_n(y) = \operatorname{Re} \left(\int_0^{\pi/2} \left(\int_0^n e^{x(-y+i \sin(\theta))} dx \right) d\theta \right)$, montrer que :

$$\frac{\pi}{2} L_n(y) = \operatorname{Re} \left(\int_0^{\pi/2} \frac{e^{n(-y+i \sin(\theta))}}{-y + i \sin(\theta)} d\theta + \int_0^{\pi/2} \frac{1}{y - i \sin(\theta)} d\theta \right)$$

11.c Montrer que

$$\left| \int_0^{\pi/2} \frac{e^{n(-y+i \sin(\theta))}}{-y + i \sin(\theta)} d\theta \right| \leq \frac{\pi}{2} \frac{e^{-ny}}{y}$$

11.d Par un passage à la limite, en déduire que, pour tout $y > 0$, on a :

$$L(y) = \frac{2y}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{y^2 + \sin^2(\theta)} d\theta = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$$

(on pourra utiliser le changement de variable défini par $u = \tan(\theta)$).