

## 1 Cours

### Réduction algébrique

**Polynômes d'endomorphismes** Définition. Algèbre commutative  $\mathbb{K}[u]$  pour  $u \in \mathcal{L}(E)$  et  $\mathbb{K}[A]$  pour  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Polynômes annulateurs** Définition. Les valeurs propres sont **des** racines d'un polynôme annulateur. Lemme des noyaux. Une matrice/un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si il admet un polynôme annulateur scindé à racines simples. Si un endomorphisme est diagonalisable, tout endomorphisme induit l'est également. Théorème de Cayley-Hamilton. Une matrice/un endomorphisme est trigonalisable si et seulement si il admet un polynôme annulateur scindé. Si  $u \in \mathcal{L}(E)$  est trigonalisable, il existe des sous-espaces supplémentaires sur lesquels les endomorphismes induits par  $u$  sont la somme d'une homothétie et d'un endomorphisme nilpotent. Interprétation matricielle.

**Sous-espaces caractéristiques** Sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme ou d'une matrice à polynôme caractéristique scindé. Les sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme d'un espace vectoriel  $E$  à polynôme caractéristique scindé sont supplémentaires dans  $E$ . Dimension d'un sous-espace caractéristique. Toute matrice à polynôme caractéristique scindé est semblable à une matrice diagonale par blocs dont les blocs diagonaux sont triangulaires et à coefficients diagonaux tous égaux.

**Polynômes minimaux** Idéal annulateur d'une matrice/d'un endomorphisme. Polynôme minimal d'une matrice/d'un endomorphisme. Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Le spectre est l'ensemble des racines du polynôme minimal. Une matrice/un endomorphisme est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racines simples. Une matrice/un endomorphisme est trigonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé. Si  $u$  est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie et  $d = \deg \pi_u$ , alors  $\dim \mathbb{K}[u] = d$  et  $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$  est une base de  $\mathbb{K}[u]$ . Si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $d = \deg \pi_A$ , alors  $\dim \mathbb{K}[A] = d$  et  $(A^k)_{0 \leq k \leq d-1}$  est une base de  $\mathbb{K}[A]$ .

### Suites de fonctions

**Modes de convergence** Convergence simple. Convergence uniforme. La convergence uniforme entraîne la convergence simple.

### Théorèmes d'interversion

- Théorème de la double limite : si  $(f_n)$  converge uniformément vers une fonction  $f$  sur un intervalle  $I$ , et si pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $f_n$  admet une limite  $\ell_n$  en  $a \in \bar{I}$ , alors  $(\ell_n)$  admet une limite,  $f$  admet une limite en  $a$  et  $\lim_a f = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ell_n$ .
- Continuité : si  $(f_n)$  est une suite de fonctions continues sur un intervalle  $I$  convergeant uniformément vers une fonction  $f$  sur  $I$ , alors  $f$  est continue sur  $I$ . Il suffit en fait d'avoir la convergence uniforme sur tout segment.
- Primitivisation : si  $(f_n)$  est une suite de fonctions continues convergeant uniformément vers une fonction  $f$  sur tout segment d'un intervalle  $I$ , alors, pour tout  $a \in I$ ,  $\left(x \mapsto \int_a^x f_n(t) dt\right)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément vers  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  sur tout segment de  $I$ .
- Intégration : si  $(f_n)$  est une suite de fonctions continues convergeant uniformément vers une fonction  $f$  sur le segment  $[a, b]$ , alors  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(t) dt = \int_a^b f(t) dt$ .
- Dérivation : si  $(f_n)$  est une suite de fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  convergeant simplement vers une fonction  $f$  sur un intervalle  $I$  et si  $(f'_n)$  converge uniformément vers une fonction  $g$  sur tout segment de  $I$ , alors  $f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $I$  et  $f' = g$ . Adaptation aux fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$ .

## 2 Méthodes à maîtriser

- Déterminer des valeurs propres à l'aide d'un polynôme annulateur.
- Caractériser la diagonalisabilité/trigonalisabilité à l'aide d'un polynôme annulateur.
- Automatisme :  $P(u) = 0 \iff \pi_u \mid P$ .
- Calculer l'inverse d'une matrice à l'aide d'un polynôme annulateur.
- Calculer les puissances d'une matrice à l'aide d'un polynôme annulateur (division euclidienne de  $X^n$  par un polynôme annulateur  $P$  puis considérer les racines de  $P$ ).
- Déterminer le polynôme minimal d'une matrice : il divise le polynôme caractéristique et il admet pour racines les valeurs propres, ce qui ne laisse qu'un nombre fini de possibilités.
- Montrer qu'une suite de fonctions  $(f_n)$  converge simplement : étude de la suite numérique  $(f_n(x))$  à  $x$  fixé (éventuellement une suite récurrente suivant la définition de la suite de fonctions).

- Montrer qu'une suite de fonctions  $(f_n)$  converge uniformément :
  1. Montrer que  $(f_n)$  converge simplement vers une fonction  $f$ .
  2. Montrer que  $\|f_n - f\|_\infty$  tend vers 0 lorsque  $n$  tend vers  $+\infty$  : pour cela, on peut
    - étudier  $f_n - f$  pour déterminer explicitement  $\sup |f_n - f|$  ;
    - majorer  $|f_n(x) - f(x)|$  par une quantité indépendante de  $x$  tendant vers 0 quand  $n$  tend vers  $+\infty$ .
- Pour montrer qu'une suite de fonctions ne converge pas uniformément, on peut au choix :
  - Calculer explicitement  $\|f_n - f\|_\infty$ , où  $f$  est la limite simple de  $(f_n)$ , et montrer que cette quantité ne tend pas vers 0.
  - Déterminer une suite  $(x_n)$  telle que  $f_n(x_n) - f(x_n)$  ne tend pas vers 0.
  - Mettre en défaut l'un des théorèmes d'«interversión» : par exemple, les  $f_n$  sont continues mais  $f$  ne l'est pas.

### 3 Questions de cours

**Banque CCP** Exos 91, 9, 10, 11, 12