

## 2019 年秋季《高等微积分 1》期末考试试题

2020 年 1 月 5 日 8:00-10:00

本试卷分两页, 共七道试题, 各题分值如下: 第 1 题 5 + 5; 第 2 题 5 + 10; 第 3, 7 题每小问 5 分; 第 4 题 7 + 8; 第 5, 6 题 5 + 10 分.

1 设  $f(x)$  是次数为  $n$  的多项式 ( $n \geq 1$ ). 令

$$F(x) = f(x) + f^{(1)}(x) + \dots + f^{(n)}(x).$$

(1) 计算  $e^{-x}F(x)$  的导函数.

(2) 证明: 对任何实数  $x$ , 有

$$\int_0^x f(t)e^{-t}dt = F(0) - e^{-x}F(x).$$

解. (1) 由于  $f$  是  $n$  次多项式, 它的  $n+1$  阶导函数  $f^{(n+1)}(x)$  恒等于 0. 这样, 直接求导可得

$$\begin{aligned}(e^{-x}F(x))' &= \sum_{i=0}^n (e^{-x}f^{(i)}(x))' = \sum_{i=0}^n \left( -e^{-x}f^{(i)}(x) + e^{-x}f^{(i+1)}(x) \right) \\ &= e^{-x}f^{(n+1)}(x) - e^{-x}f(x) = -e^{-x}f(x).\end{aligned}$$

(2) 由 (1) 的结论, 利用 Newton-Leibniz 公式, 可得

$$\int_0^x e^{-t}f(t)dt = (-e^{-t}F(t)) \Big|_0^x = F(0) - e^{-x}F(x).$$

□

2 (1) 计算极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\tan x - x}$ .

(2) 设  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  是连续函数, 满足

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 1}, \quad \forall x \neq 0.$$

求  $f(x)$  在  $x = 0$  附近展开至二阶的带皮亚诺余项的泰勒公式, 即要求余项是  $o(x^2)$ .

解. (1) 熟知当  $x \rightarrow 0$  时,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3),$$

由此可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{6}.$$

另一方面, 利用  $\frac{0}{0}$  型洛必达法则可得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{3x^2 \cos^2 x} = \frac{1}{3}.$$

结合这两方面, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{\tan x - x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} (x - \sin x)/x^3}{\lim_{x \rightarrow 0} (\tan x - x)/x^3} = \frac{1}{2}.$$

(2) 由  $f$  在  $x = 0$  处连续, 有

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} = 1, \quad (1 \text{ 分}).$$

由此可知

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{e^x - 1} - 1}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x - e^x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x - e^x}{x^2} \cdot \frac{x}{e^x - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x - \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x - 1} \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 1 = -\frac{1}{2}, \quad (2 \text{ 分}). \end{aligned}$$

下面来计算  $f''(0)$ . 首先, 有

$$f'(x) = \frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2}, \quad \forall x \neq 0, \quad (2 \text{ 分})$$

由此可得

$$\begin{aligned} f''(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1 - xe^x}{(e^x - 1)^2} + \frac{1}{2}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - xe^x + \frac{1}{2}(e^x - 1)^2}{x^3} \cdot \left(\frac{x}{e^x - 1}\right)^2 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - xe^x + \frac{1}{2}(e^x - 1)^2}{x^3}. \end{aligned}$$

利用带 Peano 余项的 Taylor 公式, 有

$$\begin{aligned} &e^x - 1 - xe^x + \frac{1}{2}(e^x - 1)^2 \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3) - x \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^2 \\ &= \frac{1}{6}x^3 + o(x^3), \end{aligned}$$

代入  $f''(0)$  的表达式, 即得  $f''(0) = \frac{1}{6}$ , ( $f''(0)$  的计算共 4 分).

这样,  $f$  在  $x = 0$  处有二阶导数, 由带 Peano 余项的 Taylor 公式, 当  $x \rightarrow 0$  时有

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{12}x^2 + o(x^2), \quad (1 \text{ 分}). \end{aligned}$$

□

3 考虑如下反常积分

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt.$$

(1) 对怎样的  $x$ , 上述反常积分收敛? 请证明你的断言.

(2) 证明: 对  $x > 0$ , 有  $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ .

(3) 证明: 对  $x > 0$ , 有

$$\Gamma(x) = 2 \int_0^\infty s^{2x-1} e^{-s^2} ds.$$

解. (1) 原点可能是瑕点, 我们分别考虑瑕积分  $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$  及无穷积分  $\int_1^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$  的收敛性.

(1.a) 瑕积分的收敛性. 注意到

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t^{x-1} e^{-t}}{t^{x-1}} = 1,$$

由比较定理的极限形式可知: 瑕积分  $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$  与  $\int_0^1 t^{x-1} dt$  有相同的收敛发散性, 当且仅当  $x - 1 > -1$  时收敛. 所以, 当且仅当  $x > 0$  时, 瑕积分  $\int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt$  收敛.

(1.b) 无穷积分的收敛性. 注意到

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{x-1} e^{-t}}{t^{-2}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^{x+1}}{e^t} = 0,$$

由比较定理的极限形式可知, 对任何实数  $x$ , 无穷积分  $\int_1^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$  都收敛.

结合这两方面, 反常积分

$$\int_0^\infty t^{x-1} e^{-t} dt = \int_0^1 t^{x-1} e^{-t} dt + \int_1^\infty t^{x-1} e^{-t} dt$$

收敛当且仅当  $x > 0$ .

(2) 对任何  $y > 0$ , 有

$$\begin{aligned} \Gamma(y) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_\epsilon^1 t^{y-1} e^{-t} dt + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A t^{y-1} e^{-t} dt \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_\epsilon^1 t^{y-1} e^{-t} dt + \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_1^{1/\epsilon} t^{y-1} e^{-t} dt \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_\epsilon^{1/\epsilon} t^{y-1} e^{-t} dt. \end{aligned}$$

利用分部积分, 对  $x > 0$ , 有

$$\begin{aligned} \Gamma(x+1) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_\epsilon^{1/\epsilon} t^x e^{-t} dt \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \int_\epsilon^{1/\epsilon} t^x (-e^{-t})' dt \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left( t^x (-e^{-t}) \Big|_\epsilon^{1/\epsilon} + \int_\epsilon^{1/\epsilon} x t^{x-1} e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left( \epsilon^x e^{-\epsilon} - (1/\epsilon)^x e^{-1/\epsilon} \right) + x \Gamma(x) \\ &= x \Gamma(x), \end{aligned}$$

其中最后一步用到了常用的极限: 当  $x > 0$  时  $\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \epsilon^x = 0$ ; 对任何  $x$  有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0+} (1/\epsilon)^x e^{-1/\epsilon} = \lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{A^x}{e^A} = 0.$$

(3) 令  $t = s^2$  换元, 可得

$$\begin{aligned} \Gamma(x) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left( \int_{\epsilon}^{1/\epsilon} t^{x-1} e^{-t} dt \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left( \int_{\sqrt{\epsilon}}^{1/\sqrt{\epsilon}} s^{2(x-1)} e^{-s^2} d(s^2) \right) \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \left( 2 \int_{\sqrt{\epsilon}}^{1/\sqrt{\epsilon}} s^{2x-1} e^{-s^2} ds \right) \\ &= 2 \int_0^{\infty} s^{2x-1} e^{-s^2} ds. \end{aligned}$$

□

4 (1) 求幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$  的收敛半径, 其中  $(2n+1)!! = (2n+1) \cdot (2n-1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 1$  表示双阶乘.

(2) 证明:  $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x^2}$  是  $\mathbf{R}$  上的可导函数.

解. (1) 对每个  $x$ , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!!} \right|}{\left| \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^2}{2n+3} = 0,$$

由达朗贝尔判别法可知幂级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!!}$  在  $\mathbf{R}$  上处处绝对收敛, 由此可知其收敛半径为  $R = +\infty$ .

(共 7 分, 其中答案 2 分, 具体证明过程 5 分)

(2) 对每个  $x \in \mathbf{R}$ , 有  $\frac{1}{n^2+x^2} \leq \frac{1}{n^2}$ . 熟知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  收敛, 由比较定理可知函数级数

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$  在  $\mathbf{R}$  上点点收敛.

(证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$  点点收敛 3分)

注意到

$$\left| \left( \frac{1}{n^2+x^2} \right)' \right| = \frac{2|x|}{(n^2+x^2)^2} = \frac{2n|x|}{n(n^2+x^2)^2} \leq \frac{n^2+x^2}{n(n^2+x^2)^2} \leq \frac{1}{n^3}, \quad \forall x \in \mathbf{R},$$

熟知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$  收敛, 由 Weierstrass 强级数判别法可知函数级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2+x^2} \right)'$

在  $\mathbf{R}$  上一致收敛. 这样, 函数级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+x^2}$  在  $\mathbf{R}$  上可逐项求导, 其和函数是  $\mathbf{R}$  上的可导函数.

(证明  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n^2+x^2} \right)'$  一致收敛 5分)

□

5 (1) 计算不定积分  $\int \frac{dx}{x^4-1}$ .

(2) 设  $a, b$  是给定的正数. 计算定积分

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}.$$

解. (1) 注意到

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^4-1} &= \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{x^2-1} - \frac{1}{x^2+1} \right) \\ &= \frac{1}{4(x-1)} - \frac{1}{4(x+1)} - \frac{1}{2(x^2+1)}, \end{aligned}$$

由此可得

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^4-1} &= \int \frac{dx}{4(x-1)} - \int \frac{dx}{4(x+1)} - \int \frac{dx}{2(x^2+1)} \\ &= \frac{\ln|x-1|}{4} - \frac{\ln|x+1|}{4} - \frac{\arctan x}{2} + C. \end{aligned}$$

(2) 答案为  $\frac{2\pi}{\sqrt{ab}}$ .

首先, 利用周期性以及换元公式可得

$$\begin{aligned}
 \int_0^{2\pi} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} \\
 &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(y+\pi)}{a \cos^2(y+\pi) + b \sin^2(y+\pi)} \\
 &= 2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}.
 \end{aligned}$$

其次, 计算不定积分

$$\begin{aligned}
 \int \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} &= \int \frac{d \tan x}{a + b \tan^2 x} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{ab}} \int \frac{d\sqrt{\frac{b}{a}} \tan x}{1 + (\sqrt{\frac{b}{a}} \tan x)^2} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{ab}} \arctan(\sqrt{\frac{b}{a}} \tan x) + C.
 \end{aligned}$$

令  $F(x) = \frac{1}{\sqrt{ab}} \arctan(\sqrt{\frac{b}{a}} \tan x)$ , 它是  $f(x) = \frac{1}{a \cos^2 x + b \sin^2 x}$  在  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  上的原函数. 注意到

$$\lim_{x \rightarrow \pm \frac{\pi}{2}} F(x) = \pm \frac{\pi}{2\sqrt{ab}},$$

可把  $F$  扩充为  $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$  上的连续函数

$$\tilde{F}(x) = \begin{cases} F(x), & \text{如果 } x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \\ \pm \frac{\pi}{2\sqrt{ab}}, & \text{如果 } x = \pm \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

利用 Newton-Leibniz 公式可得

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \tilde{F}(x) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{\sqrt{ab}}.$$

结合这两部分结果, 即得

$$\int_0^{2\pi} \frac{dx}{a \cos^2 x + b \sin^2 x} = \frac{2\pi}{\sqrt{ab}}.$$

□

6 (1) 设  $\beta$  满足  $0 < \beta < 1$ . 判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 - \frac{\beta}{n})$  的收敛发散性, 请证明你的断言.

(2) 给定实数  $\alpha$ , 定义数列

$$x_n = \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

判断级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  的收敛发散性, 请证明你的断言.

解. (1) 注意到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\ln(1 - \frac{\beta}{n})|}{\beta/n} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{-\ln(1-x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1/(1-x)}{1} = 1,$$

熟知级数  $\sum \frac{\beta}{n}$  发散, 利用正项级数的比较定理可知  $\sum |\ln(1 - \frac{\beta}{n})|$  发散, 所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 - \frac{\beta}{n}) = -\sum |\ln(1 - \frac{\beta}{n})|$$

也是发散的.

(2) 当  $\alpha \leq -1$  时, 有

$$|x_n| = \frac{|\alpha| \cdot (|\alpha|+1) \cdot \dots \cdot (|\alpha|+n-1)}{n!} \geq 1,$$

则  $\{x_n\}$  不可能收敛到零, 此时  $\sum x_n$  发散.

当  $\alpha > -1$  时, 如果  $\alpha$  是非负整数,  $x_n$  从某项起恒为零, 相应的级数  $\sum x_n$  收敛. 以下假设  $\alpha$  不是非负整数, 此时每项  $x_n$  都不等于零, 有

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} = \frac{n-\alpha}{n+1} < 1,$$

即  $|x_n|$  递减. 我们断言  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$ , 这样由于  $\sum x_n$  从某项开始是交错级数, 利用 Leibniz 定理可知此时级数  $\sum x_n$  收敛.

最后我们来证明前述断言. 记  $\beta = 1 + \alpha > 0$ , 注意到

$$\begin{aligned} |x_n| &= \left| \frac{-\alpha}{1} \right| \cdot \left| \frac{1-\alpha}{2} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{n-1-\alpha}{n} \right| \\ &= \left| \frac{1-\beta}{1} \right| \cdot \dots \cdot \left| \frac{n-\beta}{n} \right| \\ &= \left| \left(1 - \frac{\beta}{1}\right) \right| \cdot \dots \cdot \left| \left(1 - \frac{\beta}{n}\right) \right| \end{aligned}$$



取正整数  $k$  使得  $1 - \frac{\beta}{k+1} > 0$ , 则对  $n \geq k+1$  有

$$|x_n| = \left( \prod_{i=1}^k \left| 1 - \frac{\beta}{i} \right| \right) \cdot \left( \prod_{i=k+1}^n \left( 1 - \frac{\beta}{i} \right) \right) = C \prod_{i=k+1}^n \left( 1 - \frac{\beta}{i} \right). \quad (1)$$

利用函数  $e^x$  的 Taylor 公式, 有

$$e^{-y} = 1 - y + \frac{e^\xi}{2} y^2 \geq 1 - y,$$

代入 (1) 式即得

$$|x_n| \leq C \prod_{i=k+1}^n e^{-\beta/i} = C e^{-\beta(\frac{1}{k+1} + \dots + \frac{1}{n})} \rightarrow 0, \quad \text{as } n \rightarrow \infty.$$

总结一下, 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  收敛当且仅当  $\alpha > -1$ .

□

7 设  $n$  是正整数.

(1) 计算定积分

$$K_n = \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx.$$

(2) 对  $n$  用归纳法, 证明:  $K_n \geq \frac{4}{3\sqrt{n}}$ .

(3) 设  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  是连续函数, 满足对任何  $x \notin [0, 1]$  都有  $f(x) = 0$ . 对每个正整数  $n$ , 记  $Q_n(t) = (1 - t^2)^n$ , 定义函数

$$P_n(x) = \frac{1}{K_n} \int_0^1 f(t) Q_n(t - x) dt, \quad \forall x \in [0, 1].$$

证明: 函数序列  $\{P_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  在  $[0, 1]$  上一致收敛到  $f(x)$ .

解. (1) 令  $x = \cos \alpha$  进行换元, 可得

$$K_n = 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx = 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (\sin^2 \alpha)^n d(\cos \alpha) = 2I_{2n+1},$$

其中  $I_m = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m \alpha d\alpha$ , 满足递推式  $I_m = \frac{m-1}{m} I_{m-2}$ . 由此可得

$$K_n = 2I_{2n+1} = 2 \cdot \frac{2n}{2n+1} \cdot \dots \cdot \frac{2}{3} I_1 = \frac{2 \cdot (2n)!!}{(2n+1)!!}.$$

(2) 对  $n$  用归纳法.  $n=1$  时,  $K_1 = \frac{4}{3} = \frac{4}{3\sqrt{1}}$  时, 不等式显然成立. 假设  $n=m$  时有  $K_m \geq \frac{4}{3\sqrt{m}}$ , 则  $n=m+1$  时有

$$K_{m+1} = \frac{2m+2}{2m+3} \cdot K_m \geq \frac{2m+2}{2m+3} \cdot \frac{4}{3\sqrt{m}}.$$

下面来证明  $\frac{2m+2}{2m+3} \cdot \frac{4}{3\sqrt{m}} \geq \frac{4}{3\sqrt{m+1}}$ , 这是显然的, 因为它等价于

$$\left( \frac{2m+2}{2m+3} \right)^2 \geq \frac{m}{m+1} \iff 3m+4 \geq 0,$$

后者显然成立. 这就完成了归纳证明.

(3) 令  $t-x=s$  进行换元, 可得

$$P_n(x) = \frac{1}{K_n} \int_{-x}^{1-x} f(x+s) Q_n(s) ds = \frac{1}{K_n} \int_{-1}^1 f(x+s) Q_n(s) ds,$$

由此可得, 对任何  $x \in [0, 1]$  有

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{K_n} \int_{-1}^1 f(x+s) Q_n(s) ds - \frac{1}{K_n} \int_{-1}^1 f(x) Q_n(s) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{K_n} \int_{-1}^1 |f(x+s) - f(x)| \cdot Q_n(s) ds \\ &= \frac{1}{K_n} \int_{-1}^1 \star. \end{aligned} \tag{2}$$

注意到  $f$  是  $[-1, 2]$  上的连续函数, 则在该区间上一致连续, 这样对任何  $\epsilon > 0$ , 存在  $\delta > 0$ , 使得对任何  $x_1, x_2 \in [-1, 2]$ , 只要  $|x_1 - x_2| < \delta$ , 则有  $|f(x_1) - f(x_2)| < \epsilon$ . 设

$|f|$  在  $[-1, 2]$  上的最大值为  $M$ , 则由 (1) 式, 对任何  $x \in [0, 1]$  有

$$\begin{aligned}
|P_n(x) - f(x)| &\leq \frac{1}{K_n} \int_{-1}^{-\delta} \star + \frac{1}{K_n} \int_{-\delta}^{\delta} \star + \frac{1}{K_n} \int_{\delta}^1 \star \\
&\leq \frac{1}{K_n} \int_{-1}^{-\delta} 2MQ_n(s)ds + \frac{1}{K_n} \int_{-\delta}^{\delta} \epsilon Q_n(s)ds + \frac{1}{K_n} \int_{\delta}^1 2MQ_n(s)ds \\
&\leq \frac{1}{K_n} \int_{-1}^{-\delta} 2M(1 - \delta^2)^n ds + \frac{1}{K_n} \int_{-\delta}^{\delta} \epsilon Q_n(s)ds + \frac{1}{K_n} \int_{\delta}^1 2M(1 - \delta^2)^n ds \\
&\leq \frac{1}{K_n} \cdot 4M(1 - \delta^2)^n + \epsilon \\
&\leq \frac{1}{K_n} \cdot 4M(1 - \delta^2)^n + \epsilon \\
&\leq \frac{3\sqrt{n}}{4} \cdot 4M(1 - \delta^2)^n + \epsilon,
\end{aligned}$$

当  $n$  充分大时,  $\frac{3\sqrt{n}}{4} \cdot 4M(1 - \delta^2)^n \leq \epsilon$ , 从而有

$$|P_n(x) - f(x)| \leq 2\epsilon, \quad \forall x \in [0, 1],$$

这就完成了证明. □