## 习题课材料(二)

## 1 随机变量

习题 1. C 应该取何值,才能使下列数列成为概率分布:  $(1)p_k = \frac{C}{N}$ ,  $k = 1, 2, \dots, N$ ;  $(2)p_k = C\frac{\lambda^k}{L}$ ,  $k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$ .

习题 2. (随机游走问题) 考虑 x 轴上的一个质点,它只能位于整数点,时刻 0 位于原点。每隔单位时间分别以概率 p 向正方向移动一个单位,以概率 q=1-p 向负方向移动一个位置。(1)记  $S_n$  为它在时刻 t=n 时的位置,试求  $S_n$  的分布。(2)假定质点在 t=0 时位于 x=a,在 x=0 和 x=a+b 处各有一个吸收壁,求质点被 x=0 被吸收的概率。(a,b 都是正整数)

## 2 期望方差

习题 3. 一台设备由三大部件组成,在设备运转中各部件需要调整的概率分别是 0.1,0.2 和 0.3。假设各个部件的运转是相互独立的,以 X 表示同时需要调整的部件数,试求 X 的期望和方差。

习题 4. 一辆公共汽车上共有 25 名乘客,每个乘客都等可能的在 9 个车站中的任一站下车,并且他们下车与否相互独立,又知公共汽车只有在有人下车时才停车,求公共汽车停车次数的数学期望。

习题 5. 在一次集会上, n 个人把他们的帽子放到房间中央混合在一起, 然后没人随机的取一项, X 表示拿到自己帽子的人数, 求 X 的期望和方差。

习题 6. 某城市共有 N 辆汽车, 车牌号从 1 到 N, 若随机地记下 n 辆车的车牌号 (可重复记载), 其最大号码为  $\xi$ , 求  $\mathbb{E}\xi$ 。当  $N \to \infty$  时,  $\mathbb{E}\xi$  是多少。

习题 7. 若  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是正的独立的随机变量, 服从相同分布, 证明:

$$E\left(\frac{X_1+X_2+\cdots+X_k}{X_1+X_2+\cdots+X_n}\right)=\frac{k}{n}.$$

2 期望方差 2

习题 8. 设随机变量 X 在 [a,b] 中取值,证明:

$$\operatorname{Var}(X) \le \frac{(b-a)^2}{4},$$

并说明等号何时成立。

习题 9. 袋中有 N 只球,但其中白球的个数为随机变量,只知道其数学期望为 n,试求从袋中摸一球,该球为白球的概率。

习题 10. 袋中装有 a 个白球,b 个黑球,每次取出一球后,总是放入一个白球,这样进行了 m 次之后,再从袋中取出一个球,求它是白球的概率;以及从开始进行 m 次之后,袋中白球数的数学期望。