

## 1 奇异值分解的进一步练习

1. 假如我们观测到一组数据(两个变量, 五个测量)

$$A_0 = \begin{bmatrix} 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

- (a) 求出每一行的平均值, 并得到一个居中化 (centered) 的数据矩阵  $B$ .
- (b) 求出矩阵  $B$  对应的协方差矩阵  $S = \frac{BB^T}{n-1}$ .
- (c) 求出  $S$  的特征值  $\lambda_1 \geq \lambda_2$  和特征向量  $u_1, u_2$ .
- (d) 在一个二维的平面把  $B$  里的数据表示出来, 并找到  $u_1$  对应的方向。  $u_1$  是一个主分量。 同时在把  $u_2$  的方向画出来, 观测数据在这个方向的分布。
2. 我们定义了一个广义逆  $A^+ = V\Sigma^+U^T$ . 下面我们研究一下它的性质
- (a) 证明:  $(A^+A)^2 = A^+A$ ,  $(AA^+)^2 = AA^+$ .
- (b) 证明:  $A^+$  的列空间是  $A$  的行空间。  $A^+$  的行空间是  $A$  的列空间。
- (c) 我们之前研究过一个向量  $b$  在  $A$  的列向量空间上的投影: 我们有这样的公式  $A^T Ax = A^T b$ . 证明:  $x^+ = A^+b$  是前面方程的解。
- (d) 对于方程  $A^T Ax = A^T b$  的任意一个解  $\hat{x}$ , 证明: 1)  $A^T A(\hat{x} - x^+) = 0$ , 2)  $A(\hat{x} - x^+) = 0$ .
- (e) 因为  $x^+ = A^+b$  是在  $A$  的行空间(思考一下为什么?), 用上一题的结论证明:  $\hat{x} - x^+$  是垂直于  $x^+$  的。
- (f) 用上题的结论证明:  $|\hat{x}|^2 = |\hat{x} - x^+|^2 + |x^+|^2$ . 试说明: 当  $\hat{x} = x^+$  的时候, 方程  $A^T A\hat{x} = A^T b$  的解的长度最小。
3. 我们考虑奇异值分解对一个矩阵的近似。考虑一个  $m \times n$  的矩阵  $A$ . 我们首先定义了一个矩阵的 norm  $|A|$ :

$$|A| = \max \frac{|Ax|}{|x|} \quad (2)$$

这里我们对所有的非零向量求最大值.  $A$  有奇异值分解

$$A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \dots + \sigma_r u_r v_r^T. \quad (3)$$

这里奇异值有排序:  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r$ .  $r$  是矩阵  $A$  的秩.

- (a) 证明:  $|A| = \sigma_1$ .
- (b) 我们令  $A_k = \sigma_1 u_1 v_1^T + \dots + \sigma_k u_k v_k^T$ . 证明:  $|A - A_k| = \sigma_{k+1}$ .
- (c) 考虑一个任意的秩为  $k$  的矩阵  $B$  ( $m \times n$ ) 矩阵, 证明:  $B$  可以写成下列的形式

$$B = XY^T \quad (4)$$

这里  $Y$  有  $k$  列, 且秩为  $k$ . 也就是说  $Y$  是一个  $n \times k$  的矩阵.

(d) 证明: 存在一个非零向量 $w$

$$w = r_1 v_1 + \dots + r_{k+1} v_{k+1} \quad (5)$$

使得  $Y^T w = 0$ . (反证法: 如果结论不成立, 那么考虑 $Y^T$  的零空间的维数。)

(e) 对于上题中的 $w$ , 我们可以取 $r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_{k+1}^2 = 1$ , 证明: 1)  $|A - B| \geq |(A - B)w| = |Aw|$  (用norm的定义); 2)  $|Aw| \geq_{k+1} |A - A_k|$ . 这说明对于任何一个秩为 $k$ 的矩阵 $B$ , 我们有 $|A - B| \geq |A - A_k|$ 。

## 2 线性映射

- 考虑两个线性映射  $R^n \xrightarrow{f} R^k \xrightarrow{g} R^m$ . 分别在三个线性空间中选定一组基, 假设 $f$ 对应的矩阵为 $A$ ,  $g$ 对应的矩阵为 $B$ , 复合映射 $gf$  对应的矩阵为 $C$ , 证明:  $C = BA$ .
- 考虑线性映射  $f: R^n \rightarrow R^m$ . 我们现在把我们之前学过的关于矩阵的结果和映射的一些概念结合起来。一个映射称之为单射, 如果 $R^n$ 中两个不同的元素被 $f$ 映到 $R^m$ 中不同的元素。一个映射称之为满射, 如果 $R^m$ 中每一个元素都有原像。
  - 证明: 一个线性映射是满射的条件是:  $n \geq m$  并且 线性映射所对应的矩阵的秩是 $m$ .
  - 证明: 一个线性映射是单射的条件是: 线性映射所对应的矩阵的零空间维数为0.
  - 证明: 一个线性映射即是单射, 又是满射的条件是: 1):  $n = m$ ; 2): 线性映射所对应的矩阵的秩是 $m$ 。
- 选定 $R^3$ 中的一组基, 那么任意一个向量 $x$ 在这组基下面的坐标是 $(x_1, x_2, x_3)$ . 对于下列变换, 先判断它是不是线性变换, 如果是, 写成所对应的矩阵
  - $f(x) = (x_1 + x_3, 2x_1 + x_3, 3x_1 - x_2 + x_3)$ .
  - $f(x) = (x_1, x_2 + 1, x_3 + 2)$ .
  - $f(x) = (2x_1 + x_2, x_1 + x_3, x_3^2)$ .
  - $f(x) = (x_1 - x_2 + x_3, x_3, x_2)$ .
- 我们有一个从 $R^3$ 到自己的线性变换。这个线性变换在一组基 $(e_1, e_2, e_3)$ 下面的矩阵是

$$A = \begin{bmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{bmatrix} \quad (6)$$

求该线性变换在基 $f_1 = 2e_1 + 3e_2 + e_3, f_2 = 3e_1 + 4e_2 + e_3, f_3 = e_1 + 2e_2 + 2e_3$ 下的矩阵.

5. 我们有下列线性变换  $0 \xrightarrow{f_1} R^n \xrightarrow{f_2} R^k \xrightarrow{f_3} R^m \xrightarrow{f_4} 0$ . 如果 对于每一个线性空间, 我们都有  $\text{im}(f_i) = \ker(f_{i+1}), i = 1, 2, 3$ . 分别选了 基以后, 我们记四个线性映射对应的矩阵为  $A_1, A_2, A_3, A_4$ ,
- (a) 证明:  $A_2$  的零空间的维数是 0. (利用  $\ker(f_2)$  和  $\text{im}(f_1)$  的定义).  $A_2$  的 秩是多少?
  - (b) 证明:  $A_3 A_2 = 0$ . 也就是说  $A_2$  的列向量都在  $A_3$  的零空间里面。  $A_3$  的秩是多少? (利用  $\ker(f_3)$  和  $\text{im}(f_2)$  的定义).
  - (c) 证明:  $A_3$  的秩是  $m$ . (利用  $\ker(f_4)$  和  $\text{im}(f_3)$  的定义).
  - (d) 证明:  $k = m + n$ .