2bRAD
16S rRNA

hocaeicola. dorei\np 2bRAD 0.94 / 16S 0.13 | *Mycobacterium tuberculosis*\np 2bRAD 0.81 / 16S 0.04 | *Lactiplantibacillus plantarum*\np 2bRAD 0.87 / 16S 0.02 | *Staphylococcus aureus*\np 2bRAD 0.98 / 16S 0.10 | *Streptococcus pneumoniae*\np 2bRAD 0.59 /

ylococcus. epidermidis\np 2bRAD 0.90 / 16S 0.20 | *Klebsiella pneumoniae*\np 2bRAD 0.[illegible] / 16S 0.16 | *Escherichia coli*\np 2bRAD 0.99 / 16S 0.36 | *Clostridioides. difficile*\np 2bRAD 0.96 / 16S 0.39 | *Cutibacterium acnes*\np 2bRAD 0.97 / 16

nyromonas. gingivalis\np 2bRAD 0.87 / 16S 0.46 | *Prevotella copri*\np 2bRAD 0.97 / 16S 0.52 | *Salmonella enterica*\np 2bRAD 0.97 / 16S 0.54 | *Akkermansia muciniphila*\np 2bRAD 0.96 / 16S 0.65 | *Ruminococcus torques*\np 2bRAD 0.87 /

2bRAD / 16S rank percentile

Whole-genome rank percentile