

2bRAD captures strain-level signal that 16S cannot (15 species): summary (A) and per-species rank–rank scatter (B)
A
Complete/near-complete genomes; error bars 95% CI
2bRAD med 0.94
16S med 0.36
Phocaeicola dorei
Staphylococcus aureus
Mycobacterium tuberculosis
Lactiplantibacillus plantarum
Staphylococcus epidermidis
Escherichia coli
Clostridioides difficile
Cutibacterium acnes
Klebsiella pneumoniae
Prevotella copri
Salmonella enterica
Porphyromonas gingivalis
Streptococcus pneumoniae
Akkermansia muciniphila
Fusobacterium nucleatum
n=14
n=48
n=29
n=48
n=50
n=50
n=46
n=43
n=46
n=1
n=45
n=37
n=50
n=48
n=25
2bRAD
16S rRNA
−0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Spearman ρ (between-strain vs whole-genome distance)
B
2bRAD
16S rRNA
2bRAD / 16S distance (rank percentile)
whole-genome distance (rank percentile)
P. dorei
ρ 0.94 / -0.13
M. tuberculosis
ρ 0.81 / -0.04
L. plantarum
ρ 0.87 / 0.02
S. aureus
ρ 0.98 / 0.10
S. pneumoniae
ρ 0.59 / 0.20
S. epidermidis
ρ 0.90 / 0.20
K. pneumoniae
ρ 0.73 / 0.26
E. coli
ρ 0.99 / 0.36
C. difficile
ρ 0.96 / 0.39
C. acnes
ρ 0.97 / 0.45
P. gingivalis
ρ 0.87 / 0.46
P. copri
ρ 0.97 / 0.52
S. enterica
ρ 0.97 / 0.54
A. muciniphila
ρ 0.96 / 0.65
F. nucleatum
ρ 0.87 / 0.68
0
1