

# Sprawozdanie - Laboratorium nr 3

## Metoda sprzężonych gradientów dla macierzy wstęgowej

Hubert Wdowiak, 19.03.2020

### 1. Wstęp Teoretyczny

Laboratorium polegało na rozwiązaniu układu równań liniowych  $Ax = b$  metodą sprzężonych gradientów. Jest to algorytm numeryczny iteracyjny, który z każdym przejściem pętli dochodzi do coraz to dokładniejszych wyników. Metoda sprzężonych gradientów może być wykorzystana w równaniach, w których macierz kwadratowa jest określona dodatnio (czyli wszystkie minory licząc od lewego, górnego rogu są dodatnie; Innymi słowy wyznaczniki coraz to większych podmacierzy mają być dodatnie)

Macierz wstęgowa to macierz której wszystkie elementy są zerowe, poza przekątną główną i  $m$  - przekątnymi "okalającymi" przekątną główną. My w zadaniu otrzymaliśmy informację, że  $m = 5$ , zatem nasza macierz miała  $2*5 + 1$  niezerowych przekątnych.

### 2. Zadanie do wykonania

Aby przeprowadzić ćwiczenie, potrzebowaliśmy:

- utworzyć macierz o wymiarze  $n = 1000$  i wypełnić jej elementy:

$$A[i][j] = \frac{1}{1+|i-j|}, \text{ kiedy } |i-j| \leq 5, \quad i, j = 0, \dots, n-1$$

- wypełnić wektor wyrazów wolnych:

$$b[i] = i + 1, \quad i = 0, \dots, n-1$$


- wypełnić wektor startowy:

$$x[i] = 0, \quad i = 0, \dots, n-1$$

- zaprogramować metodę modyfikując algorytm podany przez prowadzących, przy czym mieliśmy przyjąć, że główna pętla kończy się gdy wartość normy euklidesowej wektora rozwiązań będzie mniejsza niż  $10^{-6}$ .
- Sporządzić wykresy wartości norm euklidesowych, wektorów  $x$  oraz  $r$ , dla każdej iteracji. ( $r$  jest wektorem inicjalizowanym jako  $b - Ax$ )

- Porównać wydajności metody gradientów sprzężonych, oraz metody eliminacji zupełnej, którą poznaliśmy na wcześniejszych zajęciach.

## 2.1 Wyniki



Wykres 1:

Wartości norm euklidesowych wektorów: reszt oraz rozwiązań w kolejnych iteracjach

Powyższy wykres doskonale przedstawia w jaki sposób zmienia się wartość obliczana przez algorytm w kolejnych iteracjach metody. Startując od zera, już przy piątym przejściu pętli, wartość zbliżona jest do tej, przyjętej przez nas za końcową, a przy dziesiątej iteracji wykres jest całkowicie “ustatkowany” i żadne zmiany nie są widoczne bez zmiany skali.

Wartości normy euklidesowej wektora reszt widocznie spada w sposób wykładniczy, co potwierdza bardzo szybki wzrost dokładności końcowego wyniku, w kolejnych przejściach pętli.

## 2.3 Porównanie metod

Aby porównać wydajność metod zmierzaliśmy czasy potrzebne dla przebiegu każdego z algorytmów, oraz porównaliśmy je. Do pomiarów wykorzystaliśmy funkcję `clock_t clock(void)`, znajdującą się w bibliotece `time.h`, oraz funkcję `gaussj` z biblioteki “numerical recipes”. Pomiary zostały pobrane kilkukrotnie by zniwelować “zewnętrzne” czynniki pracy komputera. Dla macierzy wymiaru  $N^4$  metoda eliminacji zupełnej nie dawała rezultatów przez długi czas, więc dlatego pomiar został przerwany i w tabeli jest brak wyniku.

Metoda gradientów sprzężonych		Metoda eliminacji zupełnej	
$N = 10^3$	0.134811 s	$N = 10^3$	1.56233 s
$N = 10^3$	0.141957 s	$N = 10^3$	1.33256 s
$N = 10^3$	0.132932 s	$N = 10^3$	1.44276 s
$N = 10^4$	14.0747 s	$N = 10^4$	-----
$N = 10^4$	14.0845 s	$N = 10^4$	-----
$N = 10^4$	14.2648 s	$N = 10^4$	-----

Tabela 1: Porównanie czasów działania metody gradientów sprzężonych, oraz eliminacji zupełnej

Powyższa tabela jednoznacznie wykazała, że metoda gradientów sprzężonych sprawdziła się w rozpatrywanym przez nas przykładzie znacznie lepiej. Uzyskała wyniki w wielokrotnie krótszym czasie, co wynika między innymi z niższej złożoności obliczeniowej -  $O(\sqrt{km})$ , gdzie  $k$  to wskaźnik uwarunkowania macierzy, a  $m$  to ilość jej niezerowych elementów. Złożoność metody eliminacji zupełnej wyraża notacja  $O(n^3)$ .

Optymalizacja metody gradientów sprzężonych polega m.in. na tym, że nie ma potrzeby zapamiętywania wszystkich zer znajdujących się wewnątrz macierzy, a jedynie wartości znajdujące się wewnątrz wstęgi (mniej niż  $N \cdot (2m+1)$ ,  $m$  = szerokość wstęgi). Odwrotnie jest w metodzie eliminacji zupełnej gdzie zobowiązani jesteśmy do zapamiętania wszystkich wartości, a zatem złożoność pamięciowa wynosi tam  $n^2$ .

### 3. Wnioski

Zestawienie metod gradientów sprzężonych, oraz eliminacji zupełnej uświadomiła nam o jej wyższości zarówno w złożoności obliczeniowej, jak i pamięciowej. Zatem wydawałoby się, że zawsze lepszym wyborem będzie nowo poznana metoda, jednak nie może ona być zastosowana na każdej macierzy. Warunki wymienione we wstępie: symetryczność i dodatnia określoność sprawiają, że często nie można jej wykorzystać.

Pewni jednak możemy być, że w przypadku macierzy rzadkich o wysokim wymiarze (posiadających wiele zer), naszym pierwszym wyborem powinny być metody iteracyjne, właśnie takie jak metoda gradientów sprzężonych, gdyż mogą one w znacznym stopniu przyspieszyć działanie programu.