

Avaliação Teórica 01

Curso de Aprendizado de Máquina — UFF

Prof. Gabriel Sanfins

Instruções.

- Duração: **2 horas**. Prova individual e sem consulta.
- A prova vale **12,0 pontos**; o valor de cada item está indicado ao lado.
- **Justifique todas as respostas.**
- Notação: $(\mathbf{X}, Y)$ é um vetor aleatório com distribuição P ; $r(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[Y \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]$ é a função de regressão; $\mathcal{D} = \{(\mathbf{X}_i, Y_i)\}_{i=1}^n$ é a amostra de treino, i.i.d.; p é o número de covariáveis; a perda é a quadrática, salvo indicação em contrário.

Questão 1 — A Regressão Ridge como moda a posteriori (4,0 pontos)

Já mencionamos que o Ridge tem uma leitura bayesiana: ele é a moda a posteriori sob uma priori gaussiana. A afirmação é mais do que curiosidade — ela dá um significado concreto ao λ , que até aqui era só um hiperparâmetro.

Considere o modelo

$$\mathbf{y} \mid \boldsymbol{\beta} \sim N(\mathbb{X}\boldsymbol{\beta}, \sigma^2 \mathbb{I}), \quad \boldsymbol{\beta} \sim N(\mathbf{0}, \sigma_\beta^2 \mathbb{I}),$$

com σ^2 e σ_β^2 conhecidos.

- (a) (1,6) Escreva a densidade a posteriori de $\boldsymbol{\beta}$ a menos de constante multiplicativa e mostre que maximizá-la equivale a minimizar

$$\frac{1}{2\sigma^2} \|\mathbf{y} - \mathbb{X}\boldsymbol{\beta}\|^2 + \frac{1}{2\sigma_\beta^2} \|\boldsymbol{\beta}\|^2.$$

O caminho é o de sempre: passar ao logaritmo transforma produto em soma, e trocar o sinal transforma maximizar em minimizar.

- (b) (1,0) Compare o que você obteve com a definição do Ridge da aula e identifique λ em função de σ^2 e σ_β^2 . Cuidado com o fator que precisa ser eliminado antes da comparação.
- (c) (1,4) Agora a parte interessante: o que a priori está *afirmando* quando $\sigma_\beta^2 \rightarrow \infty$, e quando $\sigma_\beta^2 \rightarrow 0$? Ligue cada resposta ao comportamento do Ridge em $\lambda \rightarrow 0$ e $\lambda \rightarrow \infty$.

Questão 2 — Duas fórmulas da validação cruzada (4,0 pontos)

Quem estuda validação cruzada pelas notas de aula e pelo livro encontra duas fórmulas diferentes para a mesma quantia, e é natural desconfiar de que uma delas esteja errada. Não está: elas só diferem na unidade que cada uma pondera igualmente.

As notas de aula definem

$$\hat{R}_{k\text{-CV}} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i \in L_j} (Y_i - g_{-j}(\mathbf{X}_i))^2,$$

e o livro define $\text{CV}_{(k)} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \text{EQM}_j$, com $\text{EQM}_j = \frac{1}{|L_j|} \sum_{i \in L_j} (Y_i - g_{-j}(\mathbf{X}_i))^2$.

- (a) (1,2) Reescreva a fórmula da aula de modo a fazer os EQM_j aparecerem, mostrando que

$$\hat{R}_{k\text{-CV}} = \sum_{j=1}^k \frac{|L_j|}{n} \text{EQM}_j.$$

- (b) (0,8) Olhando para os pesos que você obteve, diga em que condição as duas definições coincidem — e se coincidem exatamente ou apenas aproximadamente. Em seguida, nomeie a unidade que cada fórmula pondera igualmente.
- (c) (0,7) Com $n = 50$ e $k = 7$, as dobras não podem ter todas o mesmo tamanho; suponha que tenham tamanhos 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6. Confirme que somam 50 e explique por que, neste caso, os dois números diferem.
- (d) (1,3) Suponha que a dobra de 6 observações tenha $EQM = 10$ e todas as outras tenham $EQM = 1$. Calcule os dois estimadores, diga qual deles dá mais peso à dobra atípica, e qual você reportaria. Justifique a escolha.

Questão 3

(4,0 pontos)

Um colega recebeu um banco de dados em que a coluna **renda** está em reais e a coluna **altura** em metros, e pergunta se precisa padronizar antes de ajustar. A resposta honesta é "depende do método" — e o critério que decide cabe numa pergunta: **o método soma coisas vindas de colunas diferentes?**

Se soma, as unidades precisam ser comparáveis, e trocar uma delas estraga a comparação. Se não soma, a unidade é irrelevante.

- (a) (2,0 — 0,4 cada) Para cada método abaixo, diga se multiplicar uma única coluna por 1000 **muda** ou **não muda** a predição, justificando em uma linha onde está — ou onde não está — a soma sobre colunas.
- (i) Mínimos quadrados ordinários.
 - (ii) Regressão Ridge com $\lambda > 0$ fixo.
 - (iii) Árvore de regressão.
 - (iv) Floresta aleatória.
 - (v) KNN com k fixo.
- (b) (0,9) Entre os que mudam, qual você espera que seja o mais afetado, e por quê? Compare o *modo* como a escala entra em cada um.
- (c) (1,1) Outro colega ajustou o Lasso a dados padronizados, com λ escolhido por validação cruzada. Em seguida multiplicou por 1000 a coluna de maior efeito sobre Y , reajustou com o *mesmo* λ , e o erro quadrático médio no conjunto de teste *diminuiu*. Ele conclui que é melhor não padronizar. Explique por que a reescala pode ter ajudado e por que a conclusão não se sustenta.

Boa prova!