# Aula 07 — Classificação e Classificadores Gaussianos

*Curso de Aprendizado de Máquina — UFF*

*Prof. Gabriel Sanfins*

Leitura recomendada: AME §7.1–7.3 e §8.1; ISLP §2.2.3, §4.3 e §4.4

---

## O que você vai aprender

Ao final desta aula você deve ser capaz de:

- formular o problema de classificação com a *perda 0–1* e derivar o **classificador de Bayes**;
- descrever a estratégia *plug-in*: estimar $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ e classificar pela maior probabilidade;
- estimar essa probabilidade pelo Teorema de Bayes, com o **Bayes ingênuo** (covariáveis contínuas ou discretas) e com a **análise discriminante** (LDA e QDA);
- entender por que LDA tem fronteira *linear* e QDA *quadrática*;
- escolher entre LDA e QDA pelo balanço viés–variância;
- estimá-la diretamente, com uma **regressão logística** ajustada por máxima verossimilhança, e reconhecer sua versão penalizada e a multiclasse;
- contrastar as abordagens *generativa* e *discriminativa*.

Começa aqui o estudo da classificação, e a boa notícia é que *quase tudo* o que vimos em regressão se transfere: risco, balanço viés–variância, validação cruzada, *pipelines*. A única mudança é que $Y$ agora é *qualitativo*, e por isso a perda natural deixa de ser a quadrática e passa a ser a 0–1. Comece pela pergunta:

> *qual é o melhor classificador possível, se eu conhecesse a distribuição dos dados?*

Essa pergunta tem resposta exata e curta — Teorema 1.1 — e ela desempenha, aqui, exatamente o papel que $r(\boldsymbol{x}) = \mathbb{E}[Y \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}]$ desempenhou na Aula 01: define o alvo que todo método vai tentar aproximar.

## 1 O problema de classificação

Agora $Y$ assume valores num conjunto finito de **classes** $\mathcal{C}$ (ex.: $\mathcal{C} = \{0, 1\}$ no caso binário). Um **classificador** é uma função $g : \mathbb{R}^p \to \mathcal{C}$, e queremos, como em regressão, que ela acerte observações novas: $g(\boldsymbol{x}_{n+1}) \approx y_{n+1}$.

O primeiro passo é decidir o que esse "$\approx$" quer dizer. A perda quadrática $(Y - g(\boldsymbol{X}))^2$ não serve: codificar as classes por números não resolve, porque a conta passa a depender de uma escolha arbitrária — com três classes codificadas como 1, 2 e 3, confundir a classe 1 com a 3 custaria 4, e com a 2 custaria 1, como se houvesse uma ordem entre as classes. Em classificação só há duas situações: $g(\boldsymbol{x}) = y$, um acerto, e $g(\boldsymbol{x}) \neq y$, um erro. A perda que registra exatamente isso é a **perda 0–1**, $L(y, g(\boldsymbol{x})) = \mathbf{1}\{y \neq g(\boldsymbol{x})\}$, e o risco correspondente é a *probabilidade de erro*:

$$R(g) = \mathbb{E}\big[\mathbf{1}\{Y \neq g(\boldsymbol{X})\}\big] = \mathbb{P}(Y \neq g(\boldsymbol{X})). \tag{1}$$

**Teorema 1.1** (Classificador de Bayes)**.** *Sob a perda 0–1, o classificador que minimiza* (1) *é*

$$g^*(\boldsymbol{x}) = \arg\max_{c \in \mathcal{C}} \ \mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{X} = \boldsymbol{x}).$$

*No caso binário* $\mathcal{C} = \{0, 1\}$*:* $g^*(\boldsymbol{x}) = 1 \iff \mathbb{P}(Y = 1 \mid \boldsymbol{x}) \geq \frac{1}{2}$.

*Demonstração.* (Caso binário, classes $c_1, c_2$.) Condicionando em $\boldsymbol{X}$,

$$R(g) = \mathbb{P}(Y \neq g(\boldsymbol{X})) = \int \left[\mathbf{1}\{g(\boldsymbol{x}) = c_2\}\, \mathbb{P}(Y = c_1 \mid \boldsymbol{x}) + \mathbf{1}\{g(\boldsymbol{x}) = c_1\}\, \mathbb{P}(Y = c_2 \mid \boldsymbol{x})\right] f(\boldsymbol{x})\, d\boldsymbol{x}.$$

Para *cada* $\boldsymbol{x}$, o integrando é minimizado escolhendo $g(\boldsymbol{x}) = c_1$ quando $\mathbb{P}(Y = c_1 \mid \boldsymbol{x}) \geq \mathbb{P}(Y = c_2 \mid \boldsymbol{x})$ e $g(\boldsymbol{x}) = c_2$ caso contrário — isto é, a classe de maior probabilidade a posteriori. Como cada $\boldsymbol{x}$ é otimizado pontualmente, o classificador resultante minimiza o risco global. □

**Ideia central**

Note o padrão: como na Aula 01, em que se mostrou que $r$ minimiza o erro quadrático esperado, a prova otimiza *ponto a ponto* e depois integra. É a mesma técnica — e é por isso que os dois resultados se parecem tanto. Em regressão, o alvo é a *média* condicional; em classificação, a *moda* condicional. O classificador de Bayes $g^*$ é o "oráculo": nenhum classificador faz melhor. Seu risco $R^*$ é o análogo do *erro irredutível*. Mas $g^*$ é *desconhecido*, pois depende de $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$. Todo método desta aula é uma tentativa de aproximá-lo.

**Observação 1.2** (O que se transfere da regressão)**.** A estimação do risco (1) é feita por *data splitting*/validação cruzada, agora medindo a *proporção de erros* na validação. O balanço viés–variância também vale: $R(g) - R^*$ decompõe-se num termo tipo variância (classe $\mathcal{G}$ grande demais) e num termo tipo viés (classe pequena demais). E, como em regressão, compare *poucos* modelos no teste — faça o *tuning* por CV dentro do treino.

**Atenção**

A acurácia (1 − risco 0–1) pode **enganar** em dados desbalanceados: com 10 doentes em 1000, o classificador trivial "todos saudáveis" acerta 99% — e é inútil. Precisaremos de outras métricas (matriz de confusão, sensibilidade, precisão) — tema da Aula 08.

## 2 Classificadores *plug-in*

O Teorema 1.1 sugere uma receita direta, dita ***plug-in***:

1. estime $\widehat{\mathbb{P}}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ para cada classe $c \in \mathcal{C}$;
2. classifique $\widehat{g}(\boldsymbol{x}) = \arg\max_{c \in \mathcal{C}} \widehat{\mathbb{P}}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$.

Os métodos diferem em *como* estimam $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$. Há duas grandes famílias:

**Generativos** modelam $f(\boldsymbol{x} \mid Y = c)$ e $\mathbb{P}(Y = c)$ e invertem com o Teorema de Bayes — é o caso do Bayes ingênuo, do LDA e do QDA, as próximas seções.

**Discriminativos** modelam $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ *diretamente* — é o caso da regressão logística, que fecha a aula.

# 3 Modelos generativos: o Teorema de Bayes

A primeira família não modela $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ diretamente; modela como os dados de cada classe são gerados, e inverte:

$$\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x}) = \frac{f(\boldsymbol{x} \mid Y = c)\,\mathbb{P}(Y = c)}{\sum_{s \in \mathcal{C}} f(\boldsymbol{x} \mid Y = s)\,\mathbb{P}(Y = s)}, \tag{2}$$

em que $f(\boldsymbol{x} \mid Y = c)$ é a densidade de $\boldsymbol{X}$ dentro da classe $c$ — ou a função de probabilidade, se $\boldsymbol{X}$ for discreto. Estima-se $\mathbb{P}(Y = c)$ pelas *proporções amostrais* de cada classe e $f(\boldsymbol{x} \mid Y = c)$ por algum modelo. Como o denominador de (2) é o mesmo para todas as classes, basta comparar os numeradores:

$$\widehat{g}(\boldsymbol{x}) = \arg\max_{c \in \mathcal{C}} \; \widehat{f}(\boldsymbol{x} \mid Y = c)\,\widehat{\mathbb{P}}(Y = c).$$

Os métodos das duas próximas seções se distinguem pelo modelo de $f(\boldsymbol{x} \mid Y = c)$.

**Ideia central: a inversão que dá nome à família**

Repare no que (2) pede. Em vez de perguntar "dado este $\boldsymbol{x}$, qual a classe?", pergunta-se "*se* a classe fosse $c$, que $\boldsymbol{x}$ eu esperaria ver?" — e o Teorema de Bayes inverte a resposta. Daí o nome *generativo*: o modelo descreve como os dados são **gerados**, e por isso permite *simular* observações novas de cada classe, coisa que um modelo discriminativo, como a regressão logística do fim da aula, não faz.

# 4 Bayes ingênuo

O Bayes ingênuo supõe **independência condicional** das covariáveis dada a classe:

$$f(\boldsymbol{x} \mid Y = c) = \prod_{j=1}^{p} f(x_j \mid Y = c). \tag{3}$$

É a hipótese "ingênua" que dá nome ao método: dentro de cada classe, as componentes de $\boldsymbol{X}$ são tratadas como independentes. Ela quase nunca é literalmente verdadeira, mas é *conveniente* e frequentemente gera bons classificadores. A conveniência é enorme: em vez de estimar uma densidade em $\mathbb{R}^p$ — tarefa condenada pela maldição da dimensionalidade — estimam-se $p$ densidades em $\mathbb{R}^1$. É a esparsidade de suposições comprando viabilidade.

## 4.1 Covariáveis contínuas

Cada $f(x_j \mid Y = c)$ pode ser *qualquer* densidade em $\mathbb{R}$, e escolhê-la é um problema de inferência univariada, resolvido só com as observações da covariável $j$ que pertencem à classe $c$. Por isso vale olhar os dados antes: um histograma por classe mostra se a normal é razoável, se a variável é positiva e assimétrica, se há caudas pesadas — e ter à mão um bom repertório de modelos probabilísticos paga aqui. Se nenhum modelo paramétrico servir, cada $f(x_j \mid Y = c)$ pode ser estimada de forma não paramétrica.

A escolha mais comum é a gaussiana, $X_j \mid Y = c \sim N(\mu_{j,c}, \sigma^2_{j,c})$, com os estimadores de máxima verossimilhança

$$\widehat{\mu}_{j,c} = \frac{1}{|\mathcal{C}_c|} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} x_{i,j}, \qquad \widehat{\sigma}^2_{j,c} = \frac{1}{|\mathcal{C}_c|} \sum_{i \in \mathcal{C}_c} \left(x_{i,j} - \widehat{\mu}_{j,c}\right)^2,$$

em que $\mathcal{C}_c = \{i : y_i = c\}$ reúne as observações de treino da classe $c$. É o que faz o `GaussianNB` do `scikit-learn`, que ainda soma às variâncias um termo minúsculo, para estabilidade numérica.

### 4.2 Covariáveis discretas

Se $\boldsymbol{X}$ é discreto, (2) vale com probabilidades no lugar das densidades, e a hipótese ingênua fatora $\mathbb{P}(\boldsymbol{X} = \boldsymbol{x} \mid Y = c) = \prod_{j=1}^{p} \mathbb{P}(X_j = x_j \mid Y = c)$. A estimação é análoga: proporções calculadas dentro de cada classe. O `scikit-learn` traz as variantes mais comuns:

- `BernoulliNB`: cada $X_j$ é binária, $X_j \mid Y = c \sim \text{Bernoulli}(\theta_{j,c})$;
- `CategoricalNB`: cada $X_j$ é categórica, com uma probabilidade por nível e por classe;
- `MultinomialNB`: $\boldsymbol{X}$ é um vetor de contagens — quantas vezes cada palavra aparece num texto, por exemplo — modelado por uma multinomial;
- `ComplementNB`: uma variante do multinomial, pensada para classes desbalanceadas.

O caso multinomial merece uma observação. As contagens de uma multinomial *não* são independentes entre si — elas somam o tamanho do texto —, mas a hipótese ingênua continua lá, agora sobre as palavras: dada a classe, cada palavra do texto é sorteada independentemente das outras. É a versão que funciona tão bem em texto, e ela reaparece na Aula E3.

**Atenção**

Numericamente, o produto (3) de muitos termos pequenos sofre *underflow* (vira 0). Trabalhe sempre em **escala logarítmica**: $\widehat{g}(\boldsymbol{x}) = \arg\max_c \left[ \sum_j \log \widehat{f}(x_j \mid Y = c) + \log \widehat{\mathbb{P}}(Y = c) \right]$.

**Atenção: o preço do "ingênuo"**

Quando as covariáveis são de fato correlacionadas, o Bayes ingênuo conta a mesma evidência várias vezes — se três colunas dizem quase a mesma coisa, ele as trata como três testemunhas independentes. O efeito é curioso e importante: a *ordenação* das observações costuma sair boa (ele acerta quem é mais provável de ser da classe 1), mas as *probabilidades* saem grudadas em 0 e 1. A Aula 08 mede isso.

## 5 Análise discriminante: LDA e QDA

A análise discriminante abandona a independência: modela o vetor $\boldsymbol{X}$ inteiro, dentro de cada classe, como **gaussiano multivariado**. Lembre que $\boldsymbol{Z} \sim N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ em $\mathbb{R}^p$ tem densidade

$$f(\boldsymbol{z}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^p \det \boldsymbol{\Sigma}}} \exp\Big( -\tfrac{1}{2} (\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\mu})^\top \boldsymbol{\Sigma}^{-1} (\boldsymbol{z} - \boldsymbol{\mu}) \Big), \tag{4}$$

com $\boldsymbol{\mu} \in \mathbb{R}^p$ e $\boldsymbol{\Sigma}$ uma matriz $p \times p$ simétrica e positiva definida. A correlação entre as covariáveis, que o Bayes ingênuo jogava fora, mora nas entradas fora da diagonal de $\boldsymbol{\Sigma}$. As duas versões diferem na covariância:

- **QDA** (*Quadratic Discriminant Analysis*): cada classe tem sua própria covariância, $\boldsymbol{X} \mid Y = c \sim N(\boldsymbol{\mu}_c, \boldsymbol{\Sigma}_c)$;
- **LDA** (*Linear Discriminant Analysis*): as classes têm médias próprias, mas *compartilham* a covariância, $\boldsymbol{X} \mid Y = c \sim N(\boldsymbol{\mu}_c, \boldsymbol{\Sigma})$.

Os parâmetros são estimados por máxima verossimilhança. As médias são as de cada classe, e as covariâncias medem a dispersão em torno delas — uma por classe no QDA, uma só, reunindo

todas as classes, no LDA:

$$\widehat{\boldsymbol{\mu}}_c = \frac{1}{|\mathcal{C}_c|}\sum_{i\in\mathcal{C}_c} \boldsymbol{x}_i,$$
$$\widehat{\boldsymbol{\Sigma}}_c = \frac{1}{|\mathcal{C}_c|}\sum_{i\in\mathcal{C}_c} (\boldsymbol{x}_i-\widehat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\boldsymbol{x}_i-\widehat{\boldsymbol{\mu}}_c)^\top \qquad \text{(QDA)},$$
$$\widehat{\boldsymbol{\Sigma}} = \frac{1}{n}\sum_{c\in\mathcal{C}}\sum_{i\in\mathcal{C}_c} (\boldsymbol{x}_i-\widehat{\boldsymbol{\mu}}_c)(\boldsymbol{x}_i-\widehat{\boldsymbol{\mu}}_c)^\top \qquad \text{(LDA)}.$$

Com essas estimativas no lugar dos parâmetros, o classificador é o *plug-in* de (2).

**Proposição 5.1** (LDA tem fronteira linear)**.** *Sob* $\boldsymbol{X} \mid Y=c \sim N(\boldsymbol{\mu}_c, \boldsymbol{\Sigma})$ *(covariância comum), o classificador de Bayes* (2) *equivale a* $\widehat{g}(\boldsymbol{x}) = \arg\max_c \delta_c(\boldsymbol{x})$*, com a* função discriminante linear

$$\delta_c(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}_c - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\mu}_c^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{\mu}_c + \log\mathbb{P}(Y=c).$$

*As fronteiras entre classes* $\{\boldsymbol{x}:\delta_c(\boldsymbol{x})=\delta_{c'}(\boldsymbol{x})\}$ *são* ***hiperplanos****.*

*Demonstração.* Classificar por $\arg\max_c \mathbb{P}(Y=c\mid\boldsymbol{x})$ equivale a $\arg\max_c \log\big(f(\boldsymbol{x}\mid Y=c)\mathbb{P}(Y=c)\big)$ (o denominador de (2) não depende de $c$). Com a densidade gaussiana (4), $\log f(\boldsymbol{x}\mid Y=c) = -\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu}_c)^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{\mu}_c) + \text{const}$. Expandindo o quadrado, o termo $\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\boldsymbol{x}$ é *igual para todas as classes* (pois $\boldsymbol{\Sigma}$ é comum) e pode ser descartado do arg max. Sobram exatamente os termos lineares em $\boldsymbol{x}$ de $\delta_c(\boldsymbol{x})$. A diferença $\delta_c-\delta_{c'}$ é afim em $\boldsymbol{x}$, logo cada fronteira é um hiperplano. □

**Observação 5.2.** Em QDA, $\boldsymbol{\Sigma}_c$ varia com $c$, e dois termos deixam de cancelar: a forma quadrática $\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}\boldsymbol{x}$ e o $\log\det\boldsymbol{\Sigma}_c$ que vem da constante de normalização de (4). A função discriminante fica

$$\delta_c(\boldsymbol{x}) = -\tfrac{1}{2}\,\boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{x}^\top\boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}\boldsymbol{\mu}_c - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\mu}_c^\top\boldsymbol{\Sigma}_c^{-1}\boldsymbol{\mu}_c - \tfrac{1}{2}\log\det\boldsymbol{\Sigma}_c + \log\mathbb{P}(Y=c),$$

**quadrática** em $\boldsymbol{x}$, e as fronteiras $\{\boldsymbol{x}:\delta_c(\boldsymbol{x})=\delta_{c'}(\boldsymbol{x})\}$ são superfícies quádricas em $\mathbb{R}^p$ — em $\mathbb{R}^2$, cônicas: elipses, parábolas, hipérboles. No fim da aula, a Figura 2 põe a fronteira do QDA ao lado das dos outros três métodos.

## 5.1 LDA ou QDA? Uma questão de viés e variância

QDA é mais flexível (menos viés), mas estima muito mais parâmetros. A conta, com $K$ classes em $\mathbb{R}^p$: os dois estimam $K$ vetores de médias, $Kp$ números; o LDA estima *uma* matriz de covariância, com $p(p+1)/2$ entradas livres, e o QDA estima *uma por classe*, $Kp(p+1)/2$. Com $p=10$ e duas classes, são 55 parâmetros de covariância contra 110 — e cada um deles precisa de dados.

**Ideia central**

Esta figura é a Aula 01 vestida de classificação. O modelo *correto* pode perder para o modelo *errado* quando não há dados suficientes para estimá-lo — exatamente o que o Exemplo 1.7 do [AME] mostrou lá atrás com polinômios de grau 5 e 2. Regra de bolso: LDA com poucas amostras de treino, QDA com muitas ou quando a hipótese de covariância comum for inverossímil. As duas metades da regra importam: o que o QDA tem a *perder* depende de $n$ contra os $(K-1)\,p(p+1)/2$ parâmetros que ele estima a mais; o que ele tem a *ganhar* depende de quanto as covariâncias das classes de fato diferem — se diferem pouco, não há viés do LDA a corrigir. E, como sempre, valide de forma cruzada em vez de decidir por regra de bolso.





**Figura 1:** Acurácia dos dois métodos em função de $n$, com $p = 10$ covariáveis e covariâncias genuinamente diferentes por classe — ou seja, num cenário em que o **QDA está certo e o LDA está errado**. Ainda assim, com $n = 30$ o LDA ganha (0,748 contra 0,692): não há dados para estimar 110 parâmetros de covariância, e a variância do QDA supera o viés do LDA. A partir de $n = 50$ o jogo vira, e em $n = 4000$ o QDA abre sete pontos percentuais. Médias de 120 repetições, avaliadas em 20 000 observações novas.

## 6 Regressão logística (discriminativo)

O Bayes ingênuo, o LDA e o QDA chegam a $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ por um caminho indireto: modelam como os dados de cada classe são gerados e invertem com o Teorema de Bayes. E se estimássemos $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ *diretamente*, sem passar pelas densidades? É o que fazem os métodos discriminativos, e a regressão logística é o principal deles. No caso binário $\mathcal{C} = \{0, 1\}$ basta modelar $\mathbb{P}(Y = 1 \mid \boldsymbol{x})$, com um cuidado: uma probabilidade vive em $[0, 1]$, enquanto uma função linear $\beta_0 + \boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}$ vive em toda a reta. A regressão logística resolve isso modelando

$$\mathbb{P}(Y = 1 \mid \boldsymbol{x}) = \frac{e^{\beta_0 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i}}{1 + e^{\beta_0 + \sum_{i=1}^{p} \beta_i x_i}} = \sigma\big(\beta_0 + \boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}\big), \tag{5}$$

onde $\sigma(u) = e^u/(1 + e^u)$ é a função logística, que leva $\mathbb{R}$ em $(0, 1)$. Equivalentemente, o *log-odds* é linear: $\log \frac{\mathbb{P}(Y=1|\boldsymbol{x})}{\mathbb{P}(Y=0|\boldsymbol{x})} = \beta_0 + \boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{x}$. Como em regressão, *não* supomos que isso seja exatamente verdade — esperamos que leve a um bom classificador. Note que a fronteira de decisão $\{\boldsymbol{x} : \mathbb{P}(Y = 1 \mid \boldsymbol{x}) = \frac{1}{2}\}$ é o conjunto em que o *log-odds* se anula: um **hiperplano**, como no LDA.

**Ideia central: por que a logística e não outra curva em $[0, 1]$**

A função $\sigma$ tem duas propriedades que a tornam a escolha natural. Primeira: ela é a inversa do *logit* $\log \frac{p}{1-p}$, que leva $[0, 1]$ em toda a reta — ou seja, ela transforma um problema restrito num problema linear irrestrito. Segunda: a linearidade do *log-odds* dá a interpretação que os usuários querem — aumentar $x_j$ em uma unidade multiplica a razão de chances por $e^{\beta_j}$, qualquer que seja o ponto de partida. (O efeito sobre a *probabilidade*, esse sim, depende de onde se está na curva.) Você vai reencontrar $\sigma$ na Aula 09 e em qualquer rede neural.

### 6.1 Estimação por máxima verossimilhança

Dada uma amostra i.i.d., a verossimilhança condicional é

$$L(\boldsymbol{\beta}) = \prod_{k=1}^{n} \pi(\boldsymbol{x}_k)^{Y_k} \big(1 - \pi(\boldsymbol{x}_k)\big)^{1-Y_k}, \qquad \pi(\boldsymbol{x}_k) = \mathbb{P}(Y_k = 1 \mid \boldsymbol{x}_k, \boldsymbol{\beta}). \tag{6}$$

Maximiza-se o log da verossimilhança (6). Ao contrário do MQO, não há solução fechada: usam-se métodos numéricos (Newton–Raphson / IRLS). Como na regressão linear, pode-se **penalizar** ($\ell_1/\ell_2$) para reduzir variância — é literalmente a Aula 02 aplicada a outra função-objetivo.

**Atenção: separação perfeita**

Se existir um hiperplano que separa as duas classes *sem erro* no treino, a verossimilhança (6) não tem máximo: empurrar $\|\boldsymbol{\beta}\| \to \infty$ faz as probabilidades tenderem a 0 e 1 e a verossimilhança crescer sem parar. O otimizador roda até o limite de iterações e devolve coeficientes gigantescos e sem sentido. Acontece com frequência quando $p$ é grande em relação a $n$. A solução é a penalização — e é por isso que o `scikit-learn` aplica $\ell_2$ por *padrão* na `LogisticRegression`.

### 6.2 Mais de duas classes

Para $|\mathcal{C}| > 2$: ou ajusta-se uma logística *um-contra-todos* por classe (e normaliza-se), ou usa-se a **regressão logística multinomial** (*softmax*), que garante que as probabilidades estimadas somem 1.

## 7 Discriminativo × generativo

Com os quatro métodos na mão, vale compará-los. A Figura 2 põe as fronteiras de todos lado a lado, numa mesma amostra de duas classes gaussianas, e a tabela abaixo resume o que distingue as duas famílias.





**Figura 2:** Fronteiras de decisão em duas classes gaussianas com covariâncias *diferentes* ($n = 400$). Logística e LDA chegam a retas quase idênticas por caminhos completamente distintos — uma modelando $\mathbb{P}(Y \mid \boldsymbol{x})$ direto, a outra modelando $f(\boldsymbol{x} \mid Y)$ e invertendo. O QDA, livre da hipótese de covariância comum, curva a fronteira e acompanha o formato de cada nuvem: é o modelo correto para estes dados. O Bayes ingênuo também curva, mas erra o ângulo: ele supõe as duas covariáveis independentes dentro de cada classe, e aqui elas não são.

| | **Discriminativo (logística)** | **Generativo (LDA/QDA/NB)** |
|---|---|---|
| Modela | $\mathbb{P}(Y \mid \boldsymbol{x})$ direto | $f(\boldsymbol{x} \mid Y)$ e $\mathbb{P}(Y)$ |
| Suposições | poucas (forma do *log-odds*) | distribucionais (gaussiana, indep.) |
| Quando brilha | muitos dados; suposições gaussianas falsas | classes bem separadas; poucos dados; suposições aproximadamente corretas |
| Bônus | — | gera dados; lida com classes raras |

**Ideia central**

Se as suposições gaussianas valem, LDA/QDA são (quase) ótimos e eficientes com poucos dados. Se não valem, a logística — que assume menos — tende a ser mais robusta com bastante dado. Um detalhe curioso fecha o círculo: sob as hipóteses do LDA, o *log-odds* sai **exatamente** linear em $\boldsymbol{x}$ (Prop. 5.1), que é justamente o que a logística (5) supõe. Os dois modelos coincidem em forma e diferem só em como estimam os coeficientes — o que explica os dois primeiros painéis da Figura 2. Na dúvida: experimente ambos e compare por validação cruzada.

## Resumo

- Perda 0–1 (1); o **classificador de Bayes** $g^*(\boldsymbol{x}) = \arg\max_c \mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ é ótimo (Teo. 1.1) mas desconhecido — é a moda condicional, como $r$ era a média condicional.
- *Plug-in*: estimar $\mathbb{P}(Y = c \mid \boldsymbol{x})$ e tomar o $\arg\max$ — ou pelo Teorema de Bayes (2), modelando $f(\boldsymbol{x} \mid Y = c)$ (generativo), ou diretamente (discriminativo).
- **Bayes ingênuo**: independência condicional (3), com um modelo univariado por covariável (`GaussianNB`, `BernoulliNB`, `MultinomialNB`, ...) — barato, mas descalibra quando as covariáveis são correlacionadas.
- **LDA** (covariância comum → fronteira linear, Prop. 5.1) e **QDA** (covariância por classe → quadrática), com parâmetros por máxima verossimilhança. Ver Fig. 2.
- LDA × QDA é viés × variância (Fig. 1): o modelo correto pode perder por falta de dados.
- **Logística** (5): discriminativa, ajustada por máxima verossimilhança, penalizável e multiclasse; respeita $[0, 1]$ por construção, e cuidado com a separação perfeita.
- Generativo (eficiente sob suposições corretas e com poucos dados) × discriminativo (menos suposições, robusto com muito dado).
- Cuidado com acurácia em dados desbalanceados ⇒ Aula 08.

**Leitura recomendada.** [AME] §7.1 (risco 0–1 e o classificador de Bayes, com o Teorema 9 que é o nosso Teo. 1.1), §7.2–7.3 (estimação do risco e viés–variância em classificação) e §8.1 (a receita *plug-in*, com a logística em §8.1.2, o Bayes ingênuo em §8.1.3 e a análise discriminante em §8.1.4 — atenção: as duas densidades normais escritas ali omitem o $\frac{1}{2}$ do expoente; a correta é a (4)). [ISLP] §2.2.3 (o classificador de Bayes e o erro de Bayes), §4.3 (a logística, com a interpretação dos coeficientes em razão de chances) e §4.4 (os modelos generativos: a Figura 4.9 deles é a versão da nossa Figura 2 para LDA e QDA, e o §4.4.3 traz a conta de parâmetros que está por trás da Figura 1).