

Azia e Refluxo

conforto depois das refeições

Entenda por que a azia e o refluxo acontecem, o que realmente ajuda a preveni-los e aliviá-los, e como construir, em 7 dias, hábitos que trazem mais conforto após as refeições.

Linguagem simples. Base em boas práticas de saúde.
Sem promessas de cura — só orientação de verdade.

EDIÇÃO 2026
ORIGEMSAUDE

FICHA DO GUIA

Créditos e informações da edição

Título

Azia e Refluxo — Guia completo da coleção Origem Saúde

Coleção

Origem Saúde · Volume 10 de 16 — guias independentes sobre temas de saúde e bem-estar do dia a dia.

Edição

1ª edição digital, 2026. Distribuição em formato PDF, para leitura em celular, tablet ou computador.

AVISO LEGAL IMPORTANTE

Este e-book tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento realizado por médico ou outro profissional de saúde qualificado.

As informações aqui apresentadas refletem orientações gerais sobre hábitos que apoiam o conforto digestivo, amplamente aceitas na área da saúde. Elas não constituem prescrição médica e não garantem resultado ou cura para nenhuma condição.

Atenção especial: dor no peito pode ter causas diferentes, incluindo problemas cardíacos. Se a dor for intensa, vier com falta de ar, suor frio ou irradiar para o braço ou a mandíbula, procure atendimento médico de emergência imediatamente — não assuma que é "só azia". Veja o capítulo 13 para mais detalhes.

— NESTE GUIA

Sumário

ABERTURA

— **Introdução** 04

ENTENDENDO A AZIA E O REFLUXO

01 **O que são azia e refluxo** 05

02 **Principais causas** 07

03 **Sintomas** 09

04 **Fatores de risco** 10

O QUE FAZER

05 **Hábitos que ajudam** 11

06 **Alimentação e refluxo** 13

07 **Técnicas de alívio** 14

ERROS E CRENÇAS

08 **Erros mais comuns** 16

09 **Mitos e verdades** 17

10 **Perguntas frequentes** 19

COLOCANDO EM PRÁTICA

11 **Plano de ação — 7 dias** 21

12 **Checklist final** 23

FECHAMENTO

13 **Quando procurar um profissional** 24

14 **Conclusão** 25

— **Sobre a coleção Origem Saúde** 26

COMO USAR ESTE GUIA

Você não precisa ler tudo de uma vez. Se está com desconforto agora, vá direto ao capítulo 07 (Técnicas de alívio) ou ao capítulo 13 (Quando procurar um profissional). Se quer entender o "porquê" antes do como, comece pelo capítulo 01.

— INTRODUÇÃO

Antes de começar, uma conversa sincera

Se você chegou até este guia, provavelmente já sentiu aquela queimação no peito depois de uma refeição mais pesada, ou aquele gosto ácido que sobe pela garganta. Azia e refluxo estão entre os desconfortos digestivos mais comuns do dia a dia.

Eles acontecem quando o conteúdo do estômago retorna ao esôfago, que não tem a mesma proteção que o estômago contra os ácidos digestivos. O resultado é aquela sensação de queimação característica.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, hábitos simples — refeições menores, não deitar logo após comer, atenção a alguns alimentos — fazem diferença real na frequência e intensidade dos sintomas.

Você vai encontrar explicações simples sobre por que a azia e o refluxo acontecem, os principais gatilhos, e — o mais importante — um plano de ação de 7 dias para começar a sentir mais conforto hoje.

DICA PRÁTICA

Não tente aplicar todas as mudanças de uma vez. Escolha duas ou três dicas deste guia e mantenha-as por duas semanas antes de adicionar novas. O conforto digestivo se constrói com consistência.

O QUE VOCÊ VAI LEVAR DESTE GUIA

Entender por que a azia e o refluxo aparecem, quais hábitos realmente ajudam a preveni-los e aliviá-los, e um caminho claro — dia a dia — para sentir mais conforto após as refeições, sem prometer milagres.

01

O que são azia e refluxo

Uma válvula que, às vezes, deixa passar mais do que deveria.

Entre o esôfago e o estômago existe uma espécie de válvula muscular, chamada esfíncter esofágico inferior. Sua função é permitir que o alimento desça, mas impedir que o conteúdo do estômago volte.

Quando essa válvula relaxa em momentos inadequados, o conteúdo ácido do estômago sobe ao esôfago — isso é o refluxo. A sensação de queimação que costuma acompanhá-lo é a azia.

Refluxo ocasional x DRGE

Refluxo ocasional: acontece de vez em quando, geralmente ligado a uma refeição específica, e não costuma ser motivo de preocupação.

Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE): quando os sintomas são frequentes (mais de duas vezes por semana) ou persistentes, e merecem avaliação médica.

EM RESUMO

TERMO	SIGNIFICADO
Refluxo	Retorno do conteúdo do estômago ao esôfago
Azia	Sensação de queimação, geralmente associada ao refluxo
DRGE	Refluxo frequente ou persistente, que exige avaliação

CURIOSIDADE

Sentir refluxo ocasionalmente, especialmente após refeições grandes ou gordurosas, é considerado normal. O que costuma indicar necessidade de atenção é a frequência e a intensidade dos episódios.

01 • CONTINUAÇÃO

Por que a azia e o refluxo acontecem

Vários fatores podem fazer o esfíncter esofágico relaxar em momentos inadequados, ou aumentar a pressão dentro do abdômen, empurrando o conteúdo do estômago para cima.

Alimentos gordurosos, cafeína, álcool e chocolate são conhecidos por relaxar essa válvula. Já refeições grandes, sobrepeso e deitar logo após comer aumentam a pressão abdominal, facilitando o refluxo.

Algumas pessoas também têm uma condição chamada hérnia de hiato, que altera a posição anatômica dessa região e facilita o refluxo — uma avaliação médica pode identificar essa causa, se necessário.

O QUE FAVORECE O REFLUXO

- Relaxamento do esfíncter esofágico
- Aumento da pressão abdominal
- Refeições grandes ou muito gordurosas
- Deitar logo após comer
- Sobrepeso e gestação

ATENÇÃO

Refluxo frequente, sem tratamento, pode ao longo do tempo irritar o esôfago. Por isso, sintomas persistentes merecem avaliação médica, mesmo quando parecem "só um incômodo".

02

Principais causas

Na maioria das vezes, não é uma causa só — é um conjunto de fatores do dia a dia.

Alimentos gordurosos

Retardam o esvaziamento do estômago e relaxam o esfíncter esofágico.

Cafeína e álcool

Podem relaxar o esfíncter esofágico, facilitando o refluxo.

Sobrepeso

Aumenta a pressão sobre o abdômen e o estômago.

Deitar logo após comer

Facilita o retorno do conteúdo do estômago ao esôfago.

Tabagismo

Enfraquece o esfíncter esofágico e reduz a proteção natural do esôfago.

Gestação

O aumento da pressão abdominal e mudanças hormonais favorecem o refluxo.

Alguns medicamentos

Certos remédios têm o relaxamento do esfíncter como efeito conhecido.

Estresse

Pode aumentar a percepção dos sintomas e influenciar hábitos alimentares.

DICA PRÁTICA

Tente identificar, entre os itens acima, quais dois ou três parecem mais presentes na sua rotina. No capítulo 11 você vai transformar essa observação em ação, um dia de cada vez.

02 • CONTINUAÇÃO

O papel da vida moderna na azia e no refluxo

Alguns hábitos comuns hoje em dia contribuem para episódios mais frequentes de azia e refluxo, muitas vezes sem que a pessoa perceba a relação direta.

Jantar tarde e ir direto para a cama

Comer perto do horário de dormir e deitar logo em seguida é uma das combinações mais associadas a sintomas noturnos de refluxo.

Refeições rápidas e grandes

Comer rápido demais, em porções grandes, sobrecarrega o estômago e aumenta a pressão abdominal, facilitando o refluxo.

ESTRESSE E ROTINA ACELERADA

Momentos de estresse elevado podem intensificar a percepção da azia e influenciar escolhas alimentares menos favoráveis ao conforto digestivo.

ATENÇÃO

Sedentarismo e sobrepeso, cada vez mais comuns no estilo de vida atual, estão entre os fatores mais associados ao aumento da frequência de refluxo.

03

Sintomas de azia e refluxo

Formas diferentes de o corpo mostrar que o refluxo está acontecendo.

SINAIS MAIS COMUNS

- ☐ Queimação no peito, geralmente após as refeições
- ☐ Gosto ácido ou amargo na garganta ou boca
- ☐ Regurgitação de alimento ou líquido
- ☐ Sensação de "bolo" na garganta
- ☐ Sintomas que pioram ao deitar ou se curvar

SINTOMAS MENOS ÓBVIOS

Tosse persistente, rouquidão e sensação de pigarro frequente também podem estar ligados ao refluxo, especialmente quando ele atinge a garganta.

CURIOSIDADE

Os sintomas de refluxo costumam ser mais frequentes à noite, quando a posição deitada facilita o retorno do conteúdo do estômago ao esôfago.

RESUMO DO CAPÍTULO

Episódios ocasionais de azia costumam ser normais. Sintomas frequentes, persistentes, ou acompanhados de dificuldade para engolir, merecem atenção — veja o capítulo 13 para uma lista completa de sinais de alerta.

04

Fatores de risco

Situações que aumentam a chance de azia e refluxo aparecerem com mais frequência.

FATOR	POR QUE AUMENTA O RISCO
Sobrepeso	Aumenta a pressão sobre o abdômen e o estômago.
Gestação	Mudanças hormonais e físicas favorecem o refluxo, especialmente no fim da gravidez.
Hérnia de hiato	Altera a posição anatômica que ajuda a conter o refluxo.
Tabagismo	Enfraquece o esfíncter esofágico e a proteção natural do esôfago.
Uso de certos medicamentos	Alguns remédios relaxam o esfíncter esofágico como efeito colateral.
Alimentação rica em gordura	Retarda o esvaziamento do estômago, facilitando o refluxo.
Estresse crônico	Pode intensificar a percepção dos sintomas.
Idade	O esfíncter esofágico pode perder força ao longo dos anos.

RESUMO

Nenhum desses fatores, isoladamente, costuma ser grave. O problema surge quando vários deles se somam ao longo do tempo, mantendo o refluxo frequente.

DICA PRÁTICA

Marque mentalmente quais fatores desta tabela mais combinam com a sua rotina atual — eles serão o ponto de partida do seu plano de ação, no capítulo 11.

05

Hábitos que ajudam a prevenir

Pequenas rotinas que, mantidas com constância, reduzem a frequência dos episódios.

Nas refeições

Prefira refeições menores

Reduz a pressão sobre o estômago e o risco de refluxo.

Coma devagar

Facilita a digestão e reduz a sensação de estômago muito cheio.

Não deite logo após comer

Espere pelo menos 2-3 horas antes de se deitar.

No dia a dia

Mantenha um peso saudável

Reduz a pressão abdominal que facilita o refluxo.

Evite fumar

O tabagismo enfraquece a proteção natural contra o refluxo.

Evite roupas muito apertadas na cintura

Reduz a pressão adicional sobre o abdômen.

DICA PRÁTICA

Se costuma sentir azia à noite, experimente jantar mais cedo e mais leve, dando mais tempo para a digestão antes de deitar.

CURIOSIDADE

Perder uma quantidade modesta de peso corporal, quando há excesso, costuma trazer alívio perceptível nos sintomas de refluxo para muitas pessoas.

05 • CONTINUAÇÃO

Ajustes para dormir com mais conforto

ELEVE A CABECEIRA

Elevar a cabeceira da cama de 10 a 15 cm ajuda a usar a gravidade a seu favor, reduzindo o refluxo noturno.

INTERVALO ANTES DE DEITAR

Dar pelo menos duas a três horas de intervalo entre a última refeição e a hora de dormir reduz bastante os sintomas noturnos.

POSIÇÃO AO DORMIR

Dormir sobre o lado esquerdo é associado, para muitas pessoas, a menos episódios de refluxo noturno do que dormir sobre o lado direito.

EVITE ELEVAR SÓ O TRAVESSEIRO

Usar vários travesseiros para elevar apenas a cabeça pode até dobrar o corpo de forma que piora a pressão abdominal. O ideal é elevar toda a parte superior do corpo, com uma cunha ou elevando a cabeceira da cama.

DICA PRÁTICA

Se sente refluxo com frequência à noite, experimente ajustar a posição de dormir antes de recorrer a medicamentos por conta própria.

06

Alimentação e refluxo

Alguns alimentos são gatilhos conhecidos — mas a resposta varia por pessoa.

CATEGORIA	EFEITO NO REFLUXO	RECOMENDAÇÃO
Alimentos gordurosos	Retardam o esvaziamento do estômago e relaxam o esfíncter esofágico.	Consumir com moderação
Cafeína	Pode relaxar o esfíncter esofágico em algumas pessoas.	Observar tolerância individual
Álcool	Relaxa o esfíncter e pode irritar o esôfago.	Consumir com moderação
Alimentos ácidos e picantes	Podem irritar o esôfago já sensibilizado pelo refluxo.	Observar tolerância individual
Chocolate e menta	Conhecidos por relaxar o esfíncter esofágico em algumas pessoas.	Observar tolerância individual
Refeições menores e mais frequentes	Reduzem a pressão sobre o estômago em cada refeição.	Priorizar no dia a dia

ATENÇÃO

Os gatilhos alimentares variam bastante entre pessoas. Não é necessário eliminar tudo de uma vez — observe o que realmente piora os seus sintomas.

DICA PRÁTICA

Um diário alimentar simples, junto com o registro dos episódios de azia, ajuda a identificar seus gatilhos pessoais ao longo de algumas semanas.

07

Técnicas de alívio

Ferramentas simples para usar quando a azia aparecer.

MANTENHA-SE ERETO

Ficar sentado ou em pé, em vez de deitar, ajuda a gravidade a manter o conteúdo do estômago no lugar certo após uma refeição.

RESPIRAÇÃO CALMA

Momentos de estresse podem intensificar a percepção da azia — técnicas de respiração lenta ajudam a reduzir esse impacto.

ÁGUA EM PEQUENOS GOLES

Beber água em pequenos goles pode ajudar a "diluir" o ácido e aliviar a sensação de queimação em alguns casos.

CURIOSIDADE

Mascar um chiclete sem açúcar após as refeições pode aumentar a produção de saliva, o que ajuda a neutralizar parcialmente o ácido no esôfago.

ATENÇÃO

Antiácidos de venda livre podem aliviar episódios pontuais, mas o uso frequente (mais de duas semanas seguidas) deve ser conversado com um médico, para investigar a causa de base.

07 • CONTINUAÇÃO

Uma rotina diária para o conforto digestivo

Um roteiro simples para distribuir cuidado ao longo do dia e reduzir episódios de azia e refluxo. Adapte à sua realidade.

- 1 Café da manhã** — Prefira uma refeição equilibrada, sem excesso de gordura ou cafeína em jejum.
- 2 Almoço** — Coma devagar, em porção moderada, evitando ficar totalmente cheio.
- 3 Meio da tarde** — Se sentir fome, prefira um lanche leve, evitando frituras e doces em excesso.
- 4 Jantar** — Faça-o mais cedo e mais leve, dando tempo de digestão antes de dormir.
- 5 Antes de dormir** — Evite deitar logo após comer e considere elevar a cabeceira da cama.

RESUMO DO CAPÍTULO

Pequenos ajustes na forma e no horário das refeições, distribuídos ao longo do dia, ajudam a reduzir significativamente os episódios de azia e refluxo.

08

Erros mais comuns

Hábitos frequentes que, sem perceber, pioram a azia e o refluxo.

**Deitar logo após comer**

Facilita o retorno do conteúdo do estômago ao esôfago.

**Comer rápido e em grande quantidade**

Sobrecarrega o estômago e aumenta a pressão abdominal.

**Usar antiácidos todos os dias, por conta própria**

Pode mascarar uma causa que precisa de avaliação médica.

**Ignorar sintomas persistentes**

Refluxo frequente sem tratamento pode, ao longo do tempo, irritar o esôfago.

**Continuar fumando**

O tabagismo enfraquece a proteção natural contra o refluxo.

**Usar roupas muito apertadas na cintura**

Aumenta a pressão sobre o abdômen, facilitando o refluxo.

ATENÇÃO

Assumir que toda dor no peito é "só azia" pode ser perigoso. Se a dor for intensa ou vier acompanhada de outros sinais, procure atendimento médico imediatamente — veja o capítulo 13.

09

Mitos e verdades

Separando crenças populares do que realmente ajuda com a azia e o refluxo.

MITO

"Leite sempre alivia a azia."

Pode dar uma sensação de alívio momentâneo, mas o leite integral, com gordura, pode até piorar os sintomas depois.

VERDADE

"Alimentos gordurosos pioram o refluxo."

Retardam o esvaziamento do estômago e relaxam o esfíncter esofágico, facilitando o retorno do conteúdo ácido.

MITO

"Refluxo é só desconforto, nunca é grave."

Refluxo frequente e não tratado pode, com o tempo, irritar o esôfago. Sintomas persistentes merecem avaliação médica.

VERDADE

"Elevar a cabeceira da cama ajuda com sintomas noturnos."

Usa a gravidade a favor, reduzindo o retorno do conteúdo do estômago durante o sono.

Mais mitos e verdades sobre azia e refluxo

MITO

"Antiácido resolve o problema para sempre."

Alivia o sintoma pontualmente, mas não trata a causa de base. Uso muito frequente deve ser avaliado por um médico.

VERDADE

"Perder peso pode reduzir significativamente os sintomas."

Reduz diretamente a pressão abdominal que facilita o refluxo.

MITO

"Só quem come muito tem refluxo."

Fatores como estresse, tabagismo e certas condições de saúde também influenciam, independentemente da quantidade de comida.

VERDADE

"Comer devagar ajuda a reduzir o refluxo."

Reduz a chance de sobrecarregar o estômago e aumentar a pressão abdominal.

RESUMO DO CAPÍTULO

Muitas crenças populares sobre azia e refluxo não se sustentam na prática. Priorize refeições menores, postura ao dormir e peso equilibrado — e não ignore sintomas persistentes.

10

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre azia e refluxo, respondidas de forma direta.

Refluxo tem cura?

Depende da causa. Muitos casos são bem controlados com hábitos e, quando necessário, medicação. Em alguns casos específicos, um médico pode considerar outras abordagens. O objetivo costuma ser controle, mais do que "cura" definitiva.

Azia na gravidez é normal?

É comum, devido às mudanças hormonais e ao aumento da pressão abdominal. Ainda assim, deve ser acompanhada pelo obstetra, que pode indicar o que é seguro usar nesse período.

Posso tomar antiácido todos os dias?

Para uso ocasional, geralmente sim, seguindo a bula. O uso diário e prolongado deve ser conversado com um médico, para investigar a causa e evitar mascarar sintomas importantes.

Refluxo pode causar tosse?

Sim. Quando o conteúdo ácido atinge a garganta, pode irritar as vias aéreas e causar tosse persistente, especialmente à noite.

É normal ter azia depois de uma refeição muito grande?

Sim, episódios ocasionais após refeições fartas são comuns e não costumam ser motivo de preocupação, desde que não sejam frequentes.

Mais perguntas frequentes

Quando o refluxo "vira" DRGE?

Quando os sintomas acontecem com frequência (mais de duas vezes por semana) ou persistem por semanas, mesmo com ajustes de hábito. Nesses casos, um médico pode confirmar o diagnóstico.

Refluxo pode afetar os dentes ou a garganta?

Sim, o ácido que sobe pode, ao longo do tempo, afetar o esmalte dos dentes e irritar a garganta. Por isso, sintomas persistentes merecem atenção.

Água com bicarbonato ajuda com a azia?

Pode neutralizar o ácido momentaneamente, mas não deve ser usada com frequência sem orientação médica, especialmente por pessoas com pressão alta ou outras condições de saúde.

Exercício físico piora o refluxo?

Exercícios muito intensos logo após comer podem piorar os sintomas. O ideal é dar um intervalo entre a refeição e a atividade física mais intensa.

Crianças podem ter refluxo?

Sim, embora seja mais comum em bebês e costume melhorar com a idade. Refluxo persistente em crianças deve ser avaliado pelo pediatra.

DICA PRÁTICA

Se sua dúvida não está aqui, anote-a. Muitas perguntas sobre azia e refluxo têm resposta melhor quando discutidas com um médico que conhece o seu histórico.

11

Plano de ação — 7 dias

Uma mudança por dia. Simples, na ordem certa, sem sobrecarregar sua rotina.

DIA 1 • OBSERVE SEUS GATILHOS

Anote quais alimentos e horários costumam anteceder os episódios de azia.

DIA 2 • REDUZA AS PORÇÕES

Em vez de refeições grandes, experimente porções menores e mais frequentes hoje.

DIA 3 • NÃO DEITE LOGO APÓS COMER

Espere pelo menos duas horas entre a última refeição e a hora de deitar.

DIA 4 • ELEVE A CABECEIRA DA CAMA

Se sente sintomas noturnos, ajuste a cabeceira ou use uma cunha para dormir mais elevado.

DICA PRÁTICA

Cada novo dia deste plano soma-se ao anterior — você não substitui a mudança do dia 1, você acrescenta a do dia 2. No fim da semana, todas trabalham juntas.

Plano de ação — dias 5 a 7

DIA 5 • REDUZA UM ALIMENTO GATILHO

Escolha um alimento que você suspeita piorar seus sintomas e reduza o consumo hoje.

DIA 6 • PRATIQUE UMA TÉCNICA DE RELAXAMENTO

Experimente respiração calma antes ou depois das refeições principais.

DIA 7 • REVISE PESO E HÁBITOS GERAIS

Observe a semana e avalie o que mais ajudou a reduzir os sintomas.

DEPOIS DOS 7 DIAS

Mantenha os hábitos que funcionaram e continue ajustando aos poucos. O controle da azia e do refluxo se constrói em semanas, não em um único dia.

CURIOSIDADE

É normal ter algum episódio mesmo seguindo o plano, especialmente em ocasiões sociais. O que importa é a tendência ao longo das semanas, não um dia isolado.

12

Checklist final

Uma lista para consultar sempre que quiser revisar seus hábitos.

Refeições

- ☐ Faço refeições menores e mais frequentes
- ☐ Como devagar, sem pressa
- ☐ Evito deitar logo após comer
- ☐ Modero alimentos gordurosos, ácidos e cafeína

Sono e postura

- ☐ Elevo a cabeceira da cama, se tenho sintomas noturnos
- ☐ Durmo de lado, preferencialmente o esquerdo
- ☐ Evito roupas apertadas na cintura

Hábitos gerais

- ☐ Mantenho um peso saudável
- ☐ Não fumo
- ☐ Cuido do meu nível de estresse

Atenção aos sinais

- ☐ Observo a frequência dos meus episódios
- ☐ Não uso antiácidos diariamente sem orientação
- ☐ Sei quando procurar ajuda profissional

DICA PRÁTICA

Imprima ou salve esta página. Revise-a a cada duas semanas para acompanhar sua evolução.

13

Quando procurar um profissional

Hábitos ajudam muito, mas alguns sinais merecem avaliação especializada.

SINAL DE EMERGÊNCIA — NEM TODA DOR NO PEITO É AZIA

Procure atendimento médico de emergência imediatamente se a dor no peito for intensa, apertada, vier acompanhada de falta de ar, suor frio, náusea, tontura, ou irradiar para o braço, costas ou mandíbula. Esses sinais podem indicar um problema cardíaco, e não refluxo — na dúvida, procure o pronto-socorro ou ligue 192 (SAMU) sem demora.

PROCURE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL SE VOCÊ:

- ☐ Tem azia ou refluxo mais de duas vezes por semana, de forma persistente
- ☐ Sente dificuldade ou dor para engolir
- ☐ Perdeu peso sem explicação, junto com os sintomas
- ☐ Tem vômitos persistentes, ou com sangue
- ☐ Percebe fezes muito escuras (possível sinal de sangramento)
- ☐ Usa antiácidos quase todos os dias, há mais de duas semanas
- ☐ Teve os primeiros sintomas de refluxo após os 50 anos

QUEM PODE AJUDAR

Médico clínico geral: avaliação inicial e encaminhamento.

Gastroenterologista: especialista em condições do aparelho digestivo.

Cardiologista: caso haja dúvida sobre a origem da dor no peito.

NÃO ESPERE PIORAR

Buscar ajuda cedo costuma facilitar o diagnóstico e o manejo dos sintomas. Não é sinal de exagero — é cuidado com a própria saúde.

14

Conclusão

O conforto digestivo se constrói com consistência, não com perfeição.

A azia e o refluxo costumam responder bem a ajustes simples: refeições menores, mais tempo entre comer e deitar, atenção a alguns alimentos e cuidado com o peso corporal.

Você não precisa eliminar todos os alimentos que gosta, nem seguir regras rígidas. Precisa de alguns hábitos consistentes, mantidos ao longo do tempo, e de atenção aos sinais que o corpo dá.

Use este guia como referência sempre que precisar. E lembre-se: sintomas persistentes ou sinais de alerta merecem avaliação médica — e dor no peito nunca deve ser assumida como "só azia" sem certeza.

PARA LEVAR COM VOCÊ

Cuidar da azia e do refluxo não é sobre eliminar todo desconforto — é sobre construir, aos poucos, hábitos que trazem mais conforto após as refeições.

ÚLTIMA DICA

Releia o capítulo 07 (Técnicas de alívio) sempre que quiser recomeçar. Não existe momento errado para retomar bons hábitos.

"Conforto digestivo não é sorte. É atenção repetida aos pequenos hábitos das refeições."

— A COLEÇÃO

Origem Saúde — 16 guias, 16 temas

Cada guia da coleção Origem Saúde trata de um único tema de saúde do dia a dia, com a mesma linguagem simples, o mesmo cuidado editorial e o mesmo compromisso: informação confiável, sem promessas de cura.

01 Sono

02 Ansiedade

03 Dor nas costas

04 Dor de cabeça

05 Dieta e peso

06 Cansaço constante

07 Intestino e digestão

08 Pele e acne

09 Dor nas articulações

10 Azia e refluxo

11 Estresse

12 Queda de cabelo

13 Imunidade

14 Pressão alta

15 TPM e ciclo menstrual

16 Vista cansada

LEMBRETE

Este material é educativo e não substitui avaliação médica. Sempre que necessário, procure um profissional de saúde qualificado.