

GUIA COMPLETO

Dor de Cabeça

alívio com base em hábitos

Entenda os diferentes tipos de dor de cabeça, o que realmente ajuda a preveni-la e aliviá-la, e como construir, em 7 dias, hábitos que reduzem a frequência das crises.

Linguagem simples. Base em boas práticas de saúde.
Sem promessas de cura — só orientação de verdade.

EDIÇÃO 2026
ORIGEMSAUDE

FICHA DO GUIA

Créditos e informações da edição

Título

Dor de Cabeça — Guia completo da coleção Origem Saúde

Coleção

Origem Saúde · Volume 04 de 16 — guias independentes sobre temas de saúde e bem-estar do dia a dia.

Edição

1ª edição digital, 2026. Distribuição em formato PDF, para leitura em celular, tablet ou computador.

AVISO LEGAL IMPORTANTE

Este e-book tem finalidade exclusivamente educativa e informativa. Ele não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento realizado por médico, neurologista ou outro profissional de saúde qualificado.

As informações aqui apresentadas refletem orientações gerais sobre hábitos e prevenção, amplamente aceitas na área da saúde. Elas não constituem prescrição médica e não garantem resultado ou cura para nenhuma condição. Cada pessoa é diferente — respostas variam de caso para caso.

Se você tem dores de cabeça frequentes, intensas ou com sinais de alerta, procure sempre orientação profissional. Em caso de urgência, procure atendimento médico imediato.

— NESTE GUIA

Sumário

ABERTURA

— **Introdução** 04

ENTENDENDO A DOR DE CABEÇA

01 **O que é a dor de cabeça** 05

02 **Principais causas** 07

03 **Sintomas** 09

04 **Fatores de risco** 10

O QUE FAZER

05 **Hábitos que ajudam** 11

06 **Alimentação e dor de cabeça** 13

07 **Técnicas de alívio** 14

ERROS E CRENÇAS

08 **Erros mais comuns** 16

09 **Mitos e verdades** 17

10 **Perguntas frequentes** 19

COLOCANDO EM PRÁTICA

11 **Plano de ação — 7 dias** 21

12 **Checklist final** 23

FECHAMENTO

13 **Quando procurar um profissional** 24

14 **Conclusão** 25

— **Sobre a coleção Origem Saúde** 26

COMO USAR ESTE GUIA

Você não precisa ler tudo de uma vez. Se está com dor agora, vá direto ao capítulo 07 (Técnicas de alívio) ou ao capítulo 13 (Quando procurar um profissional). Se quer entender o "porquê" antes do "como", comece pelo capítulo 01.

— INTRODUÇÃO

Antes de começar, uma conversa sincera

Se você chegou até este guia, provavelmente já conhece bem aquela sensação de peso na cabeça no fim de um dia difícil, ou aquela dor latejante que atrapalha tudo. A dor de cabeça é uma das queixas de saúde mais comuns — a maioria das pessoas sente algum tipo ao longo da vida.

Ela pode ter formas bem diferentes: um aperto nos dois lados da cabeça, uma dor latejante de um lado só, ou algo mais raro e intenso. Entender qual padrão você sente já ajuda bastante a saber o que fazer.

A boa notícia é que, na maioria dos casos, hábitos simples — hidratação, sono regular, pausas de tela, manejo do estresse — fazem diferença real na frequência e na intensidade das crises.

Este guia foi pensado para ser prático. Você vai encontrar explicações simples sobre os tipos de dor de cabeça, os principais gatilhos, técnicas de alívio, e — o mais importante — um plano de ação de 7 dias para começar a reduzir as crises hoje.

DICA PRÁTICA

Não tente aplicar todas as mudanças de uma vez. Escolha duas ou três dicas deste guia e mantenha-as por duas semanas antes de adicionar novas. A prevenção se constrói com consistência, não com pressa.

O QUE VOCÊ VAI LEVAR DESTE GUIA

Entender por que a dor de cabeça aparece, quais hábitos realmente ajudam a preveni-la e aliviá-la, e um caminho claro — dia a dia — para reduzir a frequência das crises, sem prometer milagres.

01

O que é a dor de cabeça

Nem toda dor de cabeça é igual — conhecer o tipo ajuda a saber o que fazer.

A dor de cabeça é uma das queixas mais comuns em consultas de saúde. Existem diferentes tipos, com características e gatilhos próprios.

Tensional

O tipo mais comum. Sensação de peso ou aperto, geralmente nos dois lados da cabeça, como uma faixa apertando. Costuma estar ligada a tensão muscular e estresse.

Enxaqueca

Dor latejante, geralmente de um lado só, que pode vir acompanhada de náusea e sensibilidade à luz e ao som. Tende a piorar com atividade física.

Em salvas

Mais rara, intensa, ao redor de um olho, em crises que se repetem por dias ou semanas. Merece avaliação especializada.

EM RESUMO

TIPO	CARACTERÍSTICA
Tensional	Aperto, dois lados, ligada a estresse
Enxaqueca	Latejante, um lado, com náusea/luz
Em salvas	Intensa, ao redor do olho, rara

CURIOSIDADE

Existe ainda a chamada dor de cabeça "secundária" — causada por outra condição de saúde, como sinusite ou tensão na mandíbula. Por isso, dores novas ou diferentes do habitual merecem atenção.

01 • CONTINUAÇÃO

Por que a dor de cabeça acontece

A dor de cabeça pode ter diferentes mecanismos por trás: tensão nos músculos do couro cabeludo, pescoço e mandíbula; alterações temporárias nos vasos sanguíneos da cabeça; ou uma sensibilização do sistema nervoso a determinados estímulos.

Em muitos casos, existe um "gatilho" — algo que, em determinadas condições, desencadeia a crise. Esses gatilhos variam bastante de pessoa para pessoa.

Identificar seus próprios gatilhos é uma das ferramentas mais úteis para reduzir a frequência das dores de cabeça ao longo do tempo.

GATILHOS COMUNS

- Estresse e tensão muscular
- Privação de sono ou sono irregular
- Desidratação e jejum prolongado
- Excesso ou abstinência de cafeína
- Longos períodos de tela

ATENÇÃO

Dores de cabeça muito frequentes, mesmo que leves, merecem atenção — especialmente se você está usando analgésicos quase todos os dias para controlá-las. Veja o capítulo 08 para entender por quê.

02

Principais causas

Na maioria das vezes, não é uma causa só — é um conjunto de fatores do dia a dia.

Tensão muscular

Músculos tensos no pescoço, ombros e mandíbula podem gerar dor que se espalha para a cabeça.

Estresse

Um dos gatilhos mais comuns tanto para dor tensional quanto para enxaqueca.

Desidratação

Mesmo uma desidratação leve pode desencadear dor de cabeça em muitas pessoas.

Pular refeições

A queda de açúcar no sangue por jejum prolongado é um gatilho conhecido.

Sono irregular

Tanto dormir pouco quanto dormir demais podem desencadear dor de cabeça.

Caféina

O excesso, ou a abstinência repentina, pode provocar dor de cabeça.

Esforço visual

Ambientes com luz forte ou esforço prolongado para enxergar sobrecarregam os olhos e a cabeça.

Ruído excessivo

Ambientes muito barulhentos podem desencadear ou piorar crises, especialmente de enxaqueca.

DICA PRÁTICA

Tente identificar, entre os itens acima, quais dois ou três parecem mais presentes na sua rotina. No capítulo 11 você vai transformar essa observação em ação, um dia de cada vez.

02 • CONTINUAÇÃO

O papel da vida moderna na dor de cabeça

O ritmo de vida atual reúne vários gatilhos conhecidos de dor de cabeça ao mesmo tempo: telas, sedentarismo, sobrecarga de estímulos e rotinas irregulares.

Excesso de telas

Longos períodos olhando para celular, computador ou televisão sobrecarregam os olhos e a postura do pescoço, dois gatilhos conhecidos de dor de cabeça.

Home office sem pausas

Trabalhar de casa, muitas vezes sem se levantar por horas, combina má postura, esforço visual e tensão muscular — um "combo" comum de gatilhos.

SOBRECARGA DE ESTÍMULOS

Notificações constantes, múltiplas telas e informação em excesso mantêm o sistema nervoso em alerta prolongado, o que pode contribuir para dores de cabeça mais frequentes.

ATENÇÃO

Se suas dores de cabeça costumam aparecer no fim do dia de trabalho, vale observar sua postura, o tempo de tela e a frequência de pausas ao longo do dia.

03

Sintomas da dor de cabeça

Reconhecer o padrão da sua dor ajuda a entender o que fazer.

TIPO	LOCALIZAÇÃO	SINTOMAS ASSOCIADOS
Tensional	Dois lados, como uma faixa	Sensação de peso, tensão no pescoço e ombros, sem náusea
Enxaqueca	Geralmente um lado só	Dor latejante, náusea, sensibilidade à luz e ao som, piora com esforço
Em salvas	Ao redor de um olho	Dor muito intensa, olho vermelho ou lacrimejando, em crises
Secundária	Variável	Ligada a outra causa (sinusite, tensão na mandíbula, entre outras)

OBSERVE O PADRÃO

Anotar quando a dor aparece, quanto tempo dura e o que você fez antes ajuda a identificar gatilhos pessoais — uma das formas mais eficazes de reduzir crises futuras.

CURIOSIDADE

Algumas pessoas com enxaqueca sentem sinais de aviso — chamados de "aura" — como pontos luminosos ou alterações visuais, minutos antes da dor começar.

RESUMO DO CAPÍTULO

A maioria das dores de cabeça é benigna e melhora com cuidados simples. Sintomas fora do padrão habitual, muito intensos ou associados a outros sinais, merecem atenção — veja o capítulo 13 para uma lista completa.

04

Fatores de risco

Situações que aumentam a chance de dores de cabeça aparecerem com mais frequência.

FATOR	POR QUE AUMENTA O RISCO
Histórico familiar	A enxaqueca, em especial, tem um componente genético conhecido.
Estresse crônico	Mantém a musculatura da cabeça e pescoço tensa com frequência.
Sono irregular	Tanto a privação quanto o excesso de sono podem desencadear crises.
Desidratação frequente	Aumenta a chance de dores de cabeça relacionadas à hidratação.
Má postura	Sobrecarrega músculos do pescoço, que se conectam à tensão na cabeça.
Uso excessivo de telas	Combina esforço visual e má postura, dois gatilhos comuns.
Ciclo hormonal	Em muitas mulheres, variações hormonais influenciam a frequência de crises.
Consumo alto de cafeína	O excesso, ou a interrupção brusca, pode desencadear dor de cabeça.

RESUMO

Nenhum desses fatores, isoladamente, costuma ser grave. O problema surge quando vários deles se somam por dias ou semanas seguidas, sem pausa para o corpo se reequilibrar.

DICA PRÁTICA

Marque mentalmente quais fatores desta tabela mais combinam com a sua rotina atual — eles serão o ponto de partida do seu plano de ação, no capítulo 11.

05

Hábitos que ajudam a prevenir

Pequenas rotinas que, mantidas com constância, reduzem a frequência das crises.

No corpo

Hidrate-se ao longo do dia

A desidratação é um gatilho comum e fácil de evitar.

Mantenha horários regulares de sono

Dormir e acordar sempre perto do mesmo horário reduz gatilhos ligados ao sono.

Não pule refeições

Evita quedas de açúcar no sangue, um gatilho conhecido.

Na rotina

Faça pausas de tela

Reduz o esforço visual acumulado ao longo do dia.

Alongue pescoço e ombros

Reduz a tensão muscular que costuma alimentar dores tensionais.

Cuide do estresse

Técnicas de relaxamento reduzem um dos gatilhos mais comuns de dor de cabeça.

DICA PRÁTICA

Mantenha uma garrafa de água por perto ao longo do dia — um lembrete visual simples que ajuda bastante na hidratação.

CURIOSIDADE

Manter uma rotina regular — de sono, refeições e pausas — costuma reduzir a frequência de crises tanto quanto, ou mais do que, evitar gatilhos específicos isoladamente.

05 • CONTINUAÇÃO

Ambiente e ergonomia no dia a dia

LUZ

Ajuste o brilho das telas e evite luz muito forte ou muito fraca, que sobrecarregam a visão ao longo do dia.

POSTURA DA TELA

Mantenha a tela na altura dos olhos, evitando curvar o pescoço para baixo por longos períodos.

RUÍDO

Ambientes muito barulhentos podem contribuir para o início ou a piora de uma crise, especialmente de enxaqueca.

PAUSAS DE TELA

A cada 20-30 minutos de tela, olhe para longe por alguns segundos. Esse pequeno hábito reduz o esforço visual acumulado ao longo do dia.

DICA PRÁTICA

Se costuma ter crises durante o trabalho, avalie a altura da tela, a iluminação do ambiente e a frequência das suas pausas.

06

Alimentação e dor de cabeça

O que e quando você come também influencia a frequência das crises.

CATEGORIA	EFEITO NA DOR DE CABEÇA	RECOMENDAÇÃO
Cafeína	O excesso ou a interrupção brusca podem desencadear dor de cabeça.	Manter consumo estável e moderado
Álcool (especialmente vinho tinto)	Gatilho comum de enxaqueca em algumas pessoas.	Observar reação individual
Jejum prolongado	Queda de açúcar no sangue é um gatilho conhecido.	Fazer refeições regulares
Hidratação	A desidratação leve já pode desencadear dor de cabeça.	Beber água ao longo do dia
Alimentos ultraprocessados em excesso	Alguns aditivos são relatados como gatilhos por certas pessoas.	Moderar o consumo
Chocolate e queijos envelhecidos	Gatilhos relatados por algumas pessoas com enxaqueca.	Observar reação individual

ATENÇÃO

Gatilhos alimentares variam bastante de pessoa para pessoa. Não é necessário cortar tudo de uma vez — observe o que parece fazer diferença no seu caso.

DICA PRÁTICA

Um diário alimentar simples, junto com o registro das crises, ajuda a identificar padrões pessoais ao longo de algumas semanas.

07

Técnicas de alívio

Ferramentas simples para usar assim que a dor começar.

ALONGAMENTO DE PESCOÇO

Ajuda a soltar a tensão muscular ligada à dor tensional.

- 1 Incline a cabeça para um lado, levando a orelha ao ombro.
- 2 Segure por 15-20 segundos, respirando devagar.
- 3 Repita do outro lado.
- 4 Faça movimentos leves de rotação do pescoço.

COMPRESSA

Pode trazer alívio, dependendo do tipo de dor.

- 1 Para dor tensional, experimente uma compressa morna no pescoço.
- 2 Para enxaqueca, muitas pessoas preferem compressa fria na testa.
- 3 Aplique por 15-20 minutos, em ambiente tranquilo.

AMBIENTE CALMO

Para crises de enxaqueca, um ambiente escuro e silencioso costuma ajudar bastante a reduzir o desconforto, já que luz e som intensos tendem a piorar a dor.

CURIOSIDADE

Uma massagem leve nas têmporas e no couro cabeludo, com movimentos circulares, é uma técnica simples usada por muitas pessoas para aliviar a tensão.

07 • CONTINUAÇÃO

O que fazer quando a dor aparecer

Um roteiro simples para os primeiros minutos de uma crise. Adapte conforme o tipo de dor que você costuma sentir.

- 1 Pare e observe** — Note a intensidade, localização e possíveis gatilhos recentes (sono, refeições, estresse, tela).
- 2 Hidrate-se** — Beba um copo de água, já que a desidratação é um gatilho comum e fácil de descartar.
- 3 Reduza estímulos** — Se possível, vá para um ambiente mais calmo, com menos luz e ruído.
- 4 Alongue o pescoço** — Faça o alongamento lateral, com calma, respirando devagar.
- 5 Descanse por alguns minutos** — Uma pausa curta, mesmo sem dormir, ajuda o corpo a relaxar.

RESUMO DO CAPÍTULO

Técnicas simples de alívio, aplicadas logo no início da crise, costumam ajudar bastante. Usadas com regularidade — não só durante a dor — elas também contribuem para a prevenção.

08

Erros mais comuns

Hábitos frequentes que, sem perceber, aumentam a frequência das dores de cabeça.

**Usar analgésico quase todos os dias**

O uso excessivo pode causar a chamada "dor de cabeça por rebote", que piora com o tempo.

**Pular refeições**

Aumenta o risco de crises ligadas à queda de açúcar no sangue.

**Ignorar sinais de tensão no pescoço**

A tensão acumulada costuma "subir" e se transformar em dor de cabeça.

**Ficar muito tempo sem pausas de tela**

Sobrecarrega a visão e a postura do pescoço ao mesmo tempo.

**Não se hidratar ao longo do dia**

A desidratação é um dos gatilhos mais simples de evitar — e mais ignorados.

**Continuar a rotina normal durante uma crise forte**

Insistir em atividades intensas durante uma crise pode prolongar o desconforto.

ATENÇÃO

Usar analgésicos mais de 2-3 dias por semana, de forma regular, é um sinal de alerta. Procure um médico para reavaliar o tratamento — o uso excessivo de medicação pode, paradoxalmente, piorar a frequência da dor.

09

Mitos e verdades

Separando crenças populares do que realmente ajuda com a dor de cabeça.

MITO**"Toda dor de cabeça forte é enxaqueca."**

Existem vários tipos de dor de cabeça intensa. A enxaqueca tem características específicas, como dor latejante e sensibilidade à luz.

VERDADE**"Manter uma rotina regular de sono ajuda a prevenir crises."**

Horários irregulares de sono estão entre os gatilhos mais comuns de dor de cabeça.

MITO**"Tomar analgésico todo dia é seguro, desde que a dor melhore."**

O uso frequente pode levar à dor de cabeça por uso excessivo de medicação, que tende a piorar o quadro com o tempo.

VERDADE**"A desidratação pode causar dor de cabeça."**

Mesmo uma desidratação leve já é um gatilho reconhecido em muitas pessoas.

Mais mitos e verdades sobre dor de cabeça

MITO

"Dor de cabeça é sempre sinal de algo grave."

A grande maioria dos casos é benigna e está ligada a fatores como tensão, sono e hidratação.

VERDADE

"Alongamento e pausas de tela ajudam a prevenir dores tensionais."

Reduzem diretamente dois dos principais gatilhos desse tipo de dor: tensão muscular e esforço visual.

MITO

"Enxaqueca é só uma dor de cabeça mais forte."

A enxaqueca é uma condição com características próprias, que vai além da intensidade da dor, incluindo náusea e sensibilidade a estímulos.

VERDADE

"Identificar gatilhos pessoais ajuda a reduzir crises futuras."

Um diário simples de dor e possíveis gatilhos costuma ser uma das ferramentas mais úteis de prevenção.

RESUMO DO CAPÍTULO

Muitas crenças populares sobre dor de cabeça não se sustentam na prática. Priorize hidratação, sono regular e manejo do estresse, e evite o uso excessivo de analgésicos.

10

Perguntas frequentes

Dúvidas comuns sobre dor de cabeça, respondidas de forma direta.

Dor de cabeça é hereditária?

A enxaqueca, em especial, costuma ter um componente genético — é comum ver esse padrão em várias pessoas da mesma família.

Posso tomar analgésico toda vez que sinto dor?

Para uso ocasional, geralmente sim, seguindo as orientações da bula. O cuidado é com o uso muito frequente, que pode levar à dor de cabeça por uso excessivo de medicação.

Crianças também podem ter dor de cabeça?

Sim, incluindo enxaqueca. Para orientações específicas sobre dor de cabeça em crianças, procure o pediatra.

Dor de cabeça na gravidez é normal?

Pode acontecer devido a mudanças hormonais, mas deve ser sempre acompanhada pelo obstetra, que pode orientar o que é seguro usar nesse período.

Enxaqueca tem cura?

A enxaqueca costuma ser uma condição de manejo contínuo, não de cura definitiva. Muitas pessoas conseguem reduzir bastante a frequência e a intensidade das crises com hábitos e, quando necessário, acompanhamento médico.

Mais perguntas frequentes

Quanto tempo uma dor de cabeça comum deve durar?

Varia bastante conforme o tipo, mas dores tensionais costumam durar de algumas horas a um dia. Dores muito longas ou que fogem do seu padrão habitual merecem avaliação.

Problemas de visão podem causar dor de cabeça?

Sim, o esforço para enxergar (grau não corrigido, por exemplo) é um gatilho comum. Um exame oftalmológico pode ajudar a descartar essa causa.

Estresse é sempre a causa principal?

É um dos gatilhos mais comuns, mas raramente age sozinho — geralmente se soma a outros fatores, como sono, hidratação e postura.

Cafeína ajuda ou piora a dor de cabeça?

Pode ajudar em pequenas quantidades em algumas pessoas, mas o excesso ou a interrupção brusca também são gatilhos conhecidos. O equilíbrio é o mais importante.

Preciso de exame de imagem para investigar minha dor de cabeça?

Nem sempre. A maioria dos casos é diagnosticada pela história e pelo exame clínico. Exames costumam ser indicados quando há sinais de alerta — veja o capítulo 13.

DICA PRÁTICA

Se sua dúvida não está aqui, anote-a. Muitas perguntas sobre dor de cabeça têm resposta melhor quando discutidas com um profissional que conhece o seu histórico.

11

Plano de ação — 7 dias

Uma mudança por dia. Simples, na ordem certa, sem sobrecarregar sua rotina.

DIA 1 • OBSERVE SEUS GATILHOS

Anote, sem julgamento, quando a dor apareceu e o que você fez nas horas anteriores.

DIA 2 • HIDRATE-SE MAIS

Mantenha uma garrafa de água por perto e beba com regularidade ao longo do dia.

DIA 3 • AJUSTE SEU AMBIENTE DE TELA

Posicione a tela na altura dos olhos e ajuste o brilho para um nível confortável.

DIA 4 • INCLUA PAUSAS REGULARES

A cada 30 minutos de tela, olhe para longe e alongue o pescoço por alguns instantes.

DICA PRÁTICA

Cada novo dia deste plano soma-se ao anterior — você não substitui a mudança do dia 1, você acrescenta a do dia 2. No fim da semana, todas trabalham juntas.

11 • CONTINUAÇÃO

Plano de ação — dias 5 a 7**DIA 5 • PRATIQUE ALONGAMENTOS**

Inclua o alongamento de pescoço pela manhã e à noite.

DIA 6 • REGULE SONO E REFEIÇÕES

Tente dormir e fazer as refeições em horários mais regulares hoje.

DIA 7 • REVISE CAFEÍNA E ANALGÉSICOS

Observe seu consumo de cafeína e a frequência do uso de analgésicos na semana.

DEPOIS DOS 7 DIAS

Mantenha os hábitos que funcionaram e continue ajustando aos poucos. A prevenção de dores de cabeça se constrói em semanas, não em um único dia.

CURIOSIDADE

É normal ter alguma crise mesmo seguindo o plano. O que importa é a tendência ao longo das semanas — frequência e intensidade menores, não a ausência total.

12

Checklist final

Uma lista para consultar sempre que quiser revisar seus hábitos de prevenção.

Hidratação e alimentação

- ☐ Bebo água suficiente ao longo do dia
- ☐ Faço refeições regulares, sem pular horários
- ☐ Moderado o consumo de cafeína e álcool

Postura e ambiente

- ☐ Mantenho a tela na altura dos olhos
- ☐ Faço pausas regulares de tela
- ☐ Alongo pescoço e ombros com frequência

Rotina

- ☐ Durmo em horários regulares
- ☐ Cuido do meu nível de estresse
- ☐ Evito uso frequente de analgésicos

Atenção aos sinais

- ☐ Registro meus gatilhos e padrões de dor
- ☐ Fico atento a dores fora do padrão habitual
- ☐ Sei quando procurar ajuda profissional

DICA PRÁTICA

Imprima ou salve esta página. Revise-a a cada duas semanas para acompanhar sua evolução.

13

Quando procurar um profissional

Hábitos ajudam muito, mas alguns sinais merecem avaliação especializada.

PROCURE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL SE VOCÊ:

- ☐ Tem dores de cabeça frequentes ou que pioram progressivamente
- ☐ Usa analgésicos mais de 2-3 dias por semana
- ☐ Tem dor que muda de padrão em relação ao que costuma sentir
- ☐ A dor de cabeça está afetando trabalho, estudos ou rotina de forma importante
- ☐ Tem a primeira crise forte de dor de cabeça após os 50 anos
- ☐ A dor acorda você à noite ou piora ao deitar

SINAL DE EMERGÊNCIA

Procure atendimento médico imediato se a dor de cabeça for a "pior da sua vida", de início súbito e muito intenso, ou vier acompanhada de febre com rigidez de nuca, alteração de fala, visão, força ou equilíbrio, confusão mental, convulsão, ou surgir após um trauma na cabeça. Esses sinais exigem avaliação de emergência sem demora.

QUEM PODE AJUDAR

Médico clínico geral: primeiro ponto de avaliação e encaminhamento.

Neurologista: especialista em dores de cabeça persistentes ou complexas.

Oftalmologista: avalia se problemas de visão contribuem para a dor.

NÃO ESPERE PIORAR

Buscar ajuda cedo costuma facilitar o manejo da dor de cabeça. Não é sinal de fraqueza — é cuidado com a própria saúde.

14

Conclusão

Prevenir a dor de cabeça se constrói com consistência, não com perfeição.

A dor de cabeça costuma ser resultado de vários pequenos fatores que se somam — sono, hidratação, postura, estresse, alimentação. A boa notícia é que ela responde bem a ajustes igualmente pequenos, repetidos com constância.

Você não precisa eliminar todos os gatilhos de uma vez, nem alcançar uma rotina perfeita. Precisa de alguns hábitos simples, mantidos ao longo do tempo, e de atenção aos próprios padrões de dor.

Use este guia como referência sempre que precisar. Volte ao plano de ação quando sentir que as crises estão voltando com mais frequência. E lembre-se: se os sinais de alerta aparecerem, buscar um profissional é sempre o caminho mais seguro.

PARA LEVAR COM VOCÊ

Cuidar da dor de cabeça não é sobre eliminar todo desconforto — é sobre construir, aos poucos, hábitos que reduzem a frequência e a intensidade das crises.

ÚLTIMA DICA

Releia o capítulo 07 (Técnicas de alívio) sempre que precisar de um recomeço rápido. Não existe momento errado para retomar bons hábitos.

"Prevenir não é sorte. É atenção repetida aos pequenos sinais do corpo."

— A COLEÇÃO

Origem Saúde — 16 guias, 16 temas

Cada guia da coleção Origem Saúde trata de um único tema de saúde do dia a dia, com a mesma linguagem simples, o mesmo cuidado editorial e o mesmo compromisso: informação confiável, sem promessas de cura.

01 Sono

02 Ansiedade

03 Dor nas costas

04 Dor de cabeça

05 Dieta e peso

06 Cansaço constante

07 Intestino e digestão

08 Pele e acne

09 Dor nas articulações

10 Azia e refluxo

11 Estresse

12 Queda de cabelo

13 Imunidade

14 Pressão alta

15 TPM e ciclo menstrual

16 Vista cansada

LEMBRETE

Este material é educativo e não substitui avaliação médica. Sempre que necessário, procure um profissional de saúde qualificado.