

Problema 1. Considere a cadeia de Markov em $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ com

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$


Classifique seus estados e ache as distribuições estacionárias dessa cadeia. Simule essa cadeia considerando $X_0 = 1, 2, 3, 4, 5$ e aproxime o limite:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

para todos $i, j \in I$. Verifique que os resultados encontrados estão convergindo para os valores corretos.

Solução:

Observando o diagrama da cadeia podemos ver que o estado 2 é transiente e os outros estados são recorrentes e se dividem em duas Classes irredutíveis $R_1 = \{1, 3\}$, $R_2 = \{4, 5\} \in I$. Portanto, $T = \{2\}$ (estado transiente) e $R = R_1 \cup R_2$ (estados recorrentes).



Agora vamos calcular as distribuições estacionárias dessa cadeia. Seja $\pi = [\pi_1 \ \pi_2 \ \pi_3 \ \pi_4 \ \pi_5]$ tal distribuição. Devemos ter $\pi P = \pi$ e $\sum_{i=1}^5 \pi_i = 1$.

Resolvendo o sistema, obtemos: $\pi_2 = 0$, $\pi_3 = \frac{4}{3}\pi_1$ e $\pi_5 = \frac{3}{2}\pi_4$. Além disso, pela segunda equação temos $\pi_4 = \frac{6 - 14\pi_1}{15}$. Seja $\pi_1 = \alpha$. A distribuição estacionária dessa cadeia é dada por:

$$\pi(\alpha) = \left[\alpha \quad 0 \quad \frac{4}{3}\alpha \quad \frac{6 - 14\alpha}{15} \quad \frac{3 - 7\alpha}{5} \right].$$

Como $0 \leq \pi_i \leq 1$, para todo $i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ devemos ter $0 \leq \alpha \leq \frac{3}{7}$. Para calcular os valores do limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i),$$

para cada $i \in I$, devemos separar nosso espaço de estados em dois casos:

Problema 2. Considere a cadeia de Markov em $I = \{1, 2, 3, 4\}$ com

$$P = \begin{bmatrix} 1/3 & 0 & 2/3 & 0 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 2/3 \end{bmatrix}$$


Simule essa cadeia considerando $X_0 = 1$ e aproxime o limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

Verifique que o resultado encontrado está convergindo para o valor correto.

Solução:

Observando o diagrama da cadeia podemos ver que os estados 2 e 4 são transientes e os outros estados são recorrentes. Portanto, se $\pi = (\pi_i)_{i \in I}$ é distribuição estacionária da cadeia então $\pi_2 = \pi_4 = 0$.



Além disso, resolvendo

$$[\pi_1 \pi_3] \begin{bmatrix} 1/3 & 2/3 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} = [\pi_1 \pi_3]$$

em conjunto com $\pi_1 + \pi_3 = 1$, encontramos $\pi_1 = \frac{3}{7}$ e $\pi_3 = \frac{4}{7}$, então a distribuição estacionária da cadeia é:

$$\pi = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} & 0 & \frac{4}{7} & 0 \end{bmatrix}$$

Como $n \rightarrow +\infty$ então podemos aproximar o limite:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 &\approx \sum_{i \in I} \pi_i X_i^2 \\ &\approx 1\pi_1 + 4\pi_2 + 9\pi_3 + 16\pi_4 \\ &\approx 1\frac{3}{7} + 9\frac{4}{7} = \frac{39}{7} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 &\approx 5.57 \end{aligned}$$

Problema 3. Simule vários caminhos do martingal $M_n = \prod_{k=1}^n X_k$ com $(X_k)_{k \in \mathbb{N}}$ iid e $\mathbb{P}(X_n = 1/2) = \mathbb{P}(X_n = 3/2) = 1/2$ e mostre graficamente que $M_n \rightarrow 0$ q.c

Solução: A seguir segue o gráfico com 10 simulações do martingal M_n . Foram utilizadas 100 iterações para cada simulação.

